FACULDADE DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

(Diretor: Prof. Dr. Francisco Borges Vieira)

CADEIRA DE DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

(Prof. Dr. João Alves Meira)

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

1.ª CADEIRA DE CLÍNICA MÉDICA

(Prof. Dr. Antonio Barros de Uchôa Cintra)

CADEIRA DE ANATOMIA PATOLÓGICA (Serviço de Verificação de Óbitos)

(Prof. Dr. Ludgero da Cunha Moffa)

CADEIRA DE TERAPÊUTICA CLÍNICA

(Prof. Dr. Cantídio de Moura Campos)

SÔBRE A ARTERITE PULMONAR ESQUISTOSOMÓTICA (REVISÃO DA
LITERATURA E APRESENTAÇÃO DE TRÊS CASOS, DOS QUAIS UM
COMPROVADO PELA NECRÓPSIA)

JOÃO ALVES MEIRA

GODOFREDO ELEJALDE *

e

JOSÉ FERNANDES PONTES **

SUMÁRIO: 1.ª Parte: — Revisão da literatura. Quadro clínico. Sintomatologia. Radiologia. Eletrocardiografia. Patogenia. Anatomia patológica. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Evolução. Prognóstico. Terapêutica.

2.ª Parte: — Observações clínicas. Comentários. Resumo. Bibliografia.

Num trabalho anterior, um de nós (J. A. M.)²⁹ estudou pormenorizadamente as localizações pulmonares da esquistosomíase mansoni e reviu a bibliografia do assunto até 1941.

No presente trabalho limitar-nos-emos a considerar a chamada forma cárdio-pulmonar da esquistosomíase mansoni (arterite pulmonar esquistosomótica), aproveitando para êsse fim três observações, das quais uma acompanhada de comprovação anátomo-patológica.

Desde que o interêsse por êsse assunto tem aumentado ultimamente, como se depreende da leitura das publicações mais recentes, faremos inicialmente uma revisão da literatura, procurando atualizar nossos conhecimentos sôbre êsse importante aspecto da parasitose de Manson-Pirajá da Silva.

* Médico do Serviço de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina.

** Docente livre de Clínica Médica da Faculdade de Medicina.

Miller³², em 1914, estudando as lesões encontradas ao nível dos pulmões em casos de esquistosomiase mansoni, em material de procedência brasileira, menciona, parece que pela primeira vez, as alterações de arterite pulmonar obliterante ao lado de múltiplos granulomas miliares, já visíveis macroscopicamente, ricos em eosinófilos e células gigantes, sem tendência à necrose. Esta formação de nódulos no pulmão, escreve Miller, foi complicada por pneumonia catarral e fibrinosa reativa, com subsequente carnificação de um lado, e bronquietasias, bronquiolite e arterite obliterante de outro lado.

O conhecimento destas formas, afirma o A. citado, se torna tanto mais importante para a diferenciação de afecções tuberculosas ou sífilíticas, se tivermos em mente que os corpos estranhos causadores da inflamação, os ovos, já podem ter sido completamente destruídos pela atividade fagocitária de numerosas células gigantes.

As lesões arteriais foram descritas assim: "A parede das artérias atingidas pelo corte, de maior ou menor calibre, apresenta espessamento conjuntivo considerável. De quando em quando encontram-se vasos cuja parede é mais espessa do que a largura da luz. Para a formação desta proporção anormal contribui em parte a tendência das pequenas artérias à obliteração. Numerosos vasos estão realmente obliterados, outros estão envolvidos em certos pontos por infiltrados de células redondas, aos quais se associam só poucas plasmacélulas".

Sorour⁴⁸, em 1928, numa comunicação ao Congresso Internacional de Medicina Tropical e Higiene, reunido no Cairo, Egito, contribuiu com um estudo de anatomia patológica da esquistosomiase, estudando as lesões observadas nos pulmões (pseudo-tubérculos esquistosomóticos), dizendo serem principalmente causadas pelo *S. mansoni*. Referindo-se às alterações das arteríolas, o citado autor descreve: e ilustrou as lesões artérioescleróticas esquistosomóticas das artérias pulmonares. Com efeito, assim se expressou Sorour a propósito destes achados: "In a lucky longitudinal section of a blood vessel in a bilharzial lung we have found as many as ten B.O.* showing lateral spines embedded in the intima which has become diffusely thickened all round the lumen in the situation of the deposited ova, as compared with its normal thickness in that part of the vessel seen in the section where no ova are deposited. In the bilharzial thickened intima besides the ovum we found giant cells engulfing the ovum, eosinophils, plasma cells and young fibrous tissue. In two situations in this very much thickened intima degeneration and calcification is found. In places the bilharzial thickened intima shows a wealth of newly formed capillaries. In the centre of the part of the vessel where this bilharzial atheroma took place we saw two B.O.* in the adventitia and partly engaged in the wall of the vessel entering through one of the vasa vasorum vessels. This is the description and actual findings in this unique section, and which shows that in addition to the lesions produced by the bilharzia in different parts of the body it can also produce bilharzial atheroma with degeneration and calcification of the subendothelial proliferating elements".

Estas lesões proliferativas do endotélio com obliteração da luz vascular seriam, segundo escreve o mesmo autor em outra publicação⁴⁷ (1930), "exactly similar to the well known vascular lesions found in syphilitic and arteriosclerotic cases with no bilharzial element".

* Ovos de esquistosoma (bilharzia).

E noutro trecho do mesmo trabalho (1930) Sorour acrescenta: "The lesions thus formed would be exactly similar to the ordinary arteriosclerosis, were it not for giant cells and eosinophils, which are constantly associated with bilharzial lesions elsewhere. Even degeneration and actual calcification occur in these bilharzial atheromatous lesions, thus completing the picture of ordinary arteriosclerosis and atheroma".

"If the ovum is caught in the muscular coat of the vessel it produces a bilharzioma in the part of the wall where it is lodge. The bilharzioma, at first, consist of endothelioid cells but later on it is fibrosed by concentric layers of hyaline fibroid tissue, and as it swells out beyond the line of the vessel it looks much like a small saccular aneurysm that has healed and fibrosed".

"It will be seen, then that bilharzial factor produces vascular lesions similar to found in ordinary arterial diseases, which may also be due to irritating factors having gained access to the walls of the vessels and produced the proliferations and degenerative changes".

Coube, entretanto, a Azmy³, em 1932, responsabilizar, pela primeira vez, as lesões arterioescleróticas da artéria pulmonar e a endarterite obliterante das arteríolas pulmonares de origem esquistosomótica pelas manifestações clínicas de insuficiência cardíaca direita observadas nestes pacientes.

Esse autor estudou dois casos. Um deles apresentava sintomas de bronquite de longa duração, com enfisema, ligeira cianose, anemia intensa, aumento do coração, com acentuada dilatação da artéria pulmonar, sopro diastólico no foco pulmonar, onde a segunda bulha se apresentava hiperfonética; esplenomegalia e hepatomegalia.

O exame radiológico demonstrou aumento da área cardíaca, afetando principalmente o coração direito, e evidente dilatação da artéria pulmonar. Pela necrópsia verificou-se que os pulmões se apresentavam com fibrose, duros e enfisematosos; existia extrema dilatação cardíaca direita, e microscopicamente observaram-se lesões esquistosomóticas pulmonares, peribrônquicas e perivasculares. Na adventícia dos vasos sanguíneos, que mostravam um quadro de endarterite obliterante generalizada, foram vistos ovos de esquistosoma. A artéria pulmonar foi descrita como: difusamente dilatada, com placas gomosas proeminentes, sugerindo lesões sífilíticas recentes; porém, ao exame microscópico, não revelando traço de sífilis nem a presença de ovos do parasito em suas paredes. O outro caso não apresentava clinicamente sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca, mas tinha cirrose e dedos hipocráticos, dilatação cardíaca e da artéria pulmonar. Havia acentuação da 2.^a bulha, que era seguida de um intenso sopro diastólico.

O baço era aumentado e o fígado foi considerado clinicamente "cirrótico". Não foram registrados os exames de raios X do pulmão e coração. Este paciente obteve alta hospitalar após melhora conseguida com a terapêutica instituída.

Em 1935, Clark e Graef⁹ trouxeram a primeira confirmação a estas observações. Em trabalho sobre a arterite pulmonar crônica na esquistosomíase mansoni associada com hipertrofia do ventrículo direito, os citados autores resumem a observação clínica de um caso e estudam detalhadamente o quadro anátomo-patológico por eles observado.

* Ovos de esquistosoma (bilharzia).

Tratava-se um paciente do sexo feminino, de 21 anos, natural de Pôrto Rico, onde vivera até aos 9 anos, e que desde a idade de 14 anos sofria de dispnéia e palpitações de esforço, tendo nessa época sido considerada como cardiopata por um médico escolar. Em 1931 a paciente queixou-se de dôr precordial, tendo sido verificado nessa ocasião, como dados importantes, apenas a existência de choque da ponta impulsivo com ponto de máxima intensidade no 5.º espaço intercostal na linha hemiclavicular. Frêmito sistólico apical e sôpro sistólico musical audível em todo precórdio e no dorso.

Em 1934, um mês antes de seu internamento no Bellevue Hospital, de New York, apresentou dispnéia, que se tornou progressivamente mais intensa, e edema dos membros inferiores, que também se intensificou, atingindo o abdome. Três dias antes de se hospitalizar teve dôr precordial e torácica à direita. Ao exame físico verificou-se: ortopnéia; a cianose era difícil de ser apreciada por causa da cor da paciente; estase jugular. Sinais de congestão pulmonar e derrame da base direita. Choque da ponta no 5.º espaço intercostal para fora da linha hemiclavicular. Sôpro sístolo-diastólico do apex. P₂ maior que A₂. Ritmo regular, galope audível com frequência de 120. Pressão arterial 100-68. Sinais de ascite. Fígado e baço não palpáveis. Edema dos membros inferiores atingindo até o sacrum. Não foram referidos os exames radiológicos. Apesar de digitalizada, a paciente faleceu 20 horas após a hospitalização.

Os diagnósticos anátomo-patológicos incluíram: Pulmões — arterite pulmonar crônica (*Schistosoma mansoni*), hiperplasia da íntima e hipertrofia focal da média; congestão; hemorragia alveolar focal, áreas de colapso. Coração — hipertrofia e dilatação, principalmente ventricular direita, granulomas miliares esquistosomóticos, dilatação e ateromas da artéria pulmonar. Fígado — hepatite granulomatosa crônica difusa (*S. mansoni*). Congestão passiva crônica, hemorragia focal, necrose focal. Baço — congestão passiva crônica. Pâncreas — granulomas esquistosomóticos miliares. Rins — granulomas miliares esquistosomóticos.

A arterite pulmonar esquistosomótica, que os autores consideram como uma lesão específica causada pela presença dos ovos de *S. mansoni*, foi por eles responsabilizada pelas manifestações cardíacas finais.

Com efeito, assim Clark e Graef se referem, na discussão deste caso, após a descrição pormenorizada das lesões encontradas:

"Thus, the vascular lesions may be separated into two groups: those directly attributable to the ova, and those secondary to the increase intra-arterial tension. The former may be considered a specific arteritis, characterized by an obliterating endarterial proliferation with marked injury to the media leading to dilatation of the vessel. The latter may be considered as representing a non specific vascular change of an arteriosclerotic and atheromatous nature".

"The presence of hipertrophy of the right ventricle and evidence of congestive heart faillure are obviously related to the lesions of the small pulmonary arteries".

Em 1937, Day¹¹ estudou 3 casos de esquistosomiase pulmonar, sendo que um deles referia-se a um indivíduo de 35 anos, com dispnéia datando de alguns meses e que 2 anos antes fôra esplenectomizado. Ao exame físico havia uma pulsação precordial difusa estendendo-se até ao 3.º espaço intercostal esquerdo, aumento da área cardíaca, ausência de sopros. Radiologicamente verificou-se au-

mento do coração, interessando o ventrículo direito e o cone da pulmonar. Sinais radiológicos de congestão pulmonar. A pressão arterial era normal e o fígado, embora não aumentado, mostrava-se de consistência endurecida. Na autópsia deste caso foram verificados: dilatação acentuada do ventrículo direito; ausência de lesões miocárdicas e valvulares, artéria pulmonar dilatada e ateromatosa; aorta normal; o exame dos pulmões revelou a existência de aderências pleurais e ao corte numerosos nódulos esquistosomóticos. Fígado de tamanho normal, mas com fibrose densa e nodular; vermes adultos, de ambos os sexos, na veia porta. Na mucosa retal foram vistas zonas de infiltração granular com a presença, ao exame microscópico, de ovos de *S. mansoni*. Lesões esquistosomóticas do pâncreas, numa de suas veias sendo encontrado um verme.

Este caso serviu de exemplo à forma a que Day chamou de cárdio-pulmonar, e que representa o estágio mais avançado e extenso da esquistosomíase pulmonar, capaz de determinar, pelo comprometimento da circulação pulmonar, a insuficiência cardíaca. Essa forma, segundo Day, verifica-se, em geral, nos casos adiantados de esquistosomose com cirrose hepática e esplenomegalia.

Num outro caso de Day, sem sintomas cardíacos, uma mulher, muito emagrecida, de 20 anos, com febre e inchaço do abdome datando de 2 meses, e com anemia, ascite e esplenomegalia, vindo a falecer de disenteria bacilar, com exame de fezes também positivo para *S. mansoni*, o autor verificou, pela necrópsia: existência de vermes (*S. mansoni*) nas veias esplênica e porta; lesões esquistosomóticas dos intestinos, peritônio, fígado, pâncreas, gânglios mesentéricos e abdominais. Não havia lesão cardíaca. Os pulmões mostraram numerosos nódulos branco-acinzentados de 1 a 2 mm de diâmetro em toda a superfície de corte, porém mais abundantes nos lobos inferiores. Microscopicamente estes nódulos eram todos de natureza esquistosomótica; mas, o fato mais notável, e que justifica a inclusão deste caso nestas considerações, é a presença de vermes acasalados no interior das artérias pulmonares, vendo-se ao microscópio, num dos cortes, uma arteríola mostrando grande espessamento de sua parede com a formação de um gigantócito contendo restos de um ovo no seu interior.

As suas próprias observações Day acrescenta um caso do Dr. Marie, reproduzindo uma radiografia do paciente, na qual é bem demonstrada a saliência pronunciada do arco da artéria pulmonar, e evidente o aumento do ventrículo direito.

Shaw e Chareeb⁴³, em 1938, trouxeram uma contribuição notável aos nossos conhecimentos sobre as lesões vasculares pulmonares da esquistosomose com sua repercussão cardíaca, mostrando que no Egito, onde os autores fizeram esses estudos, a forma mais avançada, que eles denominaram de "moléstia de Ayerza, de origem esquistosomótica", ocorreu em 6 (2,1%) do total de 282 casos examinados, ou seja em 6,3% dos de localização pulmonar (95).

No Egito, como se sabe, tanto é verificada a esquistosomíase vesical ou haematóbia, causada pelo *S. haematobium*, como a esquistosomíase mansoni, determinada pelo *S. mansoni*. Pois bem, segundo os estudos de Shaw e Chareeb, a forma cardiopulmonar pode ser consequente tanto ao parasitismo pelo *S. mansoni* como pelo *S. haematobium*, ou por ambos os trematódeos. Mas, segundo os mesmos autores, é o *S. mansoni* o agente etiológico mais frequente dessa modalidade clínico-patológica da esquistosomíase pulmonar, pois, de acordo com os seus dados, os casos em que o *S. mansoni* foi o responsável pela arterite pulmonar foram mais frequentes (54%) do que o *S. haematobium* (19%).

No seu estudo, Shaw e Chareeb concluem que:

1 — Em 282 autópsias de egípcios sofrendo de esquistosomíase, estavam presentes em 33% lesões pulmonares devidas aos ovos.

2 — O efeito tóxico do ovo é demonstrado pela necrose do tecido em sua vizinhança. A extensão da necrose varia e possivelmente depende do grau de alergia no momento da invasão.

3 — Os tecidos podem acusar a presença dos ovos por outras reações, além da formação dos tubérculos, e é sugerido pela evidência histológica que o número de ovos, a reinfeção, a imunidade e alergia podem, todos, representar uma parte no determinismo do tipo de resposta.

4 — Os ovos atingem os pulmões como êmbolos e ficam detidos nas arteríolas que acompanham os bronquíolos respiratórios, produzindo uma arteriolite aguda necrotizante específica. Em consequência à necrose, o ovo escapa através da parede vascular, e forma-se um tubérculo parenquimatoso próximo ao bronquíolo respiratório. É sugerido que o ovo secrete um anticoagulante, porque ele nunca provoca trombose.

5 — O número de ovos é de importância capital para determinar o efeito sobre o tecido pulmonar. Em 86% dos casos somente alguns ovos atingem os pulmões, e as únicas lesões presentes eram tubérculos parenquimatosos. Ovos embólicos raramente são vistos nestes casos.

6 — Em casos com infestações mais intensas, estão presentes tanto lesões vasculares como as parenquimatosas, e os ovos embólicos são frequentes; a cicatrização de lesões vasculares agudas conduz a uma arteriolite obliterante, muitas vezes seguida pela canalização do tecido ocludente; a hipertrofia dos capilares neoformados produz uma estrutura característica da esquistosomíase pulmonar, a que demos o nome de "angiomatóides". As alterações vasculares são de distribuição focal e não são associadas com hipertrofia cardíaca ou sinais de insuficiência cardíaca congestiva.

7 — A infecção maciça e repetida dos pulmões é seguida por alterações arteriais disseminadas, hipertrofia do ventrículo D e o desenvolvimento da feição cárdio-pulmonar da moléstia de Ayerza, com morte por insuficiência cardíaca congestiva. A gravidade da moléstia é grandemente devida à repetida infecção das lesões cicatrizadas ou em vias de cura. O aspecto macroscópico dos pulmões é somente específico quando os ovos de reinfeção deixam de completar migração através das arteríolas espessadas e formam tubérculos nas suas paredes. No último estágio, quando as lesões específicas cicatrizam, somente os efeitos da obstrução arterial de longa duração são evidentes, e o aspecto ao olho desarmado, não difere daquele da moléstia de Ayerza devido a outras causas. Micrôscopicamente, contudo, a origem esquistosomótica pode ser reconhecida pelas características estruturais angiomatóides, mesmo que todos os ovos tenham desaparecido. Os pulmões são a sede de uma congestão crônica passiva sem hemossiderose.

8 — A moléstia de Ayerza de origem esquistosomótica compreende 2,1% de todos os casos de esquistosomose e 6,3% dos casos pulmonares. Razões são da-

das para acreditar que ela é uma complicação comum no Egito e outros países onde a esquistosomíase fôr endêmica.

9 — Os ovos de *S. haematobium* (58%) são mais comuns nos pulmões que os de *S. mansoni* (31%); mas o *S. mansoni* produz lesões vasculares mais frequentemente (54%) do que o *S. haematobium* (19%), e a razão disso foi discutida.

10 — Evidência foi adiantada para mostrar que a passagem do ovo através da parede do vaso é devida à necrose produzida por uma ação tóxica do embrião, o espículo pouco ou nada representando no processo. Foi também mostrado que o ovo pode escapar através da parede em condições onde o tamanho do vaso e a ausência de contratilidade tornam impossível, para o espículo, exercer a função perfuradora a êle atribuída, pela teoria mecânica.

11 — Os vermes estavam presentes em 3,6% da série e em 10,5% dos casos pulmonares. Tanto o *S. haematobium* como o *S. mansoni* podem ocorrer.

12 — Os vermes atingem os pulmões pela artéria pulmonar* e são usualmente arrastados como êmbolos a cavaleiro à bifurcação do vaso. Ainda que banhados em sangue venoso êles morrem rapidamente. Enquanto vivos, não produzem alterações estruturais, mas o verme morto é altamente tóxico, causando necrose da artéria e uma pneumonia aguda focal necrotizante. Mais tarde, o exsudato pneumônico é reabsorvido e cicatrizado, mas o verme morto torna-se calcificado e envolto num tecido cicatricial.

Os estudos de Shaw e Ghareeb, de real importância do ponto de vista etiopatogênico e anátomo-patológico, serão referidos mais pormenorizadamente em outra parte dêste trabalho.

A seguir, resumimos os dados mais importantes dos 6 casos por êles estudados sob a rubrica de “moléstia de Ayerza esquistosomótica”, adiantando que nenhum dêles fôra diagnosticado em vida.

CASOS DE SHAW E GHAREEB ESTUDADOS SOB A RUBRICA DE MOLÉSTIA DE AYERZA

Caso n.º 1 — N.º 7 na série dos autores — Sexo: masculino; idade: 18 anos. *Dados clínicos* — Morto em insuficiência cardíaca congestiva. Anasarca. Ascite. *Dados anátomo-patológicos* — Esplenectomizado. Congestão passiva crônica de tôdas as vísceras. Coração: 430 gr. Dilatação da aurícula direita e do ventrículo, que também estava hipertrofiado. Tronco da artéria pulmonar normal. Válvulas normais. Cirrose hepática adiantada. Varizes esofageanas, cirrose do pâncreas. Esquistosomose do grosso intestino (*S. m.*). Lesões esquistosomóticas da bexiga, uréter e vesículas seminais. Lesões arteriais pulmonares difusas. Arteriolite obliterante. Angiomatóides. *Espécie de ovos identificada nos pulmões* — *S. mansoni* exclusivamente.

* Leôncio Pinto assinalou a localização venosa dos vermes adultos (vide Meira).

CASO n.º 2 — N.º 8 na série dos autores — Sexo: feminino; idade: 12 anos. *Dados clínicos* — Quadro clínico de insuficiência cardíaca congestiva. Morte súbita 10 dias após série de fuadina. *Dados anátomo-patológicos* — Congestão passiva crônica das vísceras. Coração: 290 gr. Dilatação e hipertrofia do ventrículo direito, que é mais espesso que o esquerdo. Não há ateroma da artéria pulmonar. Válvulas normais. Cirrose hepática esquistosomótica. Varizes esofageanas. Esplenomegalia (250 g). Esquistosomose do grosso intestino, uréter e bexiga. Numerosos ovos *S. h.** na bexiga e de *S. m.*** no intestino. As mesmas lesões arteriolares do caso anterior (7), porém mais extensas. Angiomatóides mais numerosos, maiores; miohipertrofia arterial maior e túnica adventicial mais espessa. *Espécie de ovo identificada nos pulmões* — *S. haematobium* exclusivamente.

CASO n.º 3 — N.º 9 na série dos autores — Sexo: masculino; idade: 25 anos. *Dados clínicos* — Dispnéia de esforço, palpitação, edema das pernas e abdome, começando os sintomas gradualmente 1 ano antes e agravando-se nos últimos 2 meses. Morte em insuficiência cardíaca 4 dias após a hospitalização. *Dados anátomo-patológicos* — Congestão passiva crônica das vísceras. Coração: 400 gr. Dilatação e hipertrofia do ventrículo D. Válvulas normais. Artéria pulmonar e seus dois ramos com ateroma. Cirrose hepática adiantada. Varizes esofageanas. Cirrose pancreática e grande esplenomegalia. Polipos esquistosomóticos do grosso intestino. Esquistosomose discreta dos uréteres e bexiga. Numerosos ovos de *S. mansoni* no cólon e de *S. haematobium* na bexiga. Numerosos pseudotubérculos parenquimatosos e extenso comprometimento das artérias, só algumas escapando. Extremo grau de arteriolite obliterante. Espessamento grande da adventícia em todos os vasos. Angiomatóides pouco numerosos. *Espécie de ovo identificada nos pulmões* — *S. mansoni* exclusivamente.

CASO n.º 4 — N.º 10 na série dos autores — Sexo: feminino; idade: 13 anos. *Dados clínicos* — Dispnéia, palpitação, 1 mês de duração. Morte em insuficiência cardíaca 3 dias depois da hospitalização. *Dados anátomo-patológicos* — Congestão passiva crônica de todas as vísceras. Coração: 210 gr. Lado direito fortemente dilatado. Válvulas normais. Ausência de ateroma das artérias pulmonares e seus ramos. Esquistosomose peritonal do epíplon. Cirrose pancreática. Cirrose hepática esquistosomótica. Esquistosomose intestinal com polipos no intestino grosso. Enorme número de ovos de *S. mansoni* nos órgãos afetados. Caso puro de infecção *S. mansoni*. Ausência de ateroma dos ramos pulmonares que ao corte mostram espessamento fibroso difuso. Todas as artérias de 1-2 mm aparecem como estrias brancas espessas e em volta dos menores vasos estão agrupados nódulos brancos miliares em linha ou grupos, microscopicamente idênticos aos encontrados no caso anterior (9), com maior número de ovos e maior comprometimento vascular. Menor espessamento das adventícias das artérias hipertrofiadas. Angiomatóides pouco numerosos. Grande número de ovos atingindo recentemente os pulmões. *Espécie de ovo identificada nos pulmões* — *S. mansoni* exclusivamente.

CASO n.º 5 — N.º 11 na série dos autores — Sexo: masculino; idade: 21 anos. *Dados clínicos* — Dispnéia intensa, cianose, edema, dor no fígado; os sin-

* *S. m. Schistosoma mansoni.*

** *S. h. Schistosoma haematobium.*

tomas datam de 3 anos e são progressivamente piores. Edema do braço direito acentuado. *Dados anátomo-patológicos* — Congestão passiva crônica de tôdas as vísceras. Veias axilar direita e subclávia trombosadas. Coração: 450 gr. Válvulas normais. Lado direito grandemente dilatado e hipertrofiado. Seis pequenos trombos murais na auriculeta direita. Fibrose subendotelial do endocárdio do ventrículo direito. Íntima da artéria pulmonar e seus dois ramos com fibrose e ateroma. Aorta livre de ateroma. Fígado não cirrótico. Baço não aumentado. Esquistosomose vesical e ureteral. Ovos de *S. haematobium* na bexiga, ureteres, vesículas seminais e intestino. Ramos primários da artéria pulmonar dilatados e ateromatosos, e pequenas divisões espessadas e rígidas. Este caso demonstra a presença de lesões cicatrizadas (curadas) e os efeitos da prolongada obstrução vascular. Fora alguns poucos tubérculos parenquimatosos recentes, os numerosos ovos são quase todos calcificados, impregnados com ferro e encerrados ou nas cicatrizes parenquimatosas ou na adventícia espessada das artérias. A maior parte das artérias obliteradas foram convertidas em angiomatóides. *Espécie de ovo identificada nos pulmões* — *S. mansoni* exclusivamente.

CASO n.º 6 — N.º 12 na série dos autores — Sexo: masculino; idade: 25 anos. *Dados clínicos* — Inexistentes. O paciente faleceu no dia seguinte ao da hospitalização. *Dados anátomo-patológicos* — Cianose. Edema e derrame de tôdas as cavidades serosas. Congestão passiva crônica extrema de todos os órgãos. Coração direito muito dilatado e ventrículo direito hipertrofiado. Na auriculeta direita há 2 trombos murais. Ausência de lesões valvulares. Aorta normal. Artéria pulmonar com placas ateromatosas com espessamento fibroso difuso microscopicamente da íntima. Fígado não cirrótico. Baço não aumentado. Intestinos sem lesões esquistosomóticas. Ureteres espessados e estreitados por tecido cicatricial produzindo moderado grau de hidronefrose. Bexiga espessada e contraída. Vesículas seminais aumentadas, nodulares e com tecido cicatricial espesso. Moderado número de ovos *S. haematobium* na bexiga. Apenas 1 ovo na vesícula seminal. Todos os ovos calcificados. Tudo indica esquistosomíase cicatrizada (curada) típica, mas a extensão e gravidade das lesões são fora de toda proporção ao número de ovos e, evidentemente, muitos deles desapareceram. Isto é importante, com respeito às alterações pulmonares. Não há ovos no pulmão. Todos os ramos da artéria pulmonar abaixo aos vasos de 2-3 mm são espessados, rígidos e distendidos pelo ateroma. Este é o caso mais adiantado da série, em que tôdas as lesões são cicatriciais e os ovos desapareceram. Os tubérculos parenquimatosos reduziram-se a cicatrizes e os ovos não atingem os pulmões há muito tempo. A maior parte das artérias obliteradas transformaram-se em angiomatóides. *Espécie de ovo identificada nos pulmões* — *S. haematobium* (?).

Entre 1935 e 1939 Mainzer dedicou diversos trabalhos ao estudo da esquistosomíase pulmonar, estudando-a sobretudo do ponto de vista clínico e radiológico. Em trabalho publicado em 1938 e versando sobre "Clinical Aspects of Pulmonary Diseases Induced by *Schistosoma haematobium* and *mansoni*", Mainzer²⁸ sistematizou nos seguintes quadros as manifestações clínicas pulmonares encontradas nas esquistosomíases:

- a) Sintomas pulmonares iniciais agudos do período tóxico inicial (Lawton-Fairley).

- b) Esquistosomíase pulmonar isolada sem comprometimento clínico da bexiga ou intestino (Mainzer).
- c) Comprometimento pulmonar latente acompanhando a esquistosomíase terciária, demonstrado pelos raios X (Mainzer, Yaloussis, Mainzer).
- d) Insuficiência da circulação pulmonar devida às alterações dos vasos sanguíneos, de natureza esquistosomótica (S. Azmy, Pacha, Clark e Graef).
- e) Asma esquistosomótica (Suarez, Mainzer).

Meira²⁰ no seu citado trabalho (1942) e Suarez e Hernández Morales (1944)⁵⁰ comentaram e criticaram esta esquematização; mas, do ponto de vista que nos interessa no momento, devemos apenas dizer que Mainzer não contribuiu com nenhuma observação pessoal de arterite pulmonar esquistosomótica, limitando-se a citar os estudos de Azmy, Clark e Graef e Day, a que já nos referimos, segundo os quais a esquistosomíase pulmonar pode se manifestar por um quadro clínico de insuficiência cardíaca direita, devido às lesões de arterite pulmonar e consequente à hipertensão do regime circulatório pulmonar.

Num trabalho datado de 1939 Jaffé²⁰, na Venezuela, estudou 6 casos de esquistosomíase pulmonar, descrevendo lesões endarteríticas pulmonares mais ou menos intensas associadas a nódulos miliares esquistosomóticos difusos no parênquima pulmonar. O citado autor, entretanto, considerou a esquistosomíase pulmonar como de pequena importância prática em vista da sua baixa frequência (2% dos casos), pela sua inconstante gravidade e pelo fato de coexistir sempre com lesões graves de outros órgãos, opinião essa que o autor, em trabalhos posteriores, parece, até certo ponto, disposto a modificar. Em trabalhos ulteriores (1944-1948), Jaffé^{21, 22} voltou ao mesmo assunto, afirmando que em 50 casos de esquistosomíase mansonii, com exame sistemático dos pulmões, encontrou 12 vezes, ou seja em 24% deles, lesões produzidas pela presença local dos ovos nos pulmões. As lesões vasculares nos pulmões dos esquistosomóticos estudados por Jaffé revestem o aspecto de uma endo e periangeíte, que o autor descreve como lesões que afetam todas as túnicas da parede vascular, em extensão irregular, atingindo preferentemente o endotélio ou, outras vezes, as camadas externas. A íntima é aumentada em forma circular até a estenose ou oclusão completa da luz, ou em forma mais circunscrita com placas unilaterais proeminentes, que também podem estreitar a luz vascular. Daí, segundo Jaffé, vários autores descreverem estas lesões como uma endarterite obliterante. As lesões da adventícia, continua Jaffé, são também produtivas até ao desenvolvimento de uma neoprodução muito mais extensa que o diâmetro do próprio vaso; pode ser, também, circular ou segmentar, muitas vezes com um ou vários nódulos esquistosomóticos, mas, também sem eles. Algumas vezes lembram o aspecto da periarterite nodosa, porém muitas vezes são muito mais extensas que elas. Há uma infiltração linfocitária mais ou menos extensa. "Em resumo, trata-se de uma panarterite produtiva, que pode produzir uma estenose até à oclusão da luz. A lesão está geralmente localizada nos ramos arteriais, mas pode-se encontrar também nos ramos venosos".

Parece certo, prossegue Jaffé, que lesões tão extensas e graves possam ter importância clínica. A estenose e oclusão de grande número de vasos dificultam

a circulação e em consequência aumentam o trabalho do coração, com hipertrofia ou dilatação.

Se os vasos pulmonares forem atingidos exclusiva ou preferentemente, torna-se maior o trabalho do coração direito, com as mesmas consequências para o ventrículo direito.

A relação da gravidade das lesões esquistosomóticas pulmonares com a de outros órgãos, é evidenciada pelos seguintes dados fornecidos por Jaffé (1944)²¹, baseado no exame de 50 casos de esquistosomose comprovada, dos quais 12 (24%) com lesões pulmonares. Em 50% dos casos com esquistosomíase pulmonar havia cirrose hepática e esplenomegalia e em 33% lesões de miocardite. Nos casos de esquistosomose, porém, sem lesão pulmonar da mesma natureza, a cirrose hepática foi encontrada em 25%, a esplenomegalia em 8% e a miocardite em 8%.

Em outra parte deste trabalho voltaremos a considerar os estudos de Jaffé sobre a anatomia patológica das lesões pulmonares da esquistosomíase mansonii, quando discutiremos a interpretação dada por este autor a essas alterações patológicas. Também reservaremos para mais adiante a discussão da significação clínica destas lesões, que Jaffé (1948)²² considera “de grande interesse tanto para os problemas teóricos como para o estudo patogênico, porém de pouca importância clínica”.

Koppisch²⁴, no seu excelente estudo sobre a anatomia patológica da esquistosomíase mansonii em Porto Rico, publicado em 1941, encontrou lesões pulmonares esquistosomóticas em 4,3% dos casos de infecção mínima, em 23,8% dos casos de infecção parasitária moderada e em 63,6% dos casos de infecção grave. Descrevendo as alterações pulmonares, cita a observação de um caso de uma menina de 14 anos, com antecedentes sugestivos de esquistosomíase datando de muito tempo, e que se queixava, entre outras coisas, de tosse e suores noturnos e dores torácicas. Ela apresentava ao exame físico hepato-esplenomegalia. O exame do sangue revelara anemia, leucopenia e eosinofilia. A paciente fôra submetida a tratamento pela Fudadina e após a 5.^a injeção apresentou febre (37,8°). Três dias depois a febre ainda persistia, a frequência respiratória se acelerou, e apareceram sinais de condensação pulmonar na base direita. A tosse persistiu, aparecendo escarros sanguinolentos em duas ocasiões. O tratamento antimonial prosseguiu. Depois de mais três injeções a tosse se intensificou e apareceram vômitos. Doze horas após a terceira destas injeções sobrevieram dispnéia e cianose, o que foi seguido de morte, meia hora mais tarde.

Na autópsia foram encontrados pequenos nódulos firmes, palpáveis nos dois pulmões, principalmente nos lobos inferiores. Ao corte, o parênquima era vermelho vivo e pontilhado de minúsculos grânulos acinzentados reluzentes, medindo 1 mm de diâmetro e distribuídos tanto isoladamente como em grupos. Existiam também focos maiores amarelados e áreas de consolidação. Os grânulos cinzentos eram distribuídos em ambos os pulmões, do ápice à base, e não podiam ser diferenciados de tubérculos miliares. Os gânglios linfáticos hilares eram muito aumentados e intensamente congestos. Microscopicamente verificou-se que os pequenos grânulos cinzentos eram pseudotubérculos esquistosomóticos em várias fases de evolução, mas na maioria circundados por uma cápsula fibrosa bem delimitada e com infiltração periférica de linfócitos e eosinófilos e ocasionais plasmócitos.

Havia áreas de hemorragia nos alvéolos e zonas de broncopneumonia com os alvéolos cheios de fibrina e leucócitos, na sua maior parte representados por

eosinófilos. Em muitos campos eram visíveis vermes necrosados dentro das veias, e as paredes desses vasos estavam parcialmente necrosadas e disseminadas de eosinófilos. Em pontos distantes dos vermes necrosados os alvéolos mostravam-se hemorrágicos e continham densos acúmulos de eosinófilos, linfócitos e grandes mononucleares. Havia, da mesma maneira, alterações evidentes nos pequenos ramos das artérias pulmonares, com ovos nas paredes e fibrose da íntima, resultando em obliteração total da lúmen em vários pontos. Estas feições vasculares do caso, escreve Koppisch, eram idênticas àquelas do de Clark e Graef, que já citamos. Nesse caso de Koppisch havia ainda cirrose hepática adiantada e esplenomegalia aguda moderada. Ovos de trematódeo (*S. mansoni*) eram numerosos no cólon, no fígado e pulmões, e muitas vezes formavam o centro de um pequeno foco necrótico. Comentando este caso, diz o autor que é possível que a morte da paciente resultasse da sensibilização provocada pelos produtos dos vermes mortos e embriões, como consequência do vigoroso tratamento. Os vermes e grande número de ovos encontrados nos pulmões deveriam ter aí chegado pelo plexo hemorroidário inferior, via veia cava inferior.

Em 1943, Koppisch assevera que a arterite pulmonar esquistosomílica é uma grave, ainda que rara, manifestação, e constitui antes uma complicação do que uma parte integral da história natural da moléstia, conceito com o qual concordamos inteiramente e que um de nós (Meira)²⁹ já em 1941 havia defendido.

Do ponto de vista clínico, alicerçados em estudos anátomo-patológicos de outrem, coube a Silveira⁴⁴ (Bahia), em trabalho vindo a lume em 1941, e a Meira²⁹, em monografia apresentada à Associação Paulista de Medicina em 1940 e publicada em 1942, estudar, no Brasil, as formas cardíopulmonares da esquistosomose mansoni.

Silveira, após discutir as alterações anátomo-patológicas da esquistosomíase pulmonar, ilustrando-as com preparações que evidenciam, entre outras, as lesões de arterite obliterante pulmonar nesta parasitose, tratou, no seu trabalho citado, dos "distúrbios vasculares" que se fazem nos domínios da artéria pulmonar, criando "síndromes circulatórias", expressos pelo autor da seguinte forma:

"Quando se repara no número considerável de ramos arteriulares espessados e mesmo obstruídos pela ação irritante dos ovos do esquistosomo, logo se depreende que a circulação pulmonar deve estar profundamente modificada. A onda sanguínea, que corre pela artéria pulmonar, encontra assim uma considerável barreira na periferia. Surge então a turgescência vascular — que justifica o exagero do desenho pulmonar nas radiografias — aparece a dilatação do próprio tronco da artéria (*pulmonarite*), e podem surgir mesmo fenômenos de cianose que caracterizam os "cardíacos negros" de Ayerza, exatamente como haviam mostrado os dados de autópsia publicados por Shaw e Ghareeb".

"Os sinais clínicos então observados podem se limitar a meros achados radiológicos, quando incipientes, mas também podem chegar a insuficiência do coração direito, com tôdas as suas graves consequências".

Entre as suas observações, Silveira inclui a de um paciente de 40 anos, que apresentara antes sintomas de insuficiência cardíaca, que desapareceram com a medicação adequada e que no momento de ser visto pelo autor apenas se queixava de ligeira dispnéia de esforço.

Não apresentava sintomas pulmonares, como tosse e expectoração, e os sinais de descompensação cardíaca verificados em outro serviço clínico já haviam desa-

parecido. O exame revelou aumento da área cardíaca com o ictus deslocado para baixo e para fora, frêmito na região precordial e sôpro intenso no foco pulmonar (não há na observação referência à qualidade do sôpro). O exame do aparelho respiratório resultou negativo. Hepato-esplenomegalia. Ovos de *S. mansoni* nas fezes. Ao exame radiológico do tórax havia: "exagêro na densidade e riqueza do desenho pulmonar, vendo-se muito vultoso o hilo direito. Imagem cardíaca aumentada à custa das cavidades direitas e esquerdas. Acentuada projecção do contôrno da pulmonar, melhor apreciável na grafia em O. A. D."

Uma outra doente estudada por Silveira, foi o caso de uma mulher de 50 anos, procedente de importante foco de esquistosomíase (Jequié) e que, após uma "gripe" com febrícula, tosse intensa e expectoração abundante, queixava-se de ligeira dispnéia de esforço e persistência da tosse e expectoração. Ao exame físico foi verificada a existência de estertores sibilantes e roncantes em ambas as bases. Refôrço do segundo tom pulmonar. Bulhas cardíacas um tanto abafadas. Hepatomegalia, sendo o fígado doloroso. Exame de fezes positivo para grande quantidade de ovos de *S. mansoni*. Exames repetidos de escarro negativos. A radiografia mostrou o seguinte aspecto: "transparência alveolar grandemente sacrificada não só pelo exagêro do desenho pulmonar como pela presença de sombras miliares dispersas pelos 2/3 inferiores de ambos os pulmões. Ao lado disso, uma acentuada projecção do contôrno da pulmonar, com imagens hilares (principalmente à direita) volumosas e muito densas".

Em 1944 Silveira⁴⁵, num trabalho de síntese sobre o mesmo assunto, reedita seu ponto de vista.

Meira, na sua já citada monografia, estudou as formas pulmonares da esquistosomíase mansoni e apresentou a seguinte esquematização clínica, aceita posteriormente por Silveira, Faust, Renato Lobo, Rodrigues Silva e outros:

Meira, após criticar a denominação de moléstia de Ayerza esquistosomótica (Shaw e Ghareeb), propõe-lhe a denominação de arterite pulmonar obliterante esquistosomótica, de Shaw e Ghareeb.

De acôrdo com esta esquematização, a forma cárdio-pulmonar da esquistosomíase mansoní, única que nos interessa no presente trabalho, e representada pela arterite pulmonar esquistosomótica, pode se apresentar ou de maneira *latente*, desacompanhada de sintomatologia clínica e só evidenciada por exames radiológicos ou subsidiários, e a forma acompanhada de sintomas clínicos, traduzindo-se por um quadro de insuficiência cardíaca onde predominam os sintomas próprios da insuficiência cardíaca direita.

Entre as 4 observações estudadas por Meira, uma, a observação n.º 2, referia-se a um caso de um indivíduo de 31 anos, natural do Estado da Bahia, de foco conhecido de esquistosomíase, com história provável de contágio pelo *S. mansoní* bem narrada nos seus antecedentes, e que se internou no hospital referindo um longo passado mórbido, no qual se destacam múltiplas infecções poliverminóticas.

Desde a sua infância era o paciente vítima de perturbações digestivas com crises disenteriformes e edemas condicionados por anemia verminótica e hiponutrição. Ao exame físico o paciente apresentava, digno de nota, discreta ascite, hepatomegalia, enorme esplenomegalia. Ao exame do aparelho circulatório verificou-se ictus cordis visível no 6.º espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, localizado, rítmico, fraco. Ausculta da 2.ª bulha hiperfonética e desdobrada no foco pulmonar. Demais bulhas normais. Pulso — 66 batimentos por minuto. P.A. — 118-78.

O exame de fezes foi positivo para grande número de ovos de *S. mansoní*, alguns ovos de *Ascaris lumbricoides* e *Necator americanus*.

O exame hematológico revelou uma anemia normocítica normocrônica. Reação de Takata positiva. Urubilinogênio a 1:20.

O exame eletrocardiográfico revelou: desvio do eixo elétrico para D., e a radiografia do coração: coração medindo aproximadamente 350 cm³, o que representa um excesso de 40% sobre o normal para o peso, idade e sexo. Saliência pronunciada da via do deflúvio do ventrículo D., com dilatação do tronco da pulmonar. Viva pulsabilidade sistólica do arco da pulmonar. Espessamento difuso do desenho vaso-brônquico, dirigindo-se dos hilos para a periferia dos campos pulmonares. Seios e cúpulas livres.

Diagnóstico: aumento do coração com predominância direita. Hipertensão pulmonar.

O exame de escarro foi positivo depois de várias tentativas, conseguindo-se encontrar numa ocasião um ovo de *S. mansoní*.

Baseado no fato de se tratar de um paciente com a forma hepato-esplênica de esquistosomíase mansoní, com aumento das cavidades direitas do coração e sinais de hipertensão pulmonar, desvio do eixo elétrico para D. ao eletrocardiograma e presença de ovos de *S. mansoní* no escarro, Alves Meira catalogou o seu caso como de arterite pulmonar esquistosomótica.

E' interessante assinalar que, neste caso, um dos primeiros a serem diagnosticados em vida e com exame de escarro positivo para *S. mansoní*, faltavam os sintomas declarados de insuficiência cardíaca (cianose, dispnéia, edema, conges-

tão visceral, etc.), havendo apenas leve aumento da pressão venosa, e foi por isto que o autor citado (Meira) concluiu tratar-se de uma forma de endarterite pulmonar esquistosomótica clinicamente latente — em que o quadro de hipertensão pulmonar não atingiu seu completo desenvolvimento, tendo sido o paciente surpreendido antes do aparecimento dos sintomas cardíacos que marcam a sua fase terminal.

Sob o título de "Bilharzial Ayerza's Disease", Mousa³⁵ publicou em 1912 um caso de forma cárdio-pulmonar de esquistosomíase, cujo resumo é o seguinte: Tratava-se de um lavrador egípcio, de 36 anos, que se queixava de dispnéia e palpitação, que o vinham perturbando há 2 anos. A dispnéia e palpitação sobrevinham a princípio após esforço moderado ou súbito. Alguns meses depois, além destes distúrbios, sobrevieram tosse seca noturna e vertigens, que obrigavam o paciente a permanecer sentado no leito até melhora da dificuldade respiratória.

No seu passado mórbido nada digno de nota, estando ausentes os antecedentes maláricos, reumáticos, sífilíticos, disentéricos e esquistosomóticos vesicais.

Os dados mais importantes do exame físico resumem-se no seguinte: indivíduo de constituição média, com palidez terrosa da pele. Ausência de dispnéia em repouso e de cianose mesmo após exercício; dedos e artelhos ligeiramente hipocráticos. Ausência de edemas periféricos. Temperatura 37°. Pulso 92, acelerando-se até 160 com moderado esforço. Veias jugulares ligeiramente túrgidas em decúbito, mas sem refluxo hepato-jugular. Ao nível do 2.º espaço intercostal esquerdo via-se uma pulsação forte e palpava-se um choque diastólico. Aumento da área cardíaca, principalmente em correspondência à ponta e lado direito do contorno cardíaco. À ausculta, as bulhas cardíacas estavam normais, com exceção da 2.ª, que era acentuada e desdobrada no foco pulmonar. Nos focos tricúspide e pulmonar ouvia-se um fraco sopro sistólico com pequena propagação para cima e à esquerda. O abdome se mostrava moderadamente distendido, sendo o fígado ligeiramente aumentado, mas indolor. O baço era palpável 5 ou mais dedos abaixo do rebordo costal esquerdo. O cólon sigmóide se mostrava móvel à palpação, mas de parede endurecida. Ao exame de fezes encontrou-se ovos de *Ancylostoma* e *S. mansoni*. A reação de Wassermann foi negativa. O paciente não eliminava escarro para permitir a pesquisa de ovos nesse material. O exame sigmoidoscópico revelou a presença de ulcerações e pequeno papiloma na porção inferior do reto. Pela raspagem da mucosa obteve-se ovos de *S. mansoni* de mistura com muitas hemácias. O exame hematológico demonstrou: eritrócitos, 3.900.000; Hb, 65%; leucócitos, 7.000; eosinófilos, 11%; neutrófilos, 61%; linfócitos, 17% e monocócitos, 11%.

Ao exame radioscópico verificou-se, em posição ântero-posterior: aumento do diâmetro transversal do coração, principalmente à direita. No contorno esquerdo do coração observou-se que a artéria pulmonar estava muito dilatada, encobrindo o entalhe sub-aórtico. Ambos os hilos mostravam-se aumentados e densos, sugerindo estase pulmonar. Na 1.ª posição oblíqua o esôfago encheu-se normalmente e não havia dilatação da aurícula esquerda. Na 2.ª posição oblíqua o ventrículo direito estava muito aumentado e hipertrofiado. Na posição lateral, como também na posição oblíqua, foram vistas muitas calcificações arredondadas próximas ao hilo e estendendo-se para a periferia; elas correspondiam à distribuição da artéria pulmonar e daí supor-se que estas calcificações pertenciam aos ramos da-

quele vaso. Fora o que foi descrito observava-se um quadro de congestão e estase.

Eletrocardiograficamente foi verificado: desvio do eixo para a direita com T_2 pequeno e T_3 invertido. O tempo de circulação avaliado pelo método da sacarina foi registrado com 19 segundos (normal 9 a 14").

A determinação da saturação do oxigênio (método de Haldane) deu os seguintes resultados: Saturação do oxigênio do sangue venoso = 10 vol.% (normal 14%); saturação do sangue arterial = 16 vol.% (normal 19%); capacidade de oxigenação = 17 vol.% (normal 20%).

Na discussão deste caso Mousa atribui a falta de cianose e poliglobulia ao fato de que na esquistosomose cárdio-pulmonar as lesões, conforme os estudos de Shaw e Ghareeb, já citados, comprometem principalmente o sistema arterial, deixando em parte livre o parênquima e capilares pulmonares.

Em vista do fato de ter sido Azmy, como já acentuamos anteriormente, o primeiro autor a filiar o quadro clínico da arterite pulmonar à esquistosomíase, foi proposta na discussão que se seguiu à apresentação do caso de Mousa, a denominação de "Doença de Azmy" como sinônima de "Doença de Ayerza bilharziótica" (Kamel Yacoub), denominação que foi aceita nesta ocasião e que justificou a sua inclusão no sub-título do trabalho de Mousa.

Em 1943, Potenza³⁸, na Venezuela, estudou do ponto de vista anátomo-patológico 3 casos de esquistosomíase pulmonar, descrevendo não só as alterações alveolares e brônquicas como as verificadas nas arteríolas pulmonares, defendendo a sua especificidade.

Quanto às lesões vasculares, Potenza escreve que elas consistem "em um aumento de todas as camadas do vaso até a obliteração completa, faltando as infiltrações ou com muito poucas células. Em alguns vasos esta hipertrofia das paredes devia-se provavelmente à ação dos produtos do metabolismo parasitário, porque nêles não havia nem parasitos nem ovos. Em outros era atribuível visivelmente à ação irritativa do ovo sobre as paredes vasculares, cuja íntima tumefeita o englobava, formando uma célula gigante. Na adventícia encontram-se infiltrações de células redondas, plasmacélulas e eosinófilos, dispostos em forma de manguito ao redor do vaso e pigmento negro".

Suarez e Hernández Morales⁵⁰, em 1944, no seu estudo sobre a esquistosomíase pulmonar, registraram 5 observações, das quais 3 merecem ser resumidas.

A primeira diz respeito a uma menina de 12 anos, com cianose dos lábios e fadiga ao esforço, datando de 4 meses. Na anamnese havia informação de banhos em águas suspeitas e no passado da paciente referência a crises diarreicas. Ao exame físico os achados mais importantes foram:

- 1 — Moderada cianose dos lábios e unhas.
- 2 — Dedos hipocráticos das mãos e dos pés.
- 3 — Ausência de alterações pulmonares ao exame do aparelho respiratório.
- 4 — Coração: não aumentado. Thrill sistólico no ápice. Ritmo regular. Acentuação da 2.^a bulha pulmonar. Ausência de sopro.
- 5 — Esplenomegalia e hepatomegalia.

Exame hematológico: Eosinofilia (27%) com 4.100 leucócitos por milímetro cúbico. Hiperglobulinemia. Hanger 4 +. Takata 3 +. Fezes: ovos de *S. mansoni*. Rx dos pulmões: Pronunciado espessamento peribrônquico e exagêro do desenho brônquico normal, especialmente no lobo inferior D. Coração de tamanho normal. Ausência de dilatação dos grandes vasos. Eletrocardiograma normal. Pressão venosa 63 mm d'água. Tempo de circulação 8" (gliconato de cálcio).

A paciente foi submetida a tratamento com Fuadina, completando série de 50,5 cm³. Negativação do exame de fezes. Ocorrência de herpes zóster como complicação do tratamento antimonial.

Os exames radiológicos subsequentes dos pulmões não mostraram alterações. Os 10 exames de fezes feitos resultaram negativos para ovos de *S. mansoni*. Em resumo: caso de esquistosomíase mansoni em menina de 12 anos, com cirrose do fígado e esplenomegalia complicada por hipertensão da circulação pulmonar, manifestada por cianose, dedos hipocráticos, acentuação da 2.^a bulha pulmonar, demonstração de fibrose do parênquima pulmonar aos raios X. O tratamento resultou na negativação dos exames de fezes, mas não alterou o quadro radiológico pulmonar.

O 2.^o caso diz respeito a uma menina branca, de 11 anos, que durante 6 meses, na idade de 3 anos, sofreu de diarreia sanguinolenta, com náuseas, vômitos, febre, cefaléia e edema das pernas. Depois de alguma melhora, um ano mais tarde, apresentou aumento de volume do ventre, anorexia e cólicas abdominais frequentes. Surto diarreicos repetidos. Ao exame físico os dados mais importantes registrados foram:

- 1 — Ausência de alterações pulmonares à percussão, palpação e ausculta.
- 2 — Coração não aumentado à percussão. Hiperfonese nítida da 2.^a bulha no foco pulmonar. Ritmo cardíaco normal. Ausência de sopros.
- 3 — Abdome globuloso, com veias superficiais dilatadas visíveis. Sinais de ascite. Fígado aumentado, principalmente o lobo E., sendo palpável 5 dedos abaixo do rebordo costal, de consistência dura e sensível à pressão. Baço aumentado, ocupando quase completamente o lado E. do abdome, de consistência moderadamente endurecida, mas liso.
- 4 — Dedos hipocráticos, dos pés e das mãos. Ligeira cianose.

Anemia (Hm. 2.740.000; Hb. 52%, 7,6 gr); leucócitos, 6.600; eosinófilos, 3%; hiperglobulinemia (10,76 mg% — proteínas totais 13,0 gr%); soroalbuminas, 2,24%; Hanger 4 +; Takata-Ara 3 +; formol-gel positiva em 30 segundos. Exame de fezes: positivo para ovos de *S. mansoni* e também *T. trichiurus*, *A. lumbricoïdes* e *S. stercoralis*.

Raios X: pulmões com infiltração atípica, mais intensa no lado D., com acentuado aumento do hilo direito. Coração: ligeiro aumento à D. e E. Eletrocardiograma: moderada predominância ventricular D. Retossigmoidoscopia: nu-

merosas pequenas ulcerações com hiperemia. Mucosa friável. A paciente foi tratada com ferro e Fuadina, fazendo um total de 28,5 cm³ deste composto. As fezes ficaram negativas. Raios X dos pulmões após tratamento, sem modificação.

Em resumo: Menina de 11 anos, com esquistosomose mansonii, com cirrose do fígado, esplenomegalia, dedos hipocráticos e cianose das extremidades; hiperfonese da 2.^a bulha no foco pulmonar, infiltração do parênquima pulmonar mais pronunciada no lado D., aumento da sombra hilar D. e moderada preponderância ventricular D. Os ovos de *S. mansonii* desapareceram das fezes após o tratamento com Fuadina, mas sem haver melhora no quadro geral ou no exame radiológico dos pulmões e coração.

O terceiro caso é de uma adolescente de 15 anos, branca, procedente de foco de esquistosomíase mansonii e com antecedentes suspeitos de infecção adquirida em banhos durante a primeira infância. Nos últimos três anos foi notado aumento do volume do ventre e a paciente percebeu uma tumoração no abdome superior E. Não apresenta sintomas digestivos atuais ou passados. Dados mais importantes do exame:

- 1 — Pulmões normais à percussão, palpação e ausculta.
- 2 — Coração de tamanho normal. Ritmo regular. Pronunciada acentuação da 2.^a bulha pulmonar.
- 3 — Abdome muito proeminente, de forma globular, com veias superficiais dilatadas, visíveis. Baço enormemente aumentado, ocupando cerca de 3/4 do abdome, duro, não doloroso, de superfície lisa. Fígado palpável 2 dedos abaixo do rebordo costal D., duro, não doloroso, mas de superfície ligeiramente nodular.
- 4 — Extremidades não cianóticas, mas com esbôço de dedos hipocráticos nos pés e mãos.

Exames de laboratório: Hm. 3.350.000; Hb. 63%; 9,1 g; leucócitos, 2.450; eosinófilos, 8%; proteínas totais, 9,46; sôro-albumina, 4,60; sôro-globulina, 4,96. Hänger positivo 3 +; Takata-Ara 3 +. Fezes: positivo para ovos de *S. mansonii* e *A. lumbricoides*.

Radiografias do coração e pulmões: Aumento do hilo D. e proeminência do cone arterial. Eletrocardiograma: Moderado desvio do eixo para D.

Pressão venosa, 80 mm d'água. Tempo de circulação 15" (gliconato de cálcio). A paciente foi submetida a tratamento ferruginoso e antimonial. Fêz uma série de 35 cm³ de Fuadina, com negatificação dos exames de fezes para ovos de *S. mansonii*. Ocorrência de manchas purpúricas nas pernas e pés, que desapareceram após o uso de vitamina A e C. Repetidos exames radiológicos não mostraram alterações pulmonares e cardíacas em relação aos anteriores.

Em resumo: Adolescente de 15 anos, com esquistosomíase mansonii complicada por cirrose do fígado, esplenomegalia, dedos hipocráticos sem cianose, pronunciada acentuação da 2.^a bulha pulmonar, proeminente cone da pulmonar, aumento da sombra hilar D. e moderado desvio do eixo para D. A Fuadina fêz desaparecer os ovos de *S. mansonii*, mas não alterou o quadro radiológico pulmonar e cardíaco. O aparecimento da erupção purpúrica foi atribuído a provável reação tóxica da Fuadina.

Comentando êsses casos, os AA. escrevem: "Os três casos acima descritos, demonstram definitivas evidências de hipertensão da circulação pulmonar e alterações parenquimatosas nos pulmões". Os AA. acreditam que esses pacientes representam um estágio moderadamente adiantado da síndrome de Ayerza, sendo o agente etiológico a esquistosomíase mansoni. Nestes 3 casos a repetida infecção verificou-se pelo banho em rios altamente infestados, mas, como se esperava, a Fuadina não alterou a patologia preexistente.

Depois da revisão do assunto e da apresentação dos seus casos pessoais, os AA. consideram que, para se estabelecerem as alterações pulmonares adiantadas, o fígado e o baço devem ser poderosamente afetados pela grande intensidade da infecção. Dêste modo, a formação de grandes veias colaterais, derivando a circulação porta, torna possível para os vermes e seus produtos invadirem diretamente o parênquima dos pulmões. Só êste fato poderá explicar a relativa raridade da esquistosomíase pulmonar clínica.

A escassez dos achados físicos pulmonares, contrastando com a intensidade e extensão dos dados radiológicos, é de grande interesse e de considerável importância, desde que é óbvio que somente pelo exame radiológico de rotina dos pulmões é que as alterações precoces reversíveis podem ser encontradas, em fase na qual o tratamento específico poderá parar ou erradicar a doença. Em suas conclusões, os citados AA. frisam que "a invasão dos pulmões pela esquistosomíase pode produzir alterações extensas e irreversíveis se o tratamento adequado não for aplicado em tempo oportuno. Ainda que não frequentemente encontrada, esta condição (esquistosomíase pulmonar) merece cuidadosa consideração da parte dos médicos que clinicam em países onde a esquistosomíase mansoni existe".

Baldo, Yopez, Mayer e Pifano, C.⁴, da Venezuela, em 1946, publicaram os primeiros resultados de investigações concernentes aos aspectos pulmonar e cardiovascular da esquistosomíase mansoni em uma área endêmica daquele país.

Procuraram os citados autores avaliar: "1.^o — Com que frequência podem-se encontrar quadros radiológicos em esquistosomóticos por meio de um exame sistemático dos pulmões e do coração, já que os estudos anátomo-patológicos realizados no país, demonstram lesões microscópicas nos pulmões na proporção de 24% das vezes (dados de Jaffé já referidos) e lesões macroscópicas em número muito menor. 2.^o — Com que aspecto se apresentam na radiografia tais lesões, no que respeita aos aparelhos respiratório e circulatório".

A área escolhida para estes estudos, San Casemiro, é um foco conhecido de esquistosomíase mansoni na Venezuela, e o estudo radiográfico do tórax foi feito principalmente na população juvenil local, com sua vida normal, sendo o exame radiológico complemento de um inquérito epidemiológico e acompanhado de exames parasitológicos das fezes, reação intradérmica, diagnóstica para esquistosomíase, sendo os examinados também controlados pela prova tuberculínica intradérmica.

Em 179 radiografias úteis, 82 (45,8%) apresentaram algumas anormalidades. Destas, 48 (26,8%) foram classificadas pelos AA. sob a rubrica de "desenho pulmonar aumentado e atípico", que êles interpretaram como de origem vascular, por causa de sua distribuição, a maior parte das vezes generalizada, e em relação com panarterite, tão frequentemente assinalada no material anátomo-patológico em indivíduos com infecção esquistosomótica.

Nesse grupo de pacientes foram verificados, como dados importantes, os seguintes: antecedentes de provável infecção esquistosomótica por banhos em águas contaminadas (79%), sintomas e sinais físicos sugestivos de esquistosomose em 75% dos casos, ovos de *S. mansoni* presentes em 42,8% dos casos, revelados por um único exame de fezes, e reação intradérmica positiva para esquistosomose em 69%.

As imagens rotuladas como micronódulos encontradas em 11 casos (6%) e as sombras exsudativas (2,2%), não foram consideradas importantes e requerem melhores estudos, segundo a opinião dos autores, para seu completo esclarecimento em relação às fases evolutivas da esquistosomose. De igual forma as calcificações (nódulos duros, 13,8%) e as imagens de pleurite residual (0,5%) não dependiam da esquistosomose, mas estavam em relação com uma infecção tuberculosa.

Do ponto de vista cárdio-vascular foram estudados 140 jovens entre 5 e 16 anos. Muitos deles queixavam-se de dispnéia de esforço, palpitações e o exame clínico revelou em alguns sopro sistólico na ponta ou no apêndice xifóide, de pequena intensidade, ou acentuação do 2.º ruído pulmonar. Em nenhum caso se constatou a existência de galope, estase jugular, edema, congestão hepática, quer dizer, manifestações de insuficiência cardíaca. Em 38 casos (27%), foram verificadas anormalidades radiológicas, a saber: em 2, coração globoso; em 6 casos, aumento cardíaco predominantemente E.; 9 vezes, aumento cardíaco com predomínio D.; em 11, aumento global e 10 vezes proeminência isolada do arco da pulmonar. Considerando-se a saliência do arco pulmonar associadamente a outras modificações de forma e tamanho cardíacos, encontraram-se 24 casos.

A frequência desse achado (saliência do arco pulmonar) foi verificada ser muito maior, quando comparada a 100 radiografias obtidas de jovens de 5 a 15 anos, de um Dispensário antituberculoso infantil, escolhidas ao acaso.

Após examinar as possíveis causas do encontro do alargamento do cone da pulmonar no material estudado, os AA. aceitam como possível explicação para o fato, a existência de uma discreta arterite pulmonar esquistosomótica, em sua etapa evolutiva.

Corroboram a opinião dos AA., de que a saliência do arco da artéria pulmonar estava relacionada a uma arterite pulmonar, as seguintes razões:

- a) exagêro do desenho vascular nos campos pulmonares, prova de que a circulação pulmonar estava alterada em uma idade em que intervém raramente, ou por causas facilmente diferenciáveis, transtornos na artéria pulmonar;
- b) é lógico supôr que a existência de uma boa porcentagem de casos cone da pulmonar saliente, mantenha alguma relação com a esquistosomose e em particular com a localização vascular pulmonar;
- c) a elevada incidência da deformação radiológica elimina as cardiopatias congênitas, que interessam o cone pulmonar;
- d) não se conseguiu demonstrar a presença de outras cardiopatias, que pudessem ser responsabilizadas pela anormalidade radiológica cardíaca.

Quanto às modificações da forma do coração, do coração globuloso em particular, verificado em 2 casos de seu material de estudo, e os casos de dilatação cardíaca D. e E., os AA. venezuelanos, com base nos estudos anátomo-patológicos de Jaffé, pensam poder filiá-los a uma miocardite esquistosomótica.

Mas, lembram que, nos casos com aumento do coração D., com saliência do arco pulmonar, é preciso ter em mente que uma arterite pulmonar que não repercute de modo nítido sobre o miocárdio na sua fase inicial, chega mais tarde a determinar uma hipertrofia direita reacional, como consequência da hipertensão existente na pequena circulação, pelo processo arterítico pulmonar. Isto é importante lembrar para responder como se diferencia uma arterite pulmonar esquistosomótica em sua segunda etapa, quer dizer, com hipertrofia cardíaca, de uma miocardite de predomínio direito — resposta difícil — que os AA. deixam para outro trabalho — mas que, adiantam, só poderá ser dada após passar em revista a sintomatologia de cada uma destas afecções, analisar a imagem radiológica, o eletrocardiograma etc.

É interessante assinalar que os AA. não verificaram alterações dignas de nota ao exame eletrocardiológico dos casos examinados a este respeito, e que pudessem traduzir lesões miocárdicas indubitáveis.

Em 7 casos foram encontrados desvio do eixo para E.; alguns com desvio marcado do eixo para D.; 3 casos com entalhes no QRS sem alargamento; 1 caso com S nas 3D. e alguns com diafasismo de T em CF₄. Mas os autores não informam em quantos nem em que casos o eletrocardiograma foi registrado.

Pelo fato de não terem verificado ao exame clínico e radiológico de 80 indivíduos adultos, de diferentes idades, nenhum caso de arterite pulmonar em contraposição com a frequência do mesmo achado no grupo juvenil analisado, os AA. julgam, não com muita razão, a nosso ver, que estas manifestações cárdio-vasculares podem ser reversíveis espontaneamente em alguns casos.

Dissemos que não com muita razão porque, a nosso ver, tal prova deve ser dada, não comparando grupos diferentes de indivíduos, como foi feito, mas só após o estudo evolutivo do processo, acompanhando-se por muito tempo estes casos com as alterações cárdio-vasculares. Poder-se-ia então admitir a reversibilidade das lesões, se estas observações viessem mostrar o desaparecimento das modificações apresentadas pelos pacientes em exames anteriores.

A maior crítica que se pode fazer, a nosso ver, ao inquérito realizado pelos autores citados, é a seleção do material. Pensamos que tal estudo deva ser feito em casos confirmados de esquistosomose mansonii (ex. fezes — biópsia retal ou intraderno reação positiva), só levando em conta estes casos. Incluir casos só epidemiologicamente suspeitos nos parece falsear os resultados finais. O trabalho dos AA. nos parece muito interessante, mas julgamos deva ser repetido, estudando-se os aspectos radiológicos (pulmonares e cárdio-vasculares) nos casos confirmados de parasitose. E dentre estes, ainda subdivididos de acordo com o grau e intensidade da infecção esquistosomótica e, por conseguinte, de acordo, também, com as manifestações clínicas da moléstia. Critério, aliás, sobre o qual Meira insistiu no seu aludido trabalho sobre as formas pulmonares da esquistosomose.

Apesar destes reparos, merece assinalar que a contribuição dos AA. venezuelanos não deixa de pôr em evidência a frequência com que é encontrada, numa

população altamente infestada pelo *S. mansoni*, as alterações radiológicas próprias da forma cárdio-pulmonar da esquistosomíase mansoni.

Em 1946, Bedford, Aidaros e Girgis⁶ publicaram um excelente trabalho sobre a cardiopatia esquistosomótica no Egito, a propósito de um bem documentado caso de "cor pulmonale" devido à endarterite pulmonar esquistosomótica. Tratava-se de um lavrador, de 34 anos de idade, que se queixava, há 3 anos, de dispnéia de esforço, tosse com ligeira expectoração e dor precordial, e que sofria de hematúria terminal há muitos anos.

Ao exame, o paciente mostrava-se dispnéico, mas não tinha cianose nem apresentava dedos hipocráticos. Não havia estase jugular nem edema periférico. A pressão arterial era normal (120-80). O choque da ponta estava na sua sede normal. Verificou-se uma pulsação visível e palpável no 1.º e 2.º espaços intercostais e obscuridade percutoria à esquerda do esterno nesta área. À auscultação a 1.ª bulha era acentuada e havia um sopro sistólico suave no ápice e uma 2.ª bulha pulmonar muito acentuada. O tórax era de forma enfisematosa, mas não apresentava ruídos adventícios ao exame. O baço e o fígado estavam aumentados e duros. O exame radiológico do tórax demonstrou uma dilatação aneurismática na região do tronco principal da artéria pulmonar, com desaparecimento do arco aórtico, e a artéria pulmonar direita, ao nível do hilo, mostrava uma dilatação de proporção aneurismática. Dilatação cardíaca direita e esquerda. Não havia fibrose pulmonar evidente ao exame. O exame de urina, além de albumina, piócitos e hemácias, mostrava ovos vivos de *S. haematobium*. O exame de fezes era positivo para ovos de ancilostoma. Reação de Wassermann negativa. A contagem sanguínea revelou: eritrócitos, 4.660.000 mm³; leucócitos, 7.800; polimorfonucleares, 62%; linfócitos, 26%; eosinófilos, 10%; monócitos, 2%.

Três semanas após a hospitalização, o estado do paciente piorou. Queixava-se de dor na região hepática, as veias do pescoço tornaram-se túrgidas, apareceu cianose marcada, e ruído de galope audível na ponta. O fígado aumentou de volume, apareceu icterícia, e o paciente faleceu poucos dias depois.

As mais importantes alterações macroscópicas foram encontradas ao nível da artéria pulmonar e seus ramos principais, que se achavam dilatados, de forma aneurismática. Havia espessamento das paredes dessas artérias e placas ateromatosas da íntima. A luz vascular estava cheia e quase ocluída por um trombo de certa duração. O ateroma estendia-se aos ramos arteriais pulmonares de médio calibre. Aorta hipoplástica, com ligeiro ateroma, mas sem evidência de aortite sífilítica. A aurícula direita e ventrículo direito dilatados, com uma capacidade três vezes maior que a normal. Hipertrofia nítida do ventrículo direito e hipertrofia da aurícula direita. Ventrículo esquerdo normal. Válvulas cardíacas íntegras. Ausência de defeitos septais. Histologicamente as arteríolas pulmonares mostravam-se espessadas e com marcada endarterite obliterante. Havia numerosos "angiomatóides" típicos da arterite pulmonar esquistosomótica, capilares cavernosos. Os ovos de esquistosoma foram encontrados em relação a algumas arteríolas: mostravam-se distorcidos, encarquilhados e algumas vezes incluídos em gigantócitos. No tecido intersticial os ovos eram escassos e calcificados. Ao corte histológico as artérias pulmonares mostravam ateroma e calcificação; espessamento da *vasa vasorum* adventicial e infiltração perivascular por linfócitos e plasmacélulas. Focos de infiltração da túnica média. Nos ramos principais trombo organizado de duração média. Aorta normal. Fígado com lesões de cirrose periportal do tipo esquistosomótico. Baço com o quadro histológico pró-

prio da esplenomegalia endêmica (esquistosomótica). Bexiga e cólon com depósitos de ovos calcificados na submucosa. Em resumo, o diagnóstico anatômico concluiu: Endarterite pulmonar esquistosomótica. Ateroma e dilatação aneurismática da artéria pulmonar e seus ramos principais, com oclusão trombótica. Hipertrofia e dilatação do coração direita. Cirrose do fígado; esplenomegalia esquistosomótica. Cistite esquistosomótica.

Em 1947, Renato M. Lobo²⁶ apresentou à Faculdade de Medicina da Bahia sua tese de concurso para a Cátedra de Clínica Médica, que versou sobre “Determinações cardíacas da esquistossomose mansônica”.

Entre as 20 observações que fundamentam o trabalho de Renato Lobo, duas apenas, as de n.º 3 e 15, se enquadram no diagnóstico de arterite pulmonar esquistosomótica.

O caso 3, de um alagoano de 27 anos que, após ter contraído paludismo continuou, apesar do tratamento, a se sentir febril, com tosse e expectoração. Sobreveio então edema dos membros inferiores e dispnéia, a princípio de esforço e depois permanente, dificultando também o sono.

O exame do aparelho circulatório revelou choque da ponta no 6.º intercosto na linha hemiclavicular. Hipofonese das bulhas nos focos da base, ouvindo-se melhor a 2.ª bulha nos focos tricúspide e mitral. Pulso a 96, regular. Pressão arterial 100-70. O exame do aparelho respiratório registrou hipersonoridade dos vértices com submacicez nos terços inferiores de ambos os pulmões, onde o frêmito se achava levemente diminuído. Sibilos e roncos generalizados. Estertores de médias bolhas. O exame do abdome foi prejudicado pelo estado exagerado de tensão da parede do ventre, motivo pelo qual os limites inferiores do fígado e do baço não puderam ser explorados.

O exame radiológico do tórax demonstrou “desenho pulmonar exagerado aos hilos, arborizando-se à direita, em direção da base. Arco médio esquerdo projetado, convexo, correspondendo à artéria pulmonar. Em O. A. D. o contorno anterior estava fortemente abaulado na sua porção superior, correspondendo à artéria pulmonar. Em O. A. E. havia pronunciamento dos arcos inferiores, anterior e posterior”. O eletrocardiograma não foi registrado. Exame de escarro negativo. Exame de fezes positivo para ovos de *S. mansoni*, além de acusar também ovos de *Ascaris lumbricoides*, *Trichocephalus trichuirus*, larvas e ovos de ancilostomídeos. O exame hematológico revelou discreta anemia hipocrômica, taxa normal de leucócitos, eosinófilos presentes e em porcentagem normal, linfocitose. Reação de Wassermann: negativa.

O paciente veio a falecer 4 meses mais tarde, em insuficiência cardíaca, mas do relatório da necrópsia consta apenas o exame macroscópico do coração e grandes vasos, faltando lamentavelmente o exame microscópico dos pulmões e artérias pulmonares.

Não obstante esta falha, Renato Lobo, discutindo o diagnóstico diferencial deste caso, admite como fator causal do “cor pulmonale” crônico a arterite pulmonar obliterante esquistosomótica.

O caso 15, uma moça de 21 anos, asmática desde pequena e sem outros antecedentes importantes além da frequência de banhos em águas de um riacho em sua terra natal (Areia, Bahia), internou-se, por causa da repetição mais amiudada de crises periódicas de dispnéia asmatiforme e dispnéia de esforço, após um resfriado febril, ao qual se seguiu também cianose. Queixava-se ainda desde algum tempo de tumoração no hipocôndrio esquerdo.

Os dados mais importantes do exame mostraram cianose dos lábios e extremidades. Ausência de edemas. Choque da ponta em sua sede normal. Hiperfonesse relativa da 2.^a bulha no foco pulmonar. Pulso a 130, regular. Pressão arterial 120-70. Hipersonoridade dos 2/3 inferiores em ambos hemitórax. Sibilos e roncocal difusos nos 2 pulmões. Fígado aumentado, chegando o limite inferior na cicatriz umbilical. Baço igualmente aumentado, duro, liso, com as suas chanfraduras nítidas. Sigmóide em corda. Exame de fezes positivo para numerosos ovos de esquistossoma e ascaris. Exame hematológico: anemia hipocrômica, leucopenia, ligeira eosinofilia. A radiografia do tórax em posição ânteroposterior revelou o hilo direito sobremodo denso; arco médio esquerdo pronunciado, campos pulmonares claros, em O.A.D., projeção acentuada do arco ântero-superior, correspondendo à artéria pulmonar. O eletrocardiograma evidenciou taquicardia sinusal e desvio do eixo elétrico para a direita.

A procedência da paciente de foco de esquistossomíase, a presença de hepatoesplenomegalia e da corda cólica sigmoideana, à que o autor considera sinal importante da parasitose, e a positividade do exame de fezes para ovos de *S. mansoni*, levaram o mesmo a admitir o "síndrome cardíaco negro" exibido pela paciente, como resultante da provável arteriolite pulmonar esquistossomótica.

Em 1948, Erfan¹⁴, da Faculdade de Medicina do Cairo, perante a "Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene", pronunciou uma conferência sobre a esquistossomíase pulmonar, expondo, de maneira clara e sucinta, o assunto sob todos os pontos de vista, a saber: histórico, incidência, anatomia patológica, quadro clínico, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Esta excelente síntese de Erfan recomenda-se a quem desejar um apanhado geral sobre o assunto, e dela nos vamos valer no decorrer deste trabalho. Ele menciona em sua comunicação Kenawy²³ (1947) como tendo também se ocupado da esquistossomíase pulmonar, mas o artigo deste autor não nos foi acessível.

Aly Sirry⁴⁶, em 1948 publicou um trabalho muito importante sobre a radiologia do "cor pulmonale" esquistossomótico.

O autor estudou 6 casos de "cor pulmonale" esquistossomótico, dos quais dois comprovados pela necrópsia. Estes 6 casos correspondiam o 0,22% do total de 2.642 pacientes admitidos no Hospital da Faculdade de Medicina de Alexandria, nos últimos 6 meses.

Caso I — Mulher de 20 anos, queixando-se de dispnéia de esforço e mau-estar após as refeições nos últimos 4 anos. Ela piorou nos últimos 12 meses e apresentava antecedentes antigos de uma infecção esquistossomótica (vesical e intestinal) que nunca fôra tratada. Ausência de antecedentes reumáticos e sifilíticos. Ao exame clínico a paciente mostrava-se pálida, emagrecida e fraca. O pulso batia 100 vezes por minuto, era regular, normalmente tenso. Pressão arterial 120-75. O exame do tórax revelou alguns roncocal disseminados pelos pulmões e crepitação nas bases, especialmente do lado direito. Choque da ponta no 5.^o espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Havia um frêmito sistólico e choque diastólico no foco pulmonar. À ausculta as bulhas cardíacas eram normais, exceto a 2.^a bulha pulmonar, que era acentuada e desdobrada. Havia um sôpro sistólico áspero no foco pulmonar e um sôpro sistólico fraco nos focos mitral e tricúspide. O fígado era aumentado, firme e liso. O baço era de consistência firme e 3 dedos abaixo da margem costal. Ascite presente. Ausência de edema nos membros inferiores.

Exames de laboratório: eritrócitos, 2.380.000; Hb. 40%; leucócitos, 5.200; eosinófilos, 20%. Pesquisas de plasmódio: negativa. Reação de Wassermann e Kahn: negativas.

Urina. D 1010; albumina, ++; sedimento: cilindros hialinos, granulados e hemácias. Ovos de *S. haematobium*.

Exame de fezes: ovos de *S. mansoni*.

Radioscopia: Na posição ânteroposterior, aumento da sombra do hilo do pulmão direito, o qual pulsava moderadamente. O cone da pulmonar era saliente e a aurícula D. dilatada. O ventrículo E. era ligeiramente aumentado. Não havia interferência com o curso da refeição opaca. A cúpula E. do diafragma com redução ligeira dos seus movimentos. Ambos os ângulos costofrênicos eram livres. Havia acentuação do desenho pulmonar na base, principalmente à E. Ausência de enfisema. Em oblíqua direita a aurícula E. era ligeiramente aumentada, deixando o espaço retrocardíaco livre. Em oblíqua E. o hilo do pulmão E. mostrava o mesmo estado que o D. O ventrículo D. era grandemente aumentado e a aorta ascendente media 2,7 cm.

A radiografia, tanto em posição ânteroposterior como em oblíquas (D. e E.), confirmou os mesmos dados.

Caso II — Homem de 24 anos, queixava-se, ao ser admitido, de dispnéia ao mais ligeiro esforço, impossibilidade de se manter deitado ou em decúbito lateral D., tosse seca, insônia datando de um ano. Antiga história de esquistossomíase intestinal e urinária sem tratamento algum prévio. Ausência de antecedentes reumáticos, maláricos e sífilíticos. Ao exame físico: ortopnéia e cianose. Não foi verificada a existência de dedos hipocráticos. Pulso regular, batendo 96 por minuto, moderadamente tenso. P.A. 125-85. Abaulamento da região precordial. Riscos difusos nos pulmões, principalmente no E. Choque no 5.º espaço, meia polegada para fora da linha hemiclavicular. Pulsação sistólica expansível do 1.º ao 4.º espaços intercostais. Frêmito sistólico e diastólico no 1.º e 2.º espaços intercostais E. À ausculta, na área pulmonar, um sopro sistólico áspero e um sopro diastólico suave eram audíveis e propagados para baixo, para o apex. No foco mitral as bulhas eram normais. Fígado aumentado 3 dedos abaixo da margem costal na linha hemiclavicular D. Baço firme 4 dedos abaixo da margem costal E. Não havia ascite.

Exame hematológico: eritrócitos, 3.580.000; Hb., 60%; leucócitos, 3.200; eosinófilos, 14%; neutrófilos, 70%; linfócitos, 16%; monócitos, 0. Pesquisa de plasmódio: negativa. Wassermann e Kahn: negativos.

Exame de urina: D. 1021; albumina, presente. Ovos de *S. haematobium*. Cilindros hialinos e granulados. Hemácias positivas. Exame de fezes: ovos de *S. mansoni*.

Radioscopia: Na posição ânteroposterior aumento da sombra hilar direita, que pulsava. Dilatação aneurismática do conus pulmonar; aurícula direita aumentada. Ventrículo esquerdo normal. Cúpula diafragmática E. ligeiramente mais elevada que a D., especialmente na parte média. Ângulos costofrênicos livres. Pulmões sem alterações evidentes. Ausência de enfisema. Em oblíqua D. a aurícula E. ligeiramente aumentada, mas o espaço retrocardíaco era livre. Em oblíqua E. a região hilar E. mostrava os mesmos caracteres vistos à D. Ventrículo fortemente hipertrofiado, sendo bem visível a enorme dilatação aneurismática do conus pulmonar. A aorta ascendente media 3 cm.

A radiografia confirmou os dados da radioscopia e, mais, ausência de lesões pulmonares e ausência de desvio para a direita da aorta.

Necrópsia — Pulmões: 1 — Extenso ateroma das artérias pulmonares. 2 — Bilharzomatos de pequeno tamanho no parênquima, especialmente nas bases. Coração: Fortemente hipertrofiado (600 gr) devido à hipertrofia do V.D. O V.D. forma o ápex. Miocárdio espesso (cerca de 1 cm). Circunferência pulmonar grande. O lado E. do coração era normal. Circunferência de 6,2 cm. Fígado aumentado. Extensa cirrose periportal. Ausência de ascite e icterícia. Baço aumentado com cápsula espessa e firme. Intestinos: papiloma esquistossomótico. Rins: aumentados e congestos.

Caso III — Homem, 31 anos, com dispnéia de esforço há 2 anos e tosse com escassa expectoração. Inchaço do abdome e membros inferiores há 2 meses. Já se havia tratado de antiga esquistossomose urinária e intestinal. Ausência de antecedentes reumáticos e sífilíticos.

Ao exame clínico: Edema mole da face, com cianose leve e hipertrofia das parótidas. Temperatura normal e pulso 96 por minuto, regular, normalmente tenso. Pressão arterial 130-90. Exame do tórax: leve submacicez e alguns estertores nas bases. Ápex no 5.^o espaço intercostal na linha hemiclavicular E. Ligeira submacicez à direita da parte inferior do esterno (1 dedo transversal) e sopro áspero e acentuação da 2.^a bulha no foco pulmonar. Bulhas cardíacas normais no foco mitral com um sopro sistólico suave. Acentuação da 2.^a bulha e sopro sistólico longo e grave na área tricúspide. Exame do abdome: fígado aumentado, firme, liso pelo método de rechaço, devido à presença de ascite. Baço também aumentado. Edema das pernas.

Exame hematológico: eritrócitos, 4.250.000; Hb., 75%; leucócitos, 6.000; eosinófilos, 8%; neutrófilos, 60%; linfócitos, 28%; monócitos, 4%. Malária: negativo. Reação de Wassermann e Kahn: negativos. Uréia, 27 mg%. B.K. no escarro: negativo. Urina: D. 1020. Albumina, presente. Sedimento: ovos de *S. haematobium*. Cilindros hialinos e granulosos. Hemácias. Fezes: ovos de *S. mansoni* e de *Ascaris*.

Radioscopia: Em posição ânteroposterior¹ mostrou uma sombra aumentada do hilo do pulmão D. que pulsava ligeiramente. Conus pulmonalis proeminente e aurícula D. aumentada. Ligeiro abaulamento da cúpula diafragmática E. com ligeira restrição de seus movimentos. Ventrículo E. dentro de limites normais. Ângulos costofrênicos livres. Exagêro da estriação basal dos pulmões, bilateralmente, porém mais à D. Ausência de enfisema. Em oblíqua D., a aurícula E. estava dentro do normal e o espaço retrocardíaco livre. Não havia interferência com a refeição baritada. Em O.E. o hilo E. do pulmão mostrava o mesmo aspecto que o D. O ventrículo D. era aumentado e a aorta ascendente media 2,8 mm.

Radiografia: Confirma os dados da radioscopia. Em O.D. espaço retrocardíaco livre, o que significa que o tamanho da aurícula era normal e o V.E. não aumentado. O bordo E. do coração era formado só pelo V.D., que radioscopicamente era muito aumentado.

Caso IV — Homem, 27 anos, com tosse, expectoração e febre há 18 meses. Desconforto na região precordial e cansaço geral. Antecedente de malária aos

4 anos; antecedente de esquistosomose urinária e intestinal, da qual se tratou com tártaro emético. Ausência de antecedentes reumáticos e de sífilis.

Exame clínico: cianose e engorgitamento e pulsação das veias cervicais. Pulso 100 por minuto, com extrassístoles, fraco. P.A. 100-70. Tórax em forma de tonel com roncros difusos nos 2 pulmões e alguns estertores na base D. Choque localizado no 6.º espaço intercostal da linha axilar anterior E. Pulsações no 2.º, 3.º, 4.º e 5.º espaços; choque diastólico no 2.º espaço intercostal E. e ausência de frêmito. À percussão aumento dos limites E. e D. do coração e macicez no 2.º e 3.º espaços. Ausculta: 1.ª bulha mitral fraca com sopro sistólico suave, sopro sistólico longo no foco tricúspide. Sopro sistólico áspero no foco pulmonar, com acentuação da 2.ª bulha. Abdome: baço de consistência firme, 1 dedo abaixo do rebordo costal. Fígado aumentado, firme, sensível. Ausência de ascite. Ambas as pernas edemaciadas.

Exame hematológico: Hb., 60%; eritrócitos, 4.380.000; leucócitos, 5.200; eosinófilos, 18%; neutrófilos, 28%; linfócitos, 38%; monócitos, 16%. Malária: negativo. R.W. e K.: negativos. B.K. no escarro: negativo. Urina: D. 1025. Albumina, positiva. Sedimento: ovos de *S. haematobium*. Cilindros hialinos e granulados. Pus e sangue presentes. Fezes: ovos de *S. mansoni* e de *Ascaris*.

Radioscopia: Em posição ânteroposterior, aumento de sombra do hilo D., que pulsava marcadamente. Conus da pulmonar proeminente extensivamente. Aurícula D. como o bordo E. do coração aumentados. Ausência de interferência com a refeição baritada. Cúpula diafragmática E. normal em relação à D. Ângulos costofrênicos livres. Os pulmões apresentavam exagêro das estriações normais, especialmente nas bases. Em O.D. a aurícula E. não aumentada e o espaço retrocardíaco livre. Em O.E. o hilo do pulmão E. nas mesmas condições que o D.; o ventrículo D. grandemente aumentado e a aorta media 2,8 cm.

A radiografia confirmou a radioscopia inclusive pela verificação de infiltrações intersticiais parenquimatosas, especialmente nas bases.

Necrópsia — Pulmões: extenso ateroma dos ramos das artérias pulmonares. Bilharzomatas no parênquima de ambos os pulmões, principalmente nas bases, e de tamanho minúsculo. Coração: grandemente aumentado (630 gr) devido principalmente à hipertrofia do lado D. O ápex era formado pelo ventrículo D. hipertrofiado. Miocárdio com espessura de mais de 1 cm. Circunferência da artéria pulmonar cerca de 1 cm e a da aorta cerca de 6 cm. Fígado: cirrose periportal extensa. Não há icterícia e ascite. Baço: ligeiramente aumentado, cápsula espessa, firme. Intestinos: papilomas bilharzióticos. Rins: aumentados e congestos.

Caso V — Homem de 30 anos, queixando-se de hematúrias datando de 4 meses, fraqueza e inapetência progressiva. Antecedentes de esquistosomose intestinal, da qual fôra tratado há 4 anos com tártaro emético. Ausência de reumatismo, sífilis e malária no seu passado mórbido. Ao exame clínico, palidez, emagrecimento e fraqueza. Pulso 82 por minuto, regular. P.A. 100-65. O exame do tórax verificou alguns estertores nas bases pulmonares, principalmente à D. Pulsação sistólica no 2.º e 3.º espaços intercostais esquerdos, com um choque valvular palpável diastólico. Choque no 5.º espaço na linha hemiclavicular E. Macicez de um meio dedo transversa à direita do esterno; macicez relativa no 2.º espaço esquerdo e macicez absoluta no 3.º espaço subcostal E. Bulhas (1.ª e

2.^a) no foco mitral normais e sopro sistólico fraco no foco pulmonar. Acentuação e desdobramento da 2.^a bulha pulmonar e um sopro áspero sistólico superpondo-se à 1.^a bulha e não acompanhado de frêmito sistólico. Baço aumentado. Fígado cirrótico e retraído. Ausência de ascite.

Exame hematológico: Hb., 65%; eritrócitos, 4.210.000; leucócitos, 6.000; basófilos, 0%; eosinófilos, 7%; neutrófilos, 60%; linfócitos, 29%; monócitos, 4%. Malária: negativo. R. Wassermann e Kahn: negativos. B.K. no escarro: negativo. Urina: albumina, traços. Sedimento: cilindros granulosos, pus e sangue. Ovos de *S. haematobium*. Fezes: ovos de *S. mansoni* e de *Ascaris*.

Radioscopia: Em posição ânteroposterior mostra uma sombra aumentada do hilo pulmonar D., que pulsa ligeiramente. Conus pulmonar saliente; a aurícula D. como o bordo E. do coração dilatados. Refeição baritada sem nenhuma interferência. A cúpula E. do diafragma em nível normal em relação a D. e seus movimentos são normais. Ângulos costofrênicos livres. Os pulmões apresentam um exagêro das suas estriações, especialmente na base D. Em posição oblíqua D. a aurícula E. não era aumentada e o espaço retrocardíaco livre. Em oblíqua E. o hilo pulmonar mostra-se na mesma condição que o D. O ventrículo D. grandemente aumentado. Aorta ascendente 2,7 cm.

Radiografia em AP: confirma os mesmos achados da radioscopia e inclusive as infiltrações das bases pulmonares, principalmente à D. Aorta não desviada para a D.

Caso VI — Homem, 17 anos de idade, foi admitido queixando-se de tosse com expectoração amarelada, dispnéia, fraqueza geral e febre há 10 dias. Malária há 7 anos, que foi tratada. Há muitos anos teve esquistosomose urinária e intestinal, tratadas com tártaro emético. Ausência de antecedentes reumáticos e sífilíticos.

Exame clínico: emagrecimento e palidez. Ausência de dedos hipocráticos. Garganta congesta, língua saburrosa. Pulso 80, regular, pouco tenso e fraco. Pressão arterial 90-60. Tórax longo e estreito, com sinais de bronquite. Choque no 4.^o espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular E. Ausência de pulsações visíveis ou palpáveis, exceto no 2.^o espaço intercostal E. para fora do bordo do esterno, onde se percebe um choque diastólico valvular, desacompanhado de frêmito. Aí verificou-se macicez relativa à percussão. Macicez absoluta no 3.^o espaço do lado E. O bordo D. do coração não era percutível à D. do esterno. Ausculta: revelou 1.^a bulha normal no foco mitral; accentuação e desdobramento da 2.^a bulha no foco pulmonar. Existia um sopro sistólico pulmonar longo e áspero e um sopro mais fraco (sistólico) nos focos mitral e tricúspide. O exame do abdome revelou um fígado aumentado, cirrótico; baço aumentado e firme. Ausência de ascite.

Exame hematológico: Hb., 60%; eritrócitos, 3.250.000; leucócitos, 6.100; basófilos, 1%; eosinófilos, 2%; mielócitos, 5%; neutrófilos, 72%; linfócitos, 13%; monócitos, 7%. Malária: negativo. Reação de Wassermann e Kahn: negativas. B.K. no escarro: negativo. Urina: D. 1026. Albumina, traços. Sedimento: ovos de *S. haematobium*. Cilindros granulosos. Pus e sangue presentes. Fezes: ovos de *S. mansoni* e de *Ascaris*.

Radioscopia: Em posição ânteroposterior, sombras hilares — D. e E. — com aumento dessas sombras, que eram ligeiramente pulsáteis. Proeminência do cone

pulmonar. Evidência de muito ligeiro aumento da aurícula D., bordo E. do coração normal e aumento da cúpula E. do diafragma atingindo o nível da D. com redução dos movimentos. Refeição opaca sem interferência. Ângulos costodiafragmáticos livres, de ambos os lados e ausência de infiltrações pulmonares parenquimatosas ou intersticiais. Em O.D. aurícula E. não dilatada com espaço retrocardíaco livre. Conus dilatado e sombras hilares D. exageradas. O.V.E. dentro do normal. Em O.E. o hilo esquerdo como o direito. Ventrículo D. grandemente aumentado. Aorta ascendente mede 2,9 cm.

Radiografia: confirma todos os dados da radioscopia.

Após a análise cuidadosa destes casos sob o ponto de vista clínico e radiológico, o autor estuda a questão do diagnóstico diferencial do "cor pulmonale" crônico esquistosomótico com a estenose mitral, as pneumopatias crônicas, extensas e as cardiopatias congênitas, frisando que as investigações radiológicas dos 6 casos apresentados fornecem os seguintes resultados:

1. Dilatação da artéria pulmonar e do conus.
2. Sombras hilares proeminentes.
3. Aumento do ventrículo direito e da aurícula direita.
4. Ausência ou só ligeiro aumento do coração esquerdo (aurícula e ventrículo).
5. Redução dos movimentos e elevação da cúpula esquerda do diafragma (devido à esplenomegalia).
6. Ausência de lesões descritas por Mainzer nos campos pulmonares como comuns na esquistosomíase pulmonar (embora possam estar presentes em outros casos e reforçar então a possibilidade diagnóstica de "cor pulmonale" esquistosomótico).
7. Posição e dimensões normais da aorta ascendente em todos os casos.

Sirry realizou este estudo radiológico do "cor pulmonale" esquistosomótico com o fim de obter elementos para o seu diagnóstico diferencial com algumas malformações congênitas (dilatação congênita da artéria pulmonar, persistência do canal arterial, defeito do septo interauricular e tetralogia de Eisenmenger), segundo a sugestão de Salah, cuja experiência se baseia em 30 casos de "cor pulmonale" esquistosomótico.

Neste particular, considera Sirry o tamanho e posição da aorta como os sinais mais importantes do diagnóstico diferencial radiológico. Se a aorta ascendente se mostrar dextroposta, deve-se considerar o diagnóstico de tetralogia de Eisenmenger, e se o vaso mostrar-se hipoplástico, o diagnóstico deverá ser: defeito do septo interauricular ou ductoarterioso. No "cor pulmonale" esquistosomótico a aorta é normal, nem está à direita do esterno, nem é hipoplástica, segundo a conclusão do autor.

Em 1949, M. Erfan, H. Erfan, A. M. Mousa e A. A. Deel¹³, publicaram um estudo clínico e radiológico de 49 casos de esquistosomíase pulmonar crônica, selecionadas entre 103 pacientes de esquistosomíase urinária e intestinal.

QUADRO RETRADO DO TRABALHO DE SIRRY E REFERENTE AOS CASOS DESTES AUTORES

Caso	N.º	Artéria pulmonar em radioscopia A.P. em posição	Sombras bilares em radioscopia mais O.A.E. e A.P.	Conus da pulmonar em radioscopia mais O.A.D. e A.P.	Ventrículo D. em radioscopia mais O.A.E.	Aurícula D. em radioscopia mais A.P.	Aurícula E. em radioscopia mais O.A.D.	Ventrículo F. em radioscopia mais A.P. e O.A.D.	Aorta radioscopia A.P. mais O.A.E.	Diáfagma radioscopia mais A.P.	Pulmões radioscopia mais A.P.
1		Dilatada	Aumentadas	Fortemente dilatado	Aumentado	Dilatada	Ligeiramente dilatada	Ligeiramente dilatado	Normal 2,7 cm	Elevado à E.	Infiltração basilar
2		Muito dilatada	Muito aumentadas	Dilatação aneurismática	Aumentado	Dilatada	Ligeiramente dilatada	Não definido	Normal 3 cm	Elevado à E.	Sem alterações
3		Dilatada	Aumentadas	Dilatado	Aumentado	Dilatada	Normal	Normal	Normal 2,8 cm	Elevado à E.	Infiltrações basilares
4		Enorme dilatação	Fortemente aumentadas	Muito dilatado	Muito aumentado	Dilatada	Normal	Normal	Normal 2,6 cm	Normal	Infiltrações basilares
5		Dilatada	Dilatadas	Dilatado	Aumentado	Dilatada	Normal	Aumentado	Normal 2,7 cm	Normal	Infiltrações basilares
6		Ligeiramente dilatada	Ligeiramente dilatada	Dilatado	Aumentado	Ligeiramente dilatado	Normal	Normal	Normal 2,9 cm	Elevado à E.	Sem alterações

A forma cardiovascular da esquistossomíase pulmonar foi a que mereceu a maior atenção por parte dos autores. Em sua série de casos, eles dizem ter observado vários graus desta forma, desde as lesões vasculares focais pulmonares, que só podem ser reconhecidas radiologicamente, até à dilatação aneurismal da artéria pulmonar e insuficiência do ventrículo direito. Dêstes 49 casos, apenas 2 apresentaram o quadro de insuficiência ventricular direita, que os autores consideram como de aparecimento tardio e subordinado a uma causa mecânica e não miocárdica.

Após o estudo clínico metódico do seu material, e de considerações sobre a questão do diagnóstico diferencial e terapêutico, os autores citados expuseram o resultado do exame radiológico sistemático (radiografias nas posições antero-posterior e oblíquas anterior, direita e esquerda, radioscopia com ingestão de contraste (baritado), e classificaram os achados dêstes 49 casos, agrupando-os em três graus, a saber:

Grau I — Alterações focais arteriais;

Grau II — Alterações arteriais difusas com ligeiras modificações cardíacas;

Grau III — Alterações arteriais difusas com grandes modificações cardíacas.

No grau I existem alterações focais nos pulmões. As arteríolas, especialmente as basais, mostram-se de diâmetro maior que o normal, com uma sombra densa, de trajeto tortuoso, de contornos irregulares e esfumados e com aspecto em rosário. Os campos pulmonares atingidos mostram uma importante e mais complicada trama de arteríolas quando comparados a alguns vasos sanguíneos principais vistos normalmente. O aspecto moniliforme é devido a nódulos, de cerca de 0,5 a 1 mm de diâmetro, superpondo-se à sombra de pequenas artérias ou jazendo em sua imediata vizinhança.

No grau II existem lesões arteriais difusas e ligeiras alterações cardíacas. As lesões arteriais nos pulmões são mais difusas que no grau anterior. As sombras hilares são maiores e mais densas que o normal. O entalhe subaórtico é parcial ou inteiramente apagado. A imagem cardíaca é moderadamente aumentada no diâmetro transversal e tem uma configuração mitral. O ventrículo direito é aumentado, o esquerdo não, e a aurícula esquerda nunca. A aorta é normal e a crossa aórtica é vista, exceto quando ela é parcialmente mascarada pelo cone e tronco da artéria pulmonar dilatados.

No grau III existem alterações arteriais difusas e grandes modificações cardíacas. As alterações arteriais nos pulmões são idênticas àsquelas do grau anterior. O cone e o tronco da artéria pulmonar são proeminentes, podem atingir um tamanho aneurismal e mascaram a sombra da aorta e sua crossa. Também se pode ver uma dilatação aneurismática dos ramos pulmonares primários. O coração é aumentado no seu diâmetro transversal com a típica configuração de "cor pulmonale". O ventrículo direito e a aurícula direita estão aumentados, o ventrículo esquerdo pode estar moderadamente aumentado, mas não há aumento da aurícula esquerda.

Se compararmos os resultados dos estudos de Erfan e colaboradores com os de Sirry, anteriormente citados, vemos que ambos concordam em muitos pontos, exceto em alguns detalhes.

Assim, enquanto Erfan e colaboradores negam terminantemente qualquer aumento da aurícula esquerda, Sirry verificou em 2 casos, radiologicamente, que esta cavidade cardíaca se apresentava ligeiramente aumentada.

No trabalho de Erfan e colaboradores¹⁵⁻¹⁶, por outro lado, as lesões arteriais são descritas mais minuciosamente. Nos outros aspectos nota-se concordância dos achados radiológicos.

Finalizando esta revisão da literatura, resta-nos resumir a observação de Popper e Volini³⁵, publicada em 1949 e que se referia a uma jovem pôrto riquense de 23 anos de idade, que se queixava de dispnéia datando de 3 anos e edema dos tornozelos, náuseas, vômitos e hemoptises mais recentes. Durante uma viagem de avião a paciente teve vertigem, epistaxis e forte dor torácica, o que aconteceu duas semanas antes de sua admissão ao hospital. Ela também expectorou sangue, depois apresentou febre, o edema se intensificou, assim como a dispnéia, e os vômitos tornaram-se insistentes.

Ao exame físico foi verificado subicterícia e febre (37,4°), a frequência do pulso era 90 por minuto e a da respiração 20. A pressão arterial 120-78. O exame do pulmão nada apurou digno de nota. À ausculta cardíaca havia sopro sistólico e 1.ª bulha áspera acompanhada de sopro diastólico na área pulmonar e no ápex. Hiperfoneses relativas da 2.ª bulha no foco pulmonar. O fígado era palpável um dedo abaixo do rebordo costal. O baço não foi palpado. Verificou-se ainda hemorroidas externas e edema dos membros inferiores. Os exames de laboratório demonstraram: albuminúria; anemia, ligeira leucocitose com neutrofilia. Reações sorológicas para sífilis (Kahn) negativas. Provas hepáticas indicando disfunção do órgão (R. Hänger 4+; timol, turvação 12,8 u); azoto não protéico 36 mg. Proteínas totais: 6,1. Índice icterico: 32; urina com urobilinogênio positiva (4+). Fosfatase alcalina: 17 u. Bodansky. O exame radiológico do tórax demonstrou aumento das sombras peribronquiais e congestão hilar. O contorno do ventrículo esquerdo apresentava-se moderadamente aumentado, mas o ventrículo direito, em posição oblíqua, mostrou-se nitidamente aumentado. O eletrocardiograma registrou, digno de nota, apenas desvio do eixo para direita. Apesar de intensamente medicada do seu estado cardíaco, a paciente não obteve melhoras.

Durante a evolução, a paciente sentiu, numa noite, uma dor aguda precordial, teve uma hemoptise e tornou-se dispnéica. Foi verificada a existência de macicez nas bases pulmonares, não sendo audíveis estertores. Apareceu, então, ascite e o fígado foi palpável a 2 cm abaixo do rebordo. Depois, a icterícia e os edemas se tornaram mais intensos e a paciente faleceu, após 16 dias de hospitalização. Este caso foi discutido clinicamente e do ponto de vista anátomo-patológico, e ilustrado com magníficas e demonstrativas microfotografias das lesões, que foram descritas com minúcias.

O diagnóstico anátomo-patológico final foi: Esquistosomíase mansoni do fígado, pulmões e baço (esplenomegalia fibrocongestiva com nódulos sideróticos, presença de ovos de *Schistosoma* e depósitos de cálcio); arterite pulmonar aguda e crônica; dilatação da artéria pulmonar com arterioesclerose; hipertrofia e dilatação das cavidades direitas do coração; edema pulmonar e congestão; cirrose zooparasitária com necrose aguda central; hidropericárdio, hidrotórax bilateral e

ascite; icterícia, deformação fibroblástica da válvula mitral e fibrose miocárdica focal de origem provavelmente reumática.

Comentando esta observação, escrevem os AA.: "Numa tentativa para correlacionar os dados clínicos e anatômicos, parece que esta jovem sofreu por muitos meses de dispnéia, edema dos tornozelos, hemoptise e tosse, aparentemente em consequência da insuficiência crônica do coração direito, devido à hipertensão pulmonar. Esta foi comprovada também pela acentuação da segunda bulha e pela demonstração eletrocardiográfica da sobrecarga do ventrículo direito. A dor torácica durante os últimos meses foi obviamente o resultado da arterite. A cirrose evoluiu durante um longo período, de forma insidiosa, sem sintomas.

Sómente durante os últimos meses os sintomas clínicos, febre, náusea, vômitos e icterícia, e os dados de laboratório denunciadores de insuficiência hepática, indicaram a evolução de manifestações tóxicas com lesão hepática. A causa da morte foi provavelmente uma combinação da insuficiência cardíaca e hepática".

QUADRO CLÍNICO

De conformidade com os dados da literatura que acabamos de rever, a arterite pulmonar esquistosomótica é verificada com maior frequência nos indivíduos jovens, coincidindo a sua maior incidência nos grupos etários compreendidos entre 10 e 30 anos. Erfan e colaboradores estabeleceram como idades limites 10 e 50 anos respectivamente, mas informam que nos seus 49 casos de esquistosomose pulmonar crônica, a maior incidência ocorreu justamente nos indivíduos entre os 10 e 30 anos. Com exceção dos pacientes de Silveira^{44, 45}, todos os outros casos registrados na literatura foram vistos em indivíduos de idade inferior a 40 anos. Os casos aqui discutidos foram observados em dois rapazes, de 19 e 20 anos respectivamente, e numa mulher de 33 anos.

O sexo masculino predomina sobre o feminino. Erfan e colaboradores consignam 14 casos de esquistosomose pulmonar crônica no sexo masculino contra 5 no feminino, e interpretam esta desproporção como consequência da diferença de hospitalização entre os dois sexos, e não como expressão da realidade dos fatos.

Sirry atribui a maior frequência no sexo masculino, que na sua casuística era de 5:1, como devida ao fato de ser o homem mais exposto à infecção, e só secundariamente condicionada ao menor ingresso das mulheres nos serviços hospitalares.

Dos 6 casos autopsiados por Shaw e Ghareeb, 4 eram do sexo masculino e 2 do feminino. Os casos de Clark e Graef, de Koppisch, um estudado por Day, todos 3 observados por Suarez e Hernández Morales, um caso de Silveira, eram do sexo feminino. O paciente de Mousa tinha 36 anos e era do sexo masculino. O caso de Bedford Aidaroş e Girgis era de um homem de 34 anos, e o de Meira, de um paciente de 31 anos.

Os casos constantes deste trabalho foram observados dois no sexo masculino (obs. 2 e 3) e outro no feminino (obs. 1).

Um fato que ressalta da literatura, e que precisa ser frisado, é a existência nos antecedentes dos pacientes de uma história bem caracterizada da infecção esquistosomótica. Assim, é nos indivíduos vivendo em áreas endêmicas de esquistosomíase ou delas procedentes, e com frequentes oportunidades para contrair a infecção, por contactos repetidos com águas contaminadas, que se verifica, geralmente, esta forma cárdiopulmonar da helmintíase.

Um ponto que também mereça ser frisado e que a literatura põe em evidência é que, embora a forma cárdiopulmonar da esquistosomíase se verifique igualmente em áreas de distribuição geográfica do *S. haematobium*, é comumente nos indivíduos parasitados pelo *S. mansoni*, ou nos casos de infecção mista (*Schistosoma haematobium* mais *Schistosoma mansoni*), que se observa o aparecimento do quadro do “cor pulmonale” crônico esquistosomótico.

Os casos de parasitismo exclusivo pelo *S. haematobium* complicados por um quadro de “cor pulmonale” crônico são excepcionais. Nestes casos, em consequência ao *habitat* e biologia dêsse trematódeo, estão ausentes os sintomas de uma cirrose hepática com esplenomegalia que, ao contrário, são frequentemente observados seja nas infecções puras pelo *S. mansoni*, seja nos casos de infecção mista.

Foi por essa razão que em seu trabalho anterior Meira frisou ocorrer esta localização cárdiopulmonar da esquistosomíase principalmente como uma complicação da cirrose hepática causada pelo *Schistosoma mansoni*.

Portanto, é geralmente nos indivíduos com um passado intestinal próprio da parasitose e caracterizado, sobretudo, por crises de disenteria muco-sanguinolenta, com presença de ovos de *S. mansoni* nas fezes, e principalmente nos indivíduos com hepato-esplenomegalias esquistosomóticas, que mais comumente se encontra a forma cárdiopulmonar em estudo. Muitas vezes os pacientes não se queixam de distúrbios intestinais que sofreram no passado, dêles não se recordam mais e a êles só se referem quando diretamente interrogados. Dominam nestes casos geralmente os sintomas determinados pelas modificações hepato-esplênicas e as manifestações peculiares ao quadro de cirrose hepática, em que se destacam, principalmente, a esplenomegalia, as alterações hematológicas e o comprometimento do fígado pelas suas modificações de volume à exploração física, expresso, também, pelo resultado das provas funcionais de laboratório.

Podem, ainda, estar presentes um ou mais dos sintomas de hipertensão portal próprios dêste tipo de cirrose hepática (varizes esofagianas, hemorragias esôfago-gastro-intestinais, circulação colateral, ascite etc.).

Nos casos de infecção mista esquistosomótica ou nos casos de esquistosomose haematólia exclusiva, existem sintomas relacionados com a localização urinária, datando de longa data, e presença dos ovos típicos de esporão terminal nas urinas e algumas vezes também nas fezes dos pacientes.

No Egito, escrevem Bedford, Aidaros e Girgis⁶, o “cor pulmonale” crônico devido à endarterite esquistosomótica das arteríolas pulmonares ocorre nos adultos jovens de 20 a 35 anos, ou mesmo mais moços, sofrendo de esquistosomose visceral adiantada (forma hepato-esplenomegálica do *S. mansoni*) ou graves infecções gênito-urinárias pelo *S. haematobium*, ou ambas.

Na América (Brasil, Venezuela, Pôrto Rico), onde só ocorre o *S. mansoni*, obviamente as localizações gênito-urinárias, próprias da infecção pelo *S. haematobium*, não fazem parte do quadro clínico.

Estes dados, como veremos, tem importância sobretudo para a orientação diagnóstica. Êles significam apenas que nos casos de “cor pulmonale” crônico esquistosomótico há sempre antecedentes antigos de esquistosomose de alguns anos de duração e sugerem, como diz Sirry, que o processo mórbido segue-se a uma infecção intensa esquistosomótica, e é o resultado de obstrução arterial de longa duração.

Estes fatos precisam ser tidos em mente, porque a arterite pulmonar esquistosomótica poderá ser reconhecida clinicamente com maior frequência, se nos pa-

cientes com lesões esquistosomóticas adiantadas de outros órgãos, máxime na forma hepato-esplênica, a atenção do clínico fôr despertada para a sua possível ocorrência em fase anterior ao aparecimento das manifestações cardíacas, que levam ao quadro da insuficiência ventricular direita terminal. Em tais casos, que constituem a chamada forma clínica latente da endarterite pulmonar esquistosomótica, só os dados da semiótica cardíaca, e os elementos fornecidos pela radiologia e eletrocardiografia, poderão evidenciar as modificações vasculares que se operam no domínio da circulação pulmonar antes que os sinais e sintomas da insuficiência ventricular direita estejam presentes.

Em outras palavras, no quadro clínico do "cor pulmonale" crônico esquistosomótico pode-se distinguir duas fases evolutivas: uma inicial ou ainda latente, em que os sintomas dominantes são as manifestações da moléstia fundamental, isto é, a esquistosomose, aliadas aos sinais e sintomas que traduzem ou fazem suspeitar apenas a existência de uma hipertensão pulmonar, e outra, a segunda fase, mais avançada ou terminal, em que a sintomatologia da insuficiência cardíaca ventricular direita é manifesta. A transição de uma fase para outra se faz geralmente de maneira gradual e a sua distinção pode ser na prática muito difícil. Mas, se se tiver a atenção voltada para esta eventualidade, pensamos ser possível estabelecer na evolução clínica da endarterite pulmonar esquistosomótica estas duas fases, que a história natural da moléstia permite identificar.

Com efeito, é possível, como vimos, surpreender, na clínica, casos de esquistosomose adiantada que ao exame clínico mostram sinais indicativos de hipertensão pulmonar (hiperfonese isolada ou com desdobramento da 2.^a bulha pulmonar), desvio do eixo elétrico para a direita, ao eletrocardiograma, e proeminência e dilatação da artéria pulmonar e das cavidades direitas do coração, ao exame radiológico, quando os sintomas cardíacos são discretos ou inexistentes.

Nestes casos, o que domina o quadro clínico são as manifestações da cirrose hepática esquistosomótica, sendo a endarterite pulmonar de mesma origem surpreendida ao exame sem haver dado ainda sintomas clínicos apreciáveis.

Os dados anátomo-patológicos conhecidos justificam plenamente êste modo de ver.

Por outro lado, são mais frequentes os casos registrados na literatura revista que chegam à observação quando os pacientes, com formas graves de esquistosomose, exibem os bem conhecidos sintomas da insuficiência cardíaca, em consequência à progressiva dificuldade circulatória no domínio da circulação pulmonar.

Geralmente a insuficiência cardíaca se instala insidiosamente, embora em alguns casos ela seja precipitada por vários fatores (infecções intercorrentes etc.), como, por exemplo, no nosso caso (obs. 1), em que a gravidez e ao parto laborioso pode-se sem dúvida imputar a responsabilidade pelo episódio terminal que levou a paciente, em curto prazo, à morte.

Não entra nos moldes dêste trabalho esmiuçar a sintomatologia clínica da esquistosomose, e por isso limitaremos nossas considerações aos sintomas predominantes quando nas suas formas complicadas, os sintomas superajuntados, dependem da endarterite pulmonar obliterante integrada no quadro da doença fundamental. Dêstes sintomas os mais comumente referidos pelos pacientes é a dispnéia. Esta é a princípio ligeira, e pode datar de algum tempo. A dificuldade respiratória sobrevém ao esforço, mas à medida que a moléstia evolui ela se acentua, passa a ser permanente, chegando nas fases mais adiantadas à ortop-

néia, que pode ser extrema. Queixam-se ainda os pacientes de dor torácica, muitas vezes localizada sobre o precórdio, quando assume o caráter de dor não intensa mas profunda, simulando, por vezes, a dor coronária. A palitação também é referida por alguns doentes. A estes sintomas se juntam tosse, geralmente seca, outras vezes com expectoração mucopurulenta. Pequenas hemoptises também podem ser encontradas. Fraqueza, tontura e vertigens completam as queixas dos pacientes. A se julgar pela amnase dos doentes, a dispnéia de esforço pode preceder de muito tempo as manifestações inequívocas da insuficiência cardíaca. Assim, quando a dispnéia se acentua, logo sobrevêm os outros sintomas que traduzem a descompensação cardíaca; aparecem os edemas generalizados, a estase jugular, a congestão hepática e pulmonar, instalando-se em definitivo o quadro completo da insuficiência ventricular. A cianose não é manifestação sintomática frequente, e só está presente, mesmo, na minoria das observações. A sua incidência no quadro do cor pulmonale crônico esquistosomótico por endarterite pulmonar obliterante, parece ter sido exagerada pelos primeiros observadores. De fato, a cianose, se presente, é ligeira, excepcionalmente acentuada, e parece depender da intensidade da insuficiência cardíaca. O paciente estudado por Mousa não apresentava cianose mesmo após esforço.

Nos casos de Erfan e colaboradores¹⁶, a cianose de grau leve foi assinalada 3 vezes, e Sirry⁴⁶ não considera a cianose uma feição importante, tendo nos seus casos sido vista apenas em 2 pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Bedford, Aidaros e Girgis⁶ dizem que, comparada com outras formas de cor pulmonale crônico, a variedade esquistosomótica não causa geralmente cianose, e mesmo na ausência de anemia (a que se quis atribuir a sua falta, a cianose nestes pacientes é raramente severa, exceto como episódio terminal).

A este propósito os citados autores escrevem: "Uma explicação mais provável é o fato de que na bilharziose, a lesão pulmonar pode ser quase que limitada às arteríolas, deixando as estruturas alveolares e capilares intactas (Mousa, 1912)". "Com efeito, continuam os mesmos autores, a esquistosomíase pulmonar pode resultar numa arterite pulmonar primária, e seu principal efeito é determinar a hipertensão pulmonar e hipertrofia do coração direito. Nas variedades mais comuns de cor pulmonale, a lesão vascular é associada com lesão crônica do parênquima pulmonar e é esta que interfere com a oxigenação do sangue nos pulmões e assim causa a cianose. As radiografias do tórax na cardiopatia esquistosomótica, raramente demonstram quaisquer alterações importantes nos campos pulmonares, fora a dilatação vascular, sendo as evidências de fibrose usualmente ausentes".

"Brenner (1935), discutindo a esclerose vascular pulmonar primária, estabelece que a cianose é usualmente intensa; mas cita casos, inclusive de etiologia sífilítica, nos quais está ausente. Teoricamente, desde que a lesão é limitada às arteríolas e o ventrículo direito hipertrofiado pode manter uma corrente adequada contra a resistência aumentada, não há razão para que a cianose apareça; esta deverá ser esperada somente quando o ventrículo direito se tornar insuficiente. Na verdade, concluem Bedford e colaboradores, o quadro clínico clássico da assim chamada moléstia de Ayerza é realmente o de uma pneumopatia crônica e insuficiência cardíaca combinada".

Dos casos estudados neste trabalho, dois (obs. 2 e 3) não apresentam cianose, e no outro (obs. 1) a cianose, de grau moderado, parecia depender do quadro de grave e terminal insuficiência cardíaca.

O que sucedeu com a cianose aconteceu também com os dedos hipocráticos: enquanto os primeiros estudiosos insistiam sobre a sua frequente ocorrência entre as manifestações do quadro clínico do cor pulmonale crônico esquistosomótico, outros autores, mais recentemente, reconhecem menos valor na presença dos dedos hipocráticos ou em baguetas de tambor. Bedford, Aidaros e Girgis julgaram ser os dedos hipocráticos, como fizeram para a cianose, menos contraditórios na variedade esquistosomótica do que nos casos de cor pulmonale crônico de outras etiologias. O paciente de Mousa, como vimos, apresentava dedos e artelhos hipocráticos.

Nos 3 casos citados de Suarez e Hernández Morales a cianose estava presente em 2 e os dedos hipocráticos eram nítidos em 2 casos e esboçados em um dos pacientes.

Sirry assinalou a ausência dos dedos hipocráticos em todos os seus 6 casos de cor pulmonale crônico, e Erfan e colaboradores, dos seus 49 pacientes com esquistosomose pulmonar crônica, apenas em 7 notaram a presença de dedos hipocráticos esboçados. Nos 3 casos aqui estudados não havia a alteração morfológica referida dos dedos.

O exame do aparelho circulatório na forma cardíopulmonar da esquistosomíase mansoni fornece elementos de grande importância diagnóstica, muito embora nenhum deles seja patognomônico.

À inspeção, o precórdio pode apresentar, excepcionalmente, como no nosso 2.º caso (M. A. P.), um ligeiro abaulamento mais evidente na sua parte superior. O choque da ponta, por vezes impulsivo, outras vezes apenas visível em decúbito lateral, ocupa geralmente sua sede normal. Em alguns casos ele foi registrado para fora da linha hemiclavicular no 6.º espaço intercostal esquerdo (Erfan et al.). Uma pulsação visível, sistólica, localizada no 2.º espaço intercostal, à esquerda do esterno (Mousa), estendendo-se até o 3.º intercosto (Day) e mais raramente atingindo o 4.º e mesmo o 5.º intercosto, já tem sido registrada em alguns casos (Bedford et al., Sirry). Pela palpação, com alguma frequência, verifica-se um choque valvular diastólico palpável, no foco pulmonar, e correspondendo à 2.ª bulha cardíaca (Mousa, Bedford, Aidaros e Girgis, Erfan et al., Sirry). É constante a ausência de frêmitos. A percussão pode mostrar aumento da área cardíaca, obtendo-se às vezes apenas obscuridade percutória à esquerda do esterno (Bedford, Aidaros e Girgis, Erfan et al.).

A mais constante e muitas vezes a única informação de valor ao exame é a modificação encontrada na 2.ª bulha no foco pulmonar. Esta se apresenta às vezes das vezes nitidamente hiperfonética.

Com relativa frequência, além da acentuação, verifica-se o desdobramento permanente da 2.ª bulha no foco pulmonar. Como dissemos, estas modificações estetacústicas da 2.ª bulha podem se apresentar desacompanhadas de qualquer outro sinal e, por conseguinte, o seu encontro ao exame de esquistosomóticos em fase adiantada da moléstia deve levantar a suspeita da hipertensão na pequena circulação condicionada pela arterite pulmonar, e orientar os exames subsidiários adequados para a confirmação dessa possibilidade diagnóstica. A existência de um sopro diastólico, de insuficiência pulmonar, no 1.º e 2.º espaços intercostais esquerdos, foi assinalada quando ocorre uma dilatação aneurismática da artéria pulmonar (Sirry, Erfan et al.). Erfan e colaboradores informam que em 49 pacientes de esquistosomíase pulmonar crônica, 28 apresentavam sinais clíni-

cos indicativos de hipertensão pulmonar ou de uma artéria pulmonar dilatada. Algumas observações registram a presença de sopro sistólico, por vezes áspero, no foco pulmonar (Erfan et al., Sirry). Em pacientes anêmicos a ausculta percebe também sopro sistólico audível no precórdio, máxime nos focos tricúspide e mitral ou só neste último. O galope protodiastólico pode ser encontrado, com relativa frequência, nas fases adiantadas, quando a insuficiência ventricular é declarada. O ritmo cardíaco geralmente não mostra alteração digna de nota, observando-se, entretanto, algumas vezes extrassístoles não muito frequentes. O pulso é variável, sendo sua frequência, normal ou ligeiramente acelerada. A pressão arterial se mantém nos limites da normalidade com tendência a mostrar cifras tensionais baixas.

O exame do aparelho respiratório fornece pequeno contingente de elementos semióticos. Erfan e colaboradores, em 49 casos de esquistosomíase pulmonar crônica, afirmam que em 34 pacientes nenhum sinal foi verificado ao exame físico dos pulmões. Nos 15 restantes eles verificaram apenas alguns roncós, sibilos ou estertores audíveis nas bases pulmonares.

Quando os pacientes se apresentam em fase de descompensação cardíaca, estão presentes os sinais peculiares ao quadro da insuficiência cardíaca congestiva, que não pretendemos, por motivos óbvios, aqui detalhar (estase venosa do pescoço, congestão hepática e pulmonar, edema generalizado, aumento de pressão venosa, retardo do tempo de circulação etc.).

Também não faremos referências especiais aos sintomas próprios da esquistosomose, apenas lembrando, mais uma vez, e isto é bem evidente nas observações transcritas e nos dados anteriormente mencionados, a frequência da arterite pulmonar esquistosomótica como complicação das formas adiantadas da cirrose hepática esplenomegálica da esquistosomíase mansoni.

É interessante assinalar a este respeito que, em um caso de Day e em dois de Erfan e colaboradores, os pacientes já haviam sido esplenectomizados anteriormente por esquistosomíase hepática.

O exame hematológico revela nos casos em estudo geralmente oligocitemia, hipocromia, leucopenia ou leucocitose, eosinofilia, que pode ser acentuada, mas que não é constante nem obrigatória. A anemia, contudo, pode faltar, e quando presente pode depender de causas associadas (ancilostomose). Os seguintes dados são fornecidos por Erfan e colaboradores, obtidos de 49 casos de esquistosomíase pulmonar crônica. Eritrócitos: variaram entre 1.670.000 e 5.350.000 por mm³. Hemoglobina entre 15% e 104%. As cifras mais baixas sendo devidas a ancilostomose associada, o que ocorreu em 6 de seus pacientes. Leucócitos entre 2.400 e 16.200 por mm³, e eosinófilos entre 1 e 40%.

Eletrocardiograma. — Poucas são ainda as observações de endarterite obliterante pulmonar esquistosomótica, cujo estudo foi acompanhado clinicamente pela eletrocardiografia. Mas, como uma feição importante, e até certo ponto prevista pelos dados clínicos e anatômicos conhecidos, nesses casos o eletrocardiograma registra, habitualmente, um traçado de preponderância ventricular direita.

Das únicas 6 observações clínicas acompanhadas de traçados eletrocardiográficos, 5 registram desvio do eixo elétrico para a direita (Meira, Mousa, 2 casos de Suarez e Hernández Morales, 1 caso de Renato Lobo). No caso de Mousa, T₂ era pequeno e T₃ invertido.

Num caso de Suarez e Hernández Morales o traçado eletrocardiográfico foi registrado como normal.

Erfan afirma que o eletrocardiograma na forma cárdiopulmonar da esquistosomíase mostra uma curva de preponderância ventricular direita, mas nem na sua comunicação (1948)¹⁴, nem no seu trabalho em colaboração com Erfan, Mousa e Deeb (1949)¹⁶, as observações são ilustradas com traçados eletrocardiográficos.

Os casos de Sirry⁴⁶ e a observação de Bedford, Aidaros e Girgis⁶, também não foram acompanhados de traçados eletrocardiográficos.

Em 2 casos, objeto da presente publicação, obtiveram-se curvas de hipertrofia ventricular direita.

Num dos casos verificou-se também hipertrofia auricular e modificações do segmento ST e onda T, que serão referidos mais minuciosamente na parte de comentários dêste caso (obs. 2 — M. A. P. Vide adiante).

Em dezembro de 1948, assistimos à apresentação, numa das reuniões anátomo-clínicas dos médicos do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, de um caso de uma mulher pernambucana, de 25 anos de idade, internada em franca insuficiência cardíaca e que à autópsia, praticada pelo Dr. Lopes de Faria, revelou: cirrose hepática esquistosomótica e esquistosomose intestinal, complicadas por uma endarterite pulmonar esquistosomótica. Neste caso, o eletrocardiograma havia demonstrado: Ritmo sinusal. Eixo elétrico desviado para direita. Coração em posição elétrica vertical. Hipertrofia ventricular D. Hipertrofia auricular.*

Exame radiológico — Já estudamos os aspectos radiológicos da arterite pulmonar esquistosomótica, ao transcrevermos as contribuições recentes a êste respeito, respectivamente de Erfan e colaboradores e Sirry.

Endereçamos os interessados àquela parte de nosso trabalho, a fim de evitarmos repetições desnecessárias.

Patogenia — Os trematódeos adultos (*S. haematobium* ou *S. mansoni*) ou seus ovos chegam aos pulmões por via sanguínea, como êmbolos.

No caso do *S. haematobium*, cujo *habitat* é o plexo venoso vesical, os vermes adultos ou seus ovos podem ser carreados pela veia ilíaca interna (v. hipogástrica) para a veia cava inferior e daí para o coração direito, chegando por essa via aos pulmões. Estas condições justificam por que com maior frequência a esquistosomíase pulmonar é determinada pelo *S. haematobium* comparativamente ao *S. mansoni*. Entretanto, como demonstraram os estudos já citados de Shaw e Ghareeb⁴³, em região onde ocorrem ambas as espécies, a esquistosomíase pulmonar causada pelo *S. mansoni* é comparativamente mais grave do que a provocada pelo *S. haematobium*. Êste fato é bem evidenciado pela verificação da maior incidência de formas de arterite pulmonar esquistosomótica, que exprimem um processo patológico mais avançado, preponderantemente nos casos de parasitismo pelo *S. mansoni* ou, quando nos casos de infecções mistas, êste último se acha associado ao *S. haematobium*. Na América e particularmente no Brasil, que nos interessam mais de perto, só ocorre o *Schistosoma mansoni* e portanto

* A observação dêste caso serviu posteriormente de objeto a um excelente estudo do Prof. Antonio de Almeida Prado.

o material brasileiro pode servir muito bem para o estudo da localização pulmonar exclusiva pelo *S. mansoni*, o qual deve ser aproveitado para fins comparativos.

Jaffé admite que os ovos de *S. mansoni* poderiam atingir os pulmões através dos capilares hepáticos dilatados. Esta opinião não é compartilhada por outros autores.

Tão pouco se fundamenta pela anatomia patológica a suposição de que os vermes atingiriam os pulmões através do fígado e diafragma. De outro lado, o encontro de ovos do parasito no parênquima pulmonar não pode ser explicado como consequência de uma postura "in situ".

Portanto, resta como admissível, e aceito pela maior parte dos autores, a embolização como sendo o processo que propicia a disseminação e finalmente a localização pulmonar dos trematódeos sanguinícolas ou seus ovos. O *S. mansoni* tem por *habitat* a veia porta e as veias tributárias desse sistema. Na esquistosomíase mansoni em sua forma avançada com cirrose hepática, o bloqueio intra-hepático da circulação porta traz em consequência o estabelecimento de uma rica circulação colateral. É através das conexões venosas porto-cava inferior que os vermes adultos (*S. mansoni*) e seus ovos encontram caminho para se dirigir aos pulmões. Várias são as vias asseguradas ao trânsito do parasita ou seus ovos, em consequência das conexões porto-cavas, destacando-se como a preferencial as anastomoses oriundas do grupo retal e representadas pelas relações dos plexos hemorroidários, com a veia do mesmo nome afluyente da hipogástrica, que levará os ovos pela cava inferior ao coração direito e dali pela artéria pulmonar aos órgãos respiratórios.

As outras vias têm certamente um papel de menor importância e por isso deixaremos de mencioná-las (vide Meira).

Compreende-se, conseguintemente, por que, de acôrdo com o que se observa na clínica, só em casos de esquistosomíase muito adiantada, com cirrose hepática e esplenomegalia, quando o obstáculo da circulação porta criou o aparecimento de uma circulação colateral profunda ou suplementar, se estabelecem condições mais favoráveis para a localização pulmonar.

Não vamos discutir o mecanismo patogênico da esquistosomíase pulmonar, que é, aliás, o mesmo da moléstia fundamental — a esquistosomíase — qualquer que seja a sua localização; mas desejamos frisar que também ao nível do pulmão, tanto os ovos do parasita como os vermes ou seus produtos tóxicos, agindo diretamente ou à distância, ou condicionando fenômenos de natureza alérgica, determinam as lesões cujos principais característicos estudaremos a seguir.

Anatomia patológica — Já tivemos oportunidade, em outra parte deste trabalho, de nos referir às modificações vasculares da esquistosomíase pulmonar ao citar os estudos anátomo-patológicos de Miller³², Sorour⁴⁸, Clark e Graef⁹, Shaw e Ghareeb⁴³, Koppisch²⁴, Jaffé²², Potenza³⁸ e outros. Os trabalhos feitos no Brasil, da autoria de Eduardo de Araujo, Possidonio da Silva Bem, Leoncio Pinto, Bezerra Coutinho e Barros Coelho e outros, não foram incluídos porque tratam principalmente das alterações do parênquima pulmonar (granuloma esquistosomótico, alveolite aguda, pneumonia), e já foram revistos por um de nós (J. A. M.) em trabalho anterior.

Adotaremos, a seguir, a descrição de Shaw e Ghareeb, que nos parece a mais completa e de acordo com o que observamos no nosso caso n.º 1, adiante referido.

Segundo Shaw e Ghareeb, as lesões esquistosomóticas pulmonares podem ser classificadas em três grupos:

- a) o pseudotubérculo (esquistosomata ou bilharzomata) parenquimatoso (células linfoplasmocitárias, células epitelioides, eosinófilos, gigantócitos);
- b) as lesões arteriais focais;
- c) as lesões arteriais difusas — determinando a chamada “doença de Ayerza esquistosomótica” (Shaw e Ghareeb).

Vamos nos limitar à descrição das lesões arteriais, insistindo, principalmente, sobre as lesões arteriais difusas, aquelas que, em consequência à obliteração pulmonar, determinam o aparecimento de alterações ateromatosas da parede da artéria pulmonar e hipertrofia das cavidades direitas do coração.

O ovo embolizado na artéria pulmonar é bloqueado pelo tamanho do vaso ao nível do bronquíolo respiratório. Em consequência disto surge uma arteriolite aguda necrotizante, com destruição das túnicas média e íntima no ponto em contacto com o ovo. Devido à sua ação necrotizante, o ovo atravessa as paredes arteriolas, e quando atinge uma posição extravascular é que se forma o pseudotubérculo (bilharzomata ou esquistosomata).

As alterações que se operam na camada média do vaso são de importância capital. Do processo cicatricial da lesão vascular resulta uma endarterite obliterante. Entretanto, como por essa época o ovo já se tornou extravascular, a única prova da origem esquistosomótica da arteriolite obliterante é a ausência da túnica média, o que assume uma feição distintiva das lesões arteriolas da esquistosomose em relação às de outra origem. Para vencer a obliteração vascular, que dificulta a circulação pulmonar, verifica-se que o tecido que determina a oclusão vascular sofre um processo de recanalização, os vasos recémformados podem se dilatar, produzindo uma formação “angiomatóide”, na qual a camada muscular é escassa ou ausente. É de fundamental importância considerarem-se as alterações da túnica média no processo de endarterite pulmonar esquistosomótica com formação das “angiomatóides”, porque na tentativa de recanalização que se forma em seguida a uma trombose, a camada média se mantém íntegra, havendo, além disso, presença de pigmento hemático, que também falta na lesão esquistosomótica.

As lesões pertencentes ao 2.º grupo e que estamos considerando são, como já especificado, distribuídas em foco e pouco extensas.

Não obstante o seu número reduzido, estas alterações vasculares são suficientes para provocar a hipertrofia da média dos vasos próximos, mas como é poupada uma grande área do leito vascular arterial, não há hipertrofia do coração direito, nem sinais de insuficiência cardíaca congestiva.

Quando as lesões arteriais são difusas e as formações denominadas angiomatóides revestem número importante, estamos em face das lesões do 3.º grupo de Shaw e Ghareeb, que caracterizam a esquistosomíase cardíopulmonar, com hiper-

trofia e dilatação das cavidades direitas do coração e lesões ateromatosas dos vasos pulmonares de maior calibre, inclusive o tronco e ramos principais dessa artéria.

Transcrevemos do trabalho de Alves Meira o seguinte resumo que êle deu das observações de Shaw e Ghareeb sôbre êste 3.º grupo das lesões: "Shaw e Ghareeb acham que as lesões de endarterite obliterante das pulmonares são o resultado dos processos cicatriciais que se repetem pela persistência ou intermitência das reinfecções superajuntadas.

A infecção maciça dos pulmões é devida aos ovos que, quando mortos e desaparecidos, deixam, como únicos elementos capazes de caracterizar a sua passagem, as formações já referidas como angiomatóides".

Estas são originadas pela recanalização das lesões obstrutivas às vêzes com formação de verdadeiros espaços cavernosos, com destruição da camada média. Não se verifica a formação de tubérculos na parede do vaso espessado senão no caso de reinfecção. Com efeito, a passagem sucessiva de ovos determina a formação de tubérculos extravasculares que constituem as lesões parenquimatosas do 1.º grupo.

Depois, com a continuação, há aparecimento das lesões arteriais focais ou disseminadas, mas quando elas se repetem há obstrução arterial por tecido fibrocelular, acompanhada de destruição da camada média e seguida de recanalização. Se, por uma reinfecção endógena, vier um ovo a atravessar esta parede, assim poderá se formar um tubérculo com seus elementos característicos em tórno do ovo, em sua própria espessura. Estas lesões de reinfecção, graças à persistência da fonte em outros órgãos, mostram que, ao lado das lesões antigas, continuam a se formar, por persistência do trânsito dos ovos e seu embolismo nas arteríolas pulmonares, as lesões recentes que são reconhecidas pela zona de necrose circundando o ovo em pleno tecido fibroso.

As lesões "angiomatóides" são interpretadas como uma tentativa de adaptação destinada a estabelecer a permeabilidade vasal e consequentemente vencer o obstáculo na circulação pulmonar. A perda da resistência oposta pela camada média íntegra da artéria pode favorecer o aumento em tamanho dos espaços sanguíneos em dimensões cavernosas, que ultrapassam o limite do vaso original.

A ausência de trombose, as alterações da camada média e as formações angiomatóides são os característicos destas lesões, que permitem identificá-las, mesmo quando os ovos não são ocasionalmente encontrados.

"Mau grado a formação destes angiomatóides, a arteriolite obliterante provoca a mio-hipertrofia das artérias pulmonares mais calibrosas e, a despeito disso, a parede do ventrículo direito dilatado e hipertrofiado pode ser mais espessa que a do esquerdo e levar os indivíduos à morte, por um quadro de insuficiência cardíaca congestiva".

Os vermes adultos também podem determinar lesões ao nível do parênquima pulmonar. Êles chegam às artérias pulmonares por via embólica e ficam em geral a cavaleiro onde a artéria se bifurca em ramos, cujas dimensões obstam a passagem do parasito. Os vermes vivos não ocasionam nenhuma alteração das estruturas vizinhas, mas quando mortos produzem, à custa de seus produtos tóxicos de desintegração, uma característica pneumonia focal que aparece como uma área de consolidação branca opaca, redonda ou elítica, centralizada pelo verme. Quando o verme morre, aparece logo a trombose. A parede vascular é atingida

rapidamente por um processo de necrose e é invadida por eosinófilos e histiócitos; aparecem células gigantes que atacam o verme. As paredes dos alvéolos circundantes apresentam-se congestionadas e a sua luz é cheia por um exsudato fibrinoso com muitos eosinófilos, alguns neutrófilos e histiócitos e raras hemácias. Acentuando-se a ação tóxica dos produtos helmínticos, a parede arterial pode vir a desaparecer, e o verme morto aparece como extravascular. A área necrosada se reduz a uma massa densa, sem estrutura e o exsudato pneumônico se organiza em sua periferia. Depois, os restos necróticos são absorvidos, e os vermes sofrem um processo de calcificação e são encerrados em uma cápsula de tecido cicatricial. As lesões que acompanham a presença dos vermes são predominantemente os nódulos esquistosomóticos (bilharzomas ou esquistosomas), mas tanto as arterites focais como as arterites difusas foram encontradas na série estudada por Shaw e Ghareeb.

No nosso caso n.º 1 (M. G. A.), a necrópsia demonstrou a existência de alterações macro e microscópicas, que serão descritas posteriormente (vide adiante) e que correspondem em grande parte ao que acabamos de referir. Macroscopicamente foi encontrada dilatação e hipertrofia da aurícula e ventrículo direitos e dilatação do cone da pulmonar (figs. 5 e 6).

Na fig. 4 observa-se nitidamente a existência de placas de arteriosclerose ao nível do ramo principal da artéria pulmonar, notando-se, disseminado pelo parênquima pulmonar, a presença de vasos de paredes espessadas e luz entreaberta. Os vasos pulmonares aparecem como que guarnecidos por uma orla de coloração branca muito evidente na fotografia da peça.

Microscopicamente chama a atenção a existência das lesões de endarterite pulmonar de vários graus (figs. 7 a 15), obedecendo à descrição que fizemos acima. Assim é que, ao lado de lesões endarteríticas com processo de recanalização mostrando ainda a camada média da parede arterial bem conservada (fig. 8), vemos outras em que a mio-hipertrofia da média é bem nítida (fig. 10), havendo ainda em outras alterações parcialmente destrutivas da média acompanhando as formações angiomatóides do tipo cavernoso ou capilar (fig. 9). Num dos cortes (figs. 13, 14 e 15) vemos um ovo com as características do ovo do *S. mansoni*, nas proximidades da adventícia do vaso, sem determinar nenhuma reação em seu redor. No parênquima pulmonar foram encontrados vários ovos do trematódeo disseminados pelo órgão. Todos eles estavam mortos ou reduzidos a resíduos de casca, algumas vezes já calcificados, nunca existindo em torno deles qualquer reação granulomatosa.

A paciente (vide observação clínica) apresentou em vida um quadro de insuficiência ventricular direita, falecendo em insuficiência cardíaca congestiva. A necrópsia verificou lesões adiantadas de esquistosomose mansoni no fígado e intestino, além das descritas sumariamente nos pulmões, interessando principalmente, como vimos, as arteríolas pulmonares. Este caso, portanto, exemplifica perfeitamente tanto do ponto de vista clínico como do anátomo-patológico, a forma cardiopulmonar da esquistosomíase mansoni.

As alterações histopatológicas encontradas no parênquima e vasos pulmonares, neste caso, merecem, entretanto, alguns comentários. Assim, não foram encontradas senão lesões retratando um processo antigo cicatricial, pois faltou neste caso qualquer indício de embolismo recente de ovos, que seria expresso pela formação de nódulos ou pseudotubérculo extravasculares ou por uma zona de

necrose em torno do ovo nas áreas de tecido fibroso. Os ovos disseminados pelo parênquima aí já deviam estar há muito tempo, pois que todos êles estavam mortos, com o miracídio degenerado ou desaparecido, restando do ovo apenas a casca, sendo que alguns dêles já estavam calcificados. Não foram vistos, também, vestígios de passagem recente de ovos através da parede dos vasos, só se encontrando uma única vez um ovo próximo à adventícia de um vaso, o qual não exhibia nenhuma reação em seu redor. Também não se verificou, ao exame de vários preparados, a presença de vermes adultos, vivos ou mortos.

Já aludimos acima que no determinismo das lesões histopatológicas da esquistomíase pulmonar participam não só os ovos dos trematódeos (*S. mansoni* ou *S. haematobium* ou ambos), como os próprios vermes ou seus produtos tóxicos, agindo diretamente ou à distância, à custa de fenômenos alérgicos. É atualmente impossível discernir qual destas ações prevalece em cada caso, parecendo-nos razoável admitir, até maiores esclarecimentos, a conjugação de todos estes fatores lesivos.

Jaffé parece muito dogmático a êste respeito, negando aos ovos ou mesmo aos vermes uma ação direta capaz de despertar uma reação tóxica local. Esta, para êle, resulta, qualquer que seja a sua estrutura, de uma reação contra as toxinas, desempenhando os processos alérgicos nesse particular um papel saliente e predominante.

Diagnóstico — A questão do diagnóstico deve ser considerada sob dois pontos de vista. O primeiro diz respeito ao diagnóstico da moléstia fundamental ou seja a esquistomíase. O segundo refere-se especificamente ao diagnóstico da arterite pulmonar esquistosomótica.

Quanto ao diagnóstico da esquistomíase, não entraremos em delongas que nos afastariam do fim principal do nosso objetivo, que é focalizar neste trabalho a questão da arterite pulmonar esquistosomótica.

Entretanto, para que não falem as indicações necessárias para uma completa compreensão do assunto, mencionaremos rapidamente qual deva ser esta orientação diagnóstica, porque o estabelecimento da presença da esquistomíase é essencial.

Em primeiro lugar devemos considerar o critério epidemiológico, frisando mais uma vez a importância de se cogitar do diagnóstico de esquistomíase em indivíduos com quadros clínicos sugestivos da parasitose, e procedentes de suas áreas endêmicas. O esquecimento dêste critério poderá facilmente afastar o raciocínio clínico diante de um caso concreto, explicando muitas vezes o erro diagnóstico ou impedindo o seu exato estabelecimento.

No nosso País, já dissemos, só existe o *Schistosoma mansoni* e, por conseguinte, mais de perto nos interessará a patologia e a diagnose da esquistomíase mansoni.

Do ponto de vista clínico, a esquistomíase deverá ser suspeitada em indivíduos procedentes de focos conhecidos ou suspeitos, naqueles pacientes com sinais e sintomas peculiares às formas intestinal, hepática e hepato-esplênica da moléstia. Não vamos entrar no estudo destas formas clínicas da esquistomíase; apenas queremos frisar, uma vez mais, que a arterite pulmonar esquistosomótica se verifica principalmente nos indivíduos sujeitos à infecção esquistosomótica in-

tensa, geralmente repetida, e que apresentam clinicamente o quadro de cirrose hepática com esplenomegalia, com todo o seu cortêjo sintomático: hepatomegalia, esplenomegalia, com ou sem ascite, com ou sem circulação colateral, com varizes esofageanas, hemorragia esôfago-gastro-intestinal, sintomas colíticos, principalmente lesões retossigmóideas etc.

Portanto, do ponto de vista clínico, para orientação diagnóstica, é preciso, em primeiro lugar, ter-se em mente os quadros clínicos que a esquistosomíase apresenta. De outro lado, é preciso não esquecer, em casos de cor pulmonale crônico, da possibilidade etiológica da esquistosomíase.

Mas, o diagnóstico clínico da esquistosomíase é um diagnóstico de mera presunção. Devemos contudo reconhecer que os médicos com bastante experiência da moléstia fazem o diagnóstico de esquistosomíase, baseados unicamente nos dados clínicos, com muita exatidão, e têm a satisfação de ver tal diagnóstico frequentemente confirmado pelo laboratório. O diagnóstico de certeza se funda no encontro, nas fezes, dos típicos ovos de esporão lateral do *S. mansoni*.

Deve-se então uma vez suspeito o diagnóstico de esquistosomíase, solicitar o exame coprológico. Não entraremos em considerações sobre a técnica do exame de fezes, apenas nos contentando em recomendar que este exame seja solicitado com insistência, repetido várias vezes se necessário, e por meio de processos de enriquecimento. O método de exame que na prática melhores resultados tem fornecido é o processo de concentração e sedimentação de Hoffman, Pons e Janer. Se as suspeitas epidemiológicas e clínicas forem grandes e um primeiro exame de fezes resultar negativo, deve-se recorrer à repetição dos exames de fezes ou à biópsia retal pelo exame microscópico, por transparência, de um fragmento da 1.^a válvula de Houston, que oferece vantagens evidentes para o diagnóstico rápido e seguro da esquistosomíase mansoni. Em trabalho de um de nós (J. A. M.), em colaboração com Macedo Soares Jr.³⁰, onde este método diagnóstico foi estudado, concluiu-se que o “diagnóstico de esquistosomíase mansoni não deve ser excluído sem que se tenha praticado a biópsia retal, que deve ser um complemento obrigatório do exame retossigmoidoscópico nos casos clínicos suspeitos de esquistosomíase mansoni, e que apresenta real vantagem sobre o exame de fezes no diagnóstico dos casos crônicos, de longa duração, pelo maior número de resultados positivos obtidos comparativamente às coproscopias”.

A experiência, atualmente maior, sobre o mesmo assunto, só tem confirmado a opinião exarada anteriormente.

O exame retossigmoidoscópico poderá fornecer informações importantes, mas por si só é insuficiente, as mais das vezes, para um diagnóstico de certeza, que terá de se fundamentar, seja no exame de fezes, no resultado da biópsia retal ou da intradermo reação. A punção biópsia do fígado é método diagnóstico que precisa ser melhor estudado e cujos resultados, em nossa experiência, estão longe de se comparar com os anteriormente referidos.

Além do exame microscópico por transparência de um fragmento da válvula de Houston obtida por biópsia retal, pode-se lançar mão da intradermo reação para *Schistosoma*, que é prova de alta especificidade, segundo demonstrou Coutinho¹⁰, recentemente, entre nós. Em suas mãos, a intradermo diagnose da esquistosomíase mansoni forneceu 99% de resultados positivos.

No caso acima referido e que fôra apresentado a uma reunião anátomo-clínica dos médicos do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, o diagnóstico de

esquistosomíase fôra feito por um resultado fortemente positivo da intradermo reação, visto como o estado grave em que se encontrava a paciente não permitia a prática da biópsia retal, e o exame de fezes não pôde ser feito porque a paciente faleceu antes que se tivesse tido tempo para realizá-lo.

Esta, em linhas gerais, a orientação diagnóstica para a esquistosomíase mansoni.

Uma vez reconhecida a esquistosomíase, o problema que o clínico defronta é do diagnóstico da arterite pulmonar esquistosomótica.

O único meio de certeza para positivar o diagnóstico clínico da arterite pulmonar esquistosomótica é o encontro, no exame de escarro, dos ovos do parasita. Entretanto, pelas razões já expostas ao tratarmos da patogenia e anatomia patológica, compreende-se facilmente por que só raramente os ovos de *S. haematobium* ou *S. mansoni* são encontrados no escarro, ainda que eles possam estar localizados nos pulmões.

Conquanto os ovos dos esquistosomas já tenham sido encontrados no escarro (Leal Costa, Mainzer, Girgis, Bonifácio Figueiredo, Alves Meira) em casos de formas pulmonares da esquistosomíase, o único caso de arterite pulmonar esquistosomótica, que conhecemos, com presença de ovos de *S. mansoni* no escarro, consta da observação publicada por Meira.

Portanto, embora se possam contar com a possibilidade, aliás excepcional, de se encontrarem os ovos do parasita no escarro, o diagnóstico da arterite pulmonar esquistosomótica, na prática, deve ser feito levando em consideração o conhecimento do seu quadro clínico e os dados dos exames radiológicos e eletrocardiográficos. Assim, do ponto de vista clínico, nos pacientes de esquistosomíase antiga já adequadamente caracterizada, o diagnóstico de arterite pulmonar de mesma etiologia deve ser suspeitado quando existirem os sintomas cárdio-respiratórios que enumeramos acima e, principalmente, quando ao exame físico e radiológico se apurarem os sinais e sintomas indicativos da hipertensão da pequena circulação e dilatação da artéria pulmonar; em suma, quando os dados clínicos e radiológicos sugerirem a existência de um quadro de cor pulmonale crônico. Nos doentes de esquistosomíase mansoni suspeita ou já diagnosticada, o aparecimento de dispnéia de esforço, a princípio leve, agravando-se progressivamente; nos pacientes que se queixam, além da falta de ar, de palpitações, de dores torácicas, principalmente de dores precordiais; nos casos em que o exame físico verificar a existência de hiperfonese da 2.^a bulha pulmonar, com ou sem desdobramento permanente; quando existe uma pulsação sistólica com ou sem choque valvular diastólico palpável no 1.^o ou 2.^o espaço intercostal esquerdo, para fora do bordo do esterno, expressão também de uma acentuação da 2.^a bulha pulmonar; quando existem, além disso, sinais radiológicos indicativos de hipertensão pulmonar, com proeminência do arco da artéria pulmonar ou sua dilatação, desvio do eixo elétrico para direita ao eletrocardiograma, as suspeitas clínicas, de acordo com as observações transcritas, devem ser dirigidas para a possibilidade da forma cárdiovascular por endarterite pulmonar esquistosomótica. Dever-se-á então, em tais casos, estabelecer o diagnóstico diferencial com outras possíveis causas de cor pulmonale crônico, o que será objeto de algumas considerações adiante analisadas.

A inexistência de cianose, de dedos hipocráticos, não serão argumentos contrários ao juízo clínico, sendo digno de nota, também, que o quadro descrito

pode ser encontrado quando ainda faltam os sintomas próprios da insuficiência ventricular, ou estes são ainda incipientes. O exame do aparelho respiratório, por outro lado, pode deixar de fornecer elementos importantes, resumindo-se os dados do achado em discretos sinais, como sibilos, roncos e estertores subcrepitantes pouco numerosos.

Ao lado deste quadro estão presentes a hepato-esplenomegalia e os sintomas de hipertensão portal da cirrose hepática esplenomegálica esquistosomótica em sua fase compensada ou descompensada (ascite, circulação colateral etc.).

Nas fases mais avançadas do processo patológico, a dispnéia, aumentando rapidamente e chegando à ortopnéia de acentuado grau, a cianose da face e extremidades, os estertores das bases pulmonares, os escarros sanguíneos, a tosse, o edema dos membros inferiores, a anasarca, a oligúria, a hipertensão venosa, os sinais de congestão passiva visceral, a presença de ruído de galope, enfim as manifestações clássicas da insuficiência cardíaca congestiva, aparecendo num antigo doente de esquistosomíase com sintomas e sinais clínicos, radiológicos e eletrocardiográficos sugestivos de hipertensão pulmonar, devem fazer o clínico suspeitar da forma cardíopulmonar da esquistosomíase por arterite pulmonar específica, e obrigá-lo ao estabelecimento do diagnóstico diferencial com outras possíveis causas de cor pulmonale crônico, como tentaremos a seguir.

Diagnóstico diferencial — Evidentemente, não vamos considerar em todas as suas minúcias a questão do diagnóstico diferencial da endarterite pulmonar esquistosomótica. Primeiro, porque os elementos fornecidos anteriormente, já nos facilitam a compreensão do assunto e nos permitem situar o problema do diagnóstico diferencial nos seus aspectos principais, ou seja o reconhecimento entre os quadros clínicos do cor pulmonale crônico do papel que deve caber à esquistosomíase como uma de suas possíveis causas. Isto certamente limitará neste ponto a nossa tarefa. Segundo, porque o exame minucioso da questão nos levaria muito além dos objetivos principais e finalidade deste trabalho.

Na forma cardíopulmonar da esquistosomíase, o diagnóstico deve ser estabelecido com todas as eventualidades clínicas que se podem acompanhar de um quadro de cor pulmonale crônico, em consequência à hipertensão pulmonar.

Examinaremos sucessivamente e em traços rápidos, as seguintes condições:

- A) estenose mitral;
- B) artériosclerose da artéria pulmonar;
- C) dilatação congênita da artéria pulmonar;
- D) malformações congênitas, compreendendo: 1) estenose pulmonar; 2) persistência do canal arterial; 3) comunicação interauricular; 4) tetralogia de Eisenmenger;
- E) broncopneumopatias crônicas (enfisema pulmonar, asma, bronquite crônica, tuberculose crônica, fibrose pulmonar, silicose, pneumoconiose, neoplasia pulmonar, sífilis pulmonar etc.);
- F) deformidades torácicas.

A) *Estenose mitral* — A estenose mitral, causa comum do cor pulmonale crônico, é geralmente de fácil diferenciação. Além dos antecedentes reumáticos,

ela tem para configurá-la os dados do exame clínico que caracterizam a lesão orifical, e que não necessitam ser aqui referidos. Radiologicamente, o aumento da aurícula esquerda é também um argumento de peso em favor do diagnóstico da estenose mitral, pois já vimos que esta cavidade cardíaca geralmente se mostra normal nos portadores de arterite pulmonar esquistosomótica, e só excepcionalmente é encontrada ligeiramente aumentada.

B) A *arteriosclerose da artéria pulmonar*, do ponto de vista clínico e radiológico, pode ser confundida com a arterite pulmonar esquistosomótica. É afecção relativamente rara, não sendo mesmo reconhecida por alguns autores (Moschcowitz)^{32, 34}, que consideram a esclerose dos vasos pulmonares como um processo secundário à hipertensão no circuito pulmonar. Ainda que se admita a esclerose dos vasos pulmonares como primitiva, ter-se-ia que levar em consideração, no diagnóstico diferencial, o fato de que a arterite pulmonar esquistosomótica é encontrada em indivíduos com antecedentes e manifestações de uma infecção esquistosomótica adiantada, e o reconhecimento da moléstia fundamental seria poderoso argumento a favor da etiologia esquistosomótica do processo vascular, e contra a sua origem arteríolo-esclerótica primitiva.

Brill e Krygier⁷ (1941), a propósito de um caso pessoal, fizeram uma revisão da literatura sobre a esclerose vascular pulmonar primária, e reuniram cerca de 20 casos preenchendo os seguintes requisitos, julgados como indispensáveis para a sua exata catalogação:

- 1) presença de importante hipertrofia do ventrículo direito sem hipertrofia do esquerdo;
- 2) ausência de todos os fatores comumente admitidos como capazes de determinar a esclerose vascular pulmonar secundária, hipertensão pulmonar ou sobrecarga isolada do lado direito do coração.

Discutindo o diagnóstico deste processo patológico, considerado relativamente raro, os autores frisam que os sinais e sintomas presentes nos casos analisados não diferem daqueles que ocorrem em outros tipos de cor pulmonale secundários a doenças cardiopulmonares, e que o diagnóstico depende dos seguintes fatores:

- 1) demonstração (especialmente por meio radiológico e eletrocardiográfico) da existência de pronunciada sobrecarga do ventrículo direito, mas não do esquerdo;

2) exclusão, por todo meio disponível, de todas as outras causas conhecidas de sobrecarga ventricular direita, especialmente pneumopatia crônica, estenose mitral e cardiopatia congênita. Ora quer isto dizer que, na presença de doentes com lesões adiantadas de esquistosomose mansoni já diagnosticada ou suspeitada, e um quadro de hipertensão pulmonar, o juízo clínico deve se inclinar para a possibilidade de arterite pulmonar esquistosomótica desde que esta é uma causa já suficientemente conhecida de cor pulmonale crônico, não podendo ser facilmente excluída em tais circunstâncias a sua participação, e dentro do próprio critério de Brill e Krygier, defender-se a primitividade da esclerose arteriolar pulmonar.

C) A *dilatação congênita da artéria pulmonar*, considerada como lesão isolada, isto é, desacompanhada de outras malformações congênicas, é extremamente

rara. Gold¹⁷, que recentemente (1946) estudou o assunto e reviu a literatura a propósito de uma observação pessoal, estabeleceu os seguintes critérios, que ele julga devem ser preenchidos para a sua identificação:

- a) dilatação de toda a árvore pulmonar com ou sem esclerose;
- b) hipoplasia da aorta;
- c) ausência de outras anomalias congênicas, tais como persistência do canal arterial ou do septo interauricular;
- d) ausência de outras doenças primárias do coração ou pulmões e de lesão arterial primária, de reumatismo ou sífilis.

Ora, do ponto de vista prático e do diagnóstico diferencial, em face de um caso com dilatação da artéria pulmonar verificada radiologicamente ou visualizada pelo estudo angiocardiógráfico, a etiologia congênita do vaso anormalmente dilatado só poderá ser admitida, em pacientes procedentes de áreas endêmicas de esquistosomose mansoni, quando esta parasitose fôr devidamente excluída. Em outras palavras, em pacientes de esquistosomose mansoni já diagnosticada e nos quais o exame radiológico ou a angiocardiógrafia revelar uma dilatação da artéria pulmonar, o diagnóstico de dilatação congênita da artéria pulmonar só poderá ser admitido com muitas reservas, devendo prevalecer, até prova em contrário, a etiologia esquistosomótica como responsável pela dilatação daquela artéria.

Consoante os estudos radiológicos de Sirry, já citados, no cor pulmonale esquistosomótico, a aorta se apresenta com as suas dimensões dentro do limite normal, e por conseguinte nestes casos está ausente a hipoplasia do vaso, que é um dos característicos da dilatação congênita da artéria pulmonar. Greene e colaboradores¹⁸, que recentemente estudaram 4 casos de dilatação idiopática congênita da artéria pulmonar, aceitam os mesmos critérios estabelecidos por Gold para o seu diagnóstico, mas observam que a exigência da hipoplasia da aorta entre os seus requisitos torna ainda menor o número de tais casos. Esta restrição, entretanto, não invalida as considerações anteriormente feitas.

D) No diagnóstico diferencial com as *cardiopatias congênicas* devemos levar em consideração certas informações anamnéticas, como a referência à existência de uma lesão cardíaca já verificada desde o nascimento, ou pelo resultado do exame físico, que pode contribuir com elementos de grande valor para a sua suspeita (cianose sem insuficiência cardíaca, dedos hipocráticos nítidos, sopros cardíacos com caracteres e sede especiais). A angiocardiógrafia e o cateterismo cardíaco, graças a seus aperfeiçoamentos técnicos modernos, são neste sentido os mais valiosos recursos para a exata identificação dos defeitos congênicos do coração, capazes de se confundirem com o cor pulmonale crônico.

Embora nada impeça aos pacientes com esquistosomíase mansoni de apresentarem anomalias congênicas do coração, devemos ter em mente, no diagnóstico diferencial do cor pulmonale esquistosomótico com as cardiopatias congênicas que se acompanharem de dilatação da artéria pulmonar, que os elementos circunstanciais devem ser valorizados devidamente, exigindo os casos duvidosos para um juízo clínico definitivo, além de um completo exame clínico e radiológico, do auxílio dos novos métodos propedêuticos, indispensáveis em tais ocorrências (angiocardiógrafia, cateterismo intracardíaco).

O que entretanto precisa ser frisado é que a arterite pulmonar esquistosomótica deve ser incluída no diagnóstico diferencial, devendo tal suspeita diagnóstica ser considerada principalmente nos esquistosomóticos com lesões hepato-esplênicas adiantadas. Se esta orientação não for levada em conta, certos casos de arterite pulmonar esquistosomótica podem deixar de ser esclarecidos.

Ibrahim, Sorour, Eisherif e Attiah¹⁹, no Egito, depois de ressaltarem a importância da angiocardiografia e do cateterismo intracardiaco no diagnóstico das cardiopatias congênitas, julgam que o cor pulmonale esquistosomótico é mais raro do que se tem tendência a admitir, e que a sua frequência vem sendo superestimada.

Na opinião dos autores citados, os casos com dilatação da pulmonar são mais comumente congênitos do que esquistosomóticos. Conquanto a documentação apresentada por Ibrahim e colaboradores não exclua, a nosso ver, satisfatoriamente, a participação nos seus casos da esquistosomíase e nem prove inteiramente a natureza congênita da lesão arterial, eles concluem que a mera evidência de esquistosomose em casos de dilatação pulmonar não é suficiente para diagnosticá-la. Eles opinam que a parasitose pode ser uma associação mórbida e não a verdadeira causa.

A *persistência do canal arterial*, que radiologicamente exhibe uma proeminência da artéria pulmonar, apresenta semioticamente, ao nível do 2.º espaço intercostal esquerdo, um sopro contínuo, que aumenta de intensidade na parte final da sístole e cobre a 2.ª bulha, e continua por-tôda a diástole. Quando muito intenso, este sopro pode ser audível em todo o tórax e mesmo no dorso. Nos casos atípicos, em que o sopro deixa de ter o caráter contínuo ou os componentes sistólico ou diastólico do mesmo são indistintos, consegue-se, pelo estudo angiocardiógráfico e pelo cateterismo intracardiaco, estabelecer o diagnóstico com grande segurança.

A *estenose pulmonar* geralmente se associa a outras anomalias congênitas e notadamente integra a tetralogia de Fallot; mas pode ocorrer sob forma isolada, sendo compatível com relativo bem-estar dos pacientes e encontrada em adultos jovens. A cianose pode estar ausente ou aparecer tardiamente. O eletrocardiograma evidencia geralmente um considerável desvio do eixo para direita. Ao exame radiológico o coração apresenta-se em forma de bota, com aumento do V.D., com deslocamento do ápex do coração para cima e alargamento da artéria pulmonar. Há, à ausculta, um sopro sistólico intenso, cuja sede de maior intensidade corresponde à área pulmonar. Com frequência, acompanha este sopro um thrill nítido; a 2.ª bulha pulmonar é hipofonética. Greene e colaboradores, a propósito de 4 casos de estenose pulmonar isolada, frisam a sua raridade, só tendo reunido 68 casos de literatura comprovados anátomo-patologicamente. Eles acentuam a importância dos estudos angiocardiógráficos e do cateterismo intra-

Já tinha o presente trabalho sido entregue para publicação quando Barbato, Pinto Lima, Merlino, Cotrim e Moraes Dantas apresentaram ao Departamento de Medicina da Associação Paulista de Medicina, em 13-7-1950, uma comunicação versando sobre o "Coração pulmonar crônico na esquistossomose", baseada no estudo de alguns casos pessoais. Dêstes, um foi documentado com o exame angiocardiógráfico e cateterismo intracardiaco, permitindo a exclusão diagnóstica das cardiopatias congênitas, de acordo com o que acima expusemos.

cardíaco para o seu diagnóstico, em cuja falta só o diagnóstico anatômico é seguro. Citam, a propósito, Routier e Escolle, que demonstraram a falibilidade do critério clínico do diagnóstico da estenose pulmonar baseado na presença do sopro sistólico pulmonar típico, do thrill e da dilatação da artéria pulmonar evidenciada radiologicamente. Em 82 casos de literatura que satisfaziam o critério clínico, apenas 16 foram confirmados na autópsia como estenose pulmonar pura congênita.

A estenose pulmonar com persistência do foramen oval constitui, segundo Selzer e colaboradores⁴², uma entidade patológica distinta. É muito proveitosa a este respeito a leitura desse trabalho, onde se encontram, detalhadamente estudados, os elementos do seu diagnóstico diferencial com outras malformações congênitas cianóticas (tetralogia de Fallot, complexo de Eisenmenger), analisadas em base de dados clínicos, radiológicos e anátomo-patológicos. Nos casos suspeitos clinicamente de persistência do canal arterial (sem os sinais característicos) ou de estenose pulmonar, a existência de elementos circunstanciais, como a referência a uma possível infecção esquistosomótica, a existência de sintomas sugestivos desta parasitose, máxime a hepato-esplenomegalia e o seu diagnóstico pela presença dos característicos ovos látero-espiculados nas fezes dos pacientes, ou verificados pelo exame por transparência de fragmento de uma válvula de Houston obtido por biópsia retal, constituirão elementos de grande importância para o diagnóstico diferencial falando a favor do cor pulmonale crônico esquistosomótico. Não obstante, os exames complementares (completo estudo radiológico, cateterismo cardíaco) contribuirão para esclarecer de forma definitiva as dúvidas.

Nos casos de *defeito septal auricular*, a cianose pode estar ausente, ser ligeira ou só aparecer tardiamente. O eletrocardiograma revela desvio do eixo para direita, de grau variável, ligeiro ou acentuado, e ocasionalmente registram-se também distúrbios na condução aurículo-ventricular ou bloqueio de ramo direito. Radiologicamente o coração assume a forma globular ou quadrada, com aumento do lado direito e dilatação da artéria pulmonar. Radioscopicamente verifica-se dança hilar. À ausculta, o sinal mais comum é um sopro sistólico mesoesternal de intensidade variável, podendo ser ligeiro ou de média intensidade; existe também sopro diastólico no 3.º espaço junto ao bordo esternal, o qual pode ser pouco intenso, mas, às vezes, é acentuado. No foco pulmonar tanto a 1.ª como a 2.ª bulha são acentuadas. Entretanto, nenhum destes sinais é patognomônico. Nos casos difíceis a cateterização cardíaca esclarece definitivamente o diagnóstico, tornando-se este recurso, por conseguinte, indispensável em tal eventualidade.

Consiste o *complexo de Eisenmenger* na associação do defeito do septo interventricular, aumento do ventrículo direito, transposição da aorta para a direita, e a artéria pulmonar e o seu infundíbulo mostram-se normais ou dilatados, podendo existir, por conseguinte, uma insuficiência pulmonar (ao contrário da tetralogia de Fallot, onde há estenose pulmonar).

Dessa forma, no complexo de Eisenmenger há excesso da corrente sanguínea nos pulmões, enquanto na tetralogia de Fallot este fluxo é insuficiente. Os pacientes portadores do complexo de Eisenmenger mostram: incapacidade física, cianose, dedos hipocráticos (desvio da corrente da direita para a esquerda, sendo o sangue venoso derivado para o sistema arterial) e congestão pulmonar.

Radiologicamente verifica-se aumento cardíaco interessando particularmente o lado direito, proeminência da artéria pulmonar e aumentada vascularização do pulmão. À ausculta observa-se a 2.ª bulha pulmonar acentuada. Usualmente ou-

ve-se um sôpro sistólico basal geralmente forte e acompanhado de sôpro diastólico.

Este complexo de Eisenmenger não é de observação comum e deve ser diferenciado da tetralogia de Fallot, o que se consegue modernamente à custa do cateterismo intracardiaco.

Aly Sirry⁴⁶, em estudo, a que já nos referimos extensamente em outra parte deste trabalho, chama especialmente a atenção para o diagnóstico diferencial do ponto de vista radiológico do cor pulmonale esquistosomótico, com os defeitos congênitos do coração. Segundo este autor, a verificação de sombras pulmonares (infiltrações basilares) devidas à esquistosomíase pulmonar deve sugerir a possibilidade do cor pulmonale esquistosomótico; no mesmo sentido falaria a elevação da cúpula diafragmática esquerda (devida à esplenomegalia). Mas, muito mais importante do ponto de vista do diagnóstico diferencial, seriam as dimensões e a posição da aorta. No cor pulmonale esquistosomótico a aorta radiologicamente é de sede e dimensões normais, enquanto que nos defeitos congênitos mais facilmente confundíveis a aorta é hipoplásica (defeito septal auricular ou persistência do canal arterial) ou dextroposta (complexo de Eisenmenger).

E) O diagnóstico diferencial do cor pulmonale esquistosomótico com as *broncopneumopatias crônicas* (bronquite crônica, enfisema pulmonar, sífilis pulmonar, sarcoidose pulmonar, pneumoconiose etc.) é geralmente facilitado pela anamnese, exame clínico do aparelho respiratório e subsidiários (exame de escarro, reação de Wassermann, pesquisa de cogumelos, exame rariológico etc.); não vamos, pois, entrar em maiores detalhes a seu propósito. Os interessados encontrarão na monografia de um de nós (Alves Meira)²⁹, na parte do diagnóstico diferencial da esquistosomíase mansoni pulmonar, inclusive de sua forma cardiopulmonar, uma extensa discussão do assunto, o que nos autoriza a não insistir neste ponto. Na mesma monografia, longas considerações são feitas sobre o diagnóstico das formas pulmonares da esquistosomíase mansoni que podem evoluir sem o quadro de cor pulmonale crônico. Também ali é estudada a questão do cor pulmonale esquistosomótico em suas relações com a moléstia de Ayerza.

Na sua já citada monografia, Meira, ao se referir às lesões arteriais difusas encontradas na esquistosomíase pulmonar e descritas por Shaw e Ghareeb sob a denominação de moléstia de Ayerza bilharziótica, escreveu: "Nenhuma denominação tão infeliz como "moléstia de Ayerza" podiam ter escolhido Shaw e Ghareeb para o subtítulo da lesão que eles descreveram na esquistosomíase. Efetivamente, o nome de "moléstia de Ayerza" deve ser evitado a todo custo, porque ele trouxe tanta confusão na patologia, conforme demonstrou Brenner (1935), confirmando o conceito que Jairo Ramos já havia entre nós formulado em 1932". Por isso, adianta Meira, se algum nome deve ser dado a estas lesões das artérias pulmonares com ou sem repercussão cardíaca, nenhum seria melhor que arterite pulmonar esquistosomótica, de Shaw e Ghareeb, desde que foram eles que a caracterizaram e pelo seu estudo permitiram diferenciá-la das arterites pulmonares de outras etiologias. Ao afirmarem que "no Egito a esquistosomíase é o agente etiológico da "moléstia de Ayerza", Shaw e Ghareeb não levaram em conta as dúvidas existentes sobre o conceito da "moléstia de Ayerza".

Estas referências vêm a propósito de um recente artigo (1949), intitulado "Ayerza's Disease, Silicosis and Pulmonary Bilharziasis", no qual o seu respeitável autor, Henry Tidy⁵², cometeu evidentes erros de interpretação ao tentar ex-

plicar as diferenças etiológicas entre a “moléstia de Ayerza” no Egito e na América do Sul (Brasil). Tais equívocos foram fruto do desconhecimento da nossa literatura (o autor confessa não estar informado da publicação de casos de esquistosomíase pulmonar no Brasil) e também confusão de ordem geográfica, pois que o citado autor alude à “moléstia de Ayerza” como descrita em Buenos Aires, atribuindo-a a Arrilaga, em 1913, como tendo sido feita no Brasil (!) e considera os casos de “moléstia de Ayerza” como ocorrendo nos brasileiros que trabalham nas minas de ouro, numa altitude de 4.270 metros, nos Andes (!), sugerindo daí que a “moléstia de Ayerza” vista no Brasil, pode ser explicada como o resultado de silicose ocorrendo em elevadas altitudes (!), ao contrário do que acontece no Egito, onde a esquistosomíase desempenha um papel já bem conhecido.

Se Shaw e Chareeb não tivessem incluído a denominação de “moléstia de Ayerza” na descrição da arterite pulmonar esquistosomótica, certamente que Tidy não encontraria pretexto para emitir tão errônea opinião.

Por isso, pensamos que talvez esta nossa contribuição, na qual pelo menos um caso devidamente comprovado pela necrópsia foi estudado, possa ter o mérito de chamar a atenção dos estudiosos para a existência da forma cárdiopulmonar da esquistosomíase mansonii no Brasil.

F) As *deformidades torácicas* (cifoscoliose em particular) são mencionadas no tópico do diagnóstico diferencial porque em alguns casos elas podem ser causa de cor pulmonale crônico, tendo em 1943 Hertzog e Manz (citados por Spain-Handler)⁴⁹ reunido 126 casos da literatura. Tal fato deve ser conhecido para que na eventualidade de sua possível verificação em portadores de esquistosomíase mansonii, ser levado na devida conta quanto ao diagnóstico diferencial. Como, entretanto, se trata de uma possibilidade teórica, não faremos senão mencioná-la.

Antes de terminarmos esta parte do nosso trabalho desejamos fazer algumas considerações sobre o diagnóstico diferencial da arterite pulmonar esquistosomótica com a miocardite esquistosomótica. Tanto do ponto de vista clínico, radiológico e eletrocardiográfico, como do anátomo-patológico, podemos dizer, com apóio em tudo o que anteriormente foi referido, que a arterite pulmonar esquistosomótica possui um quadro que permite a sua individualização.

O mesmo não pode ser dito com referência à miocardite esquistosomótica. Fora alguns casos em que o granuloma esquistosomótico foi verificado ao exame microscópico do miocárdio (Lampe²⁵, Dew¹², Clark e Graef⁹, Jaffé²² e Armbrust²), na maioria dos casos de miocardite esquistosomótica as lesões miocárdicas são inespecíficas, rotulando-se o diagnóstico como de esquistosomose pela concomitância das lesões inequívocas da parasitose em outros órgãos, de acordo com o conceito defendido por Jaffé e aceito sobretudo pelos clínicos venezuelanos. A questão da miocardite esquistosomótica permanece ainda *sub judice*, faltando-nos presentemente provas totalmente convincentes da sua existência. Em primeiro lugar, é preciso considerar a questão da moléstia de Chagas que, a nosso ver, complica a solução do problema. Já em 1944 um de nós (Alves Meira)³¹, em colaboração com Ramos Jr., escrevia, entre outras conclusões de seu trabalho: “Nas regiões onde a moléstia de Chagas e a esquistosomíase mansonii (Doença de Man-

son-Pirajá da Silva) têm a mesma distribuição geográfica, a solução do problema da miocardite esquistosomótica é muito mais difícil, exigindo-se muito maior cuidado para o seu exato reconhecimento". Justificando esta conclusão, os autores citados apresentaram uma observação de um paciente que clinicamente apresentava um quadro de insuficiência cardíaca, com evidente aumento da área cardíaca e alterações eletrocardiográficas compatíveis com o diagnóstico de comprometimento miocárdico e presença de ovos de *S. mansoni* ao exame parasitológico das fezes. Tratava-se, por conseguinte, de um caso que clinicamente se ajustava perfeitamente ao diagnóstico de miocardite esquistosomótica. Vindo o paciente a falecer em consequência de uma nefrose mercurial, a necrópsia revelou lesões esquistosomóticas intestinais, hepáticas e pulmonares, mas ao exame microscópico cuidadoso do miocárdio conseguiu-se evidenciar a presença das formas em leishmanias do *Trypanosoma cruzi*. Tratava-se, então, de um caso de miocardite chagásica associada a lesões esquistosomóticas do fígado, intestino e pulmão, dependendo a insuficiência cardíaca indiscutivelmente da cardiopatia chagásica. Renato Lobo²⁶, que na Bahia estudou mais recentemente as determinações cardíacas da esquistosomose mansoni, não eliminou em suas observações clínicas, com as provas de laboratório indispensáveis (reação de fixação de complemento e o xenodiagnóstico), a possibilidade da concomitância da moléstia de Chagas, cuja importância clínica, do ponto de vista cardiológico, os trabalhos de Pondé³⁶ ali puseram em destaque.

Estes fatos são bastante evidentes para aconselhar a maior cautela no julgamento da etiologia esquistosomótica das miocardites nas áreas endêmicas das duas parasitoses e é por isto que julgamos ainda insuficientes as provas a seu favor. Também do ponto de vista eletrocardiográfico exclusivo, os dados fornecidos por alguns autores (Sanabria^{40, 41}, Ruiz Rodrigues³⁹) não vêm acobertados da mesma crítica, pois que também nestes casos a moléstia de Chagas não foi devidamente excluída pelos métodos adequados. De outro lado, as alterações eletrocardiográficas atribuíveis a um comprometimento miocárdico, pela esquistosomose, não têm sido verificadas com a frequência que seria de se esperar em relação com os estudos anátomo-patológicos de Jaffé (Alves Meira e Ramos Jr.³¹, Bernardo Figueiredo Magalhães e Caio Benjamim Dias²⁷).

Queremos deixar bem claro o nosso ponto de vista sobre o assunto. Não negamos a existência de uma miocardite esquistosomótica (forma granulomatosa), mas quanto à forma que se enquadra na miocardite inespecífica ou isolada de Fiedler, de origem tóxica ou alérgica, pensamos que os dados de que atualmente dispomos, para aceitá-la, ainda são insuficientes, devendo o assunto ser objeto de maiores indagações.

Parece-nos, nesta ordem de idéias, importante referir que os casos de Lampe²⁵, Clark e Graef⁹ e Armbrust², nos quais o granuloma esquistosomótico foi encontrado no miocárdio, havia intenso comprometimento pulmonar pelos ovos do parasita (Lampe, Armbrust). Este último escreve mesmo: "Havia graves alterações pulmonares, origem mais que provável da hipertrofia constatada no ventrículo direito". No caso de Clark e Graef, como já citamos, os autores responsabilizaram, pela hipertrofia do ventrículo direito e insuficiência cardíaca congestiva, as lesões das arteríolas pulmonares, dando muito menor realce ao achado do granuloma esquistosomótico miliar miocárdico no determinismo do quadro anátomo-clínico.

Importa, portanto, do ponto de vista prático, diferenciar clinicamente a arterite pulmonar esquistosomótica da miocardite de igual etiologia. Pelo menos com referência à arterite pulmonar esquistosomótica, pensamos possuir informações suficientes que nos permitem orientar com segurança o seu diagnóstico.

Com efeito, em paciente de esquistosomose mansonii de forma hepato-esplênica adiantada, com ou sem sintomas de insuficiência cardíaca manifesta e com um síndrome de hipertensão da circulação pulmonar bem caracterizada clínica, radiológica e eletrocardiograficamente, devemos nos inclinar favoravelmente para o diagnóstico de arterite pulmonar esquistosomótica. Julgar-se da concomitância nestes casos de uma miocardite da mesma etiologia não será possível, com os nossos meios atuais de diagnóstico.

Por outro lado, do ponto de vista clínico, só se poderá suspeitar da miocardite esquistosomótica nos esquistosomóticos antigos, já em fase de insuficiência cardíaca, com manifestas alterações eletrocardiográficas significativas de um comprometimento miocárdico, com dilatação global do coração ao exame radiológico, sem outra causa etiológica conhecida (como sífilis, reumatismo, moléstia de Chagas, hipertensão arterial, arteriosclerose, lesões valvulares, nefropatia, anemia etc.). Em resumo, em face da casuística já conhecida, em presença de cor pulmonale crônico num esquistosomótico, a possibilidade diagnóstica de arterite pulmonar esquistosomótica deve prevalecer clinicamente sobre a da miocardite de mesma etiologia.

Neste particular, nosso ponto de vista é diametralmente oposto ao de Jaffé, que julga muito difícil separar as lesões cardíacas dependentes das lesões vasculares pulmonares daquelas produzidas pela própria miocardite.

Pensamos, ao contrário, ser possível, com o auxílio de dados clínicos, radiológicos e eletrocardiográficos, separar em cada caso particular a arterite pulmonar esquistosomótica da miocardite de mesma etiologia. Os elementos do diagnóstico diferencial foram resumidamente esboçados. Uma estreita e indispensável colaboração entre clínicos e patologistas será entretanto a forma de contribuir para o completo esclarecimento do assunto.

Evidentemente, nos casos iniciais, quando as lesões arteriolares se limitarem exclusivamente às pequenas artérias intrapulmonares sem se acompanhar ainda de repercussão clínica para o lado da circulação pulmonar, o diagnóstico clínico de arterite pulmonar esquistosomótica não será possível. Nestes casos, só a evolução clínica e a observação prolongada dos pacientes poderão prestar esclarecimentos diagnósticos. Assim, na falta do síndrome de hipertensão da pequena circulação, demonstrável clínica, radiológica ou eletrograficamente, o diagnóstico é da alçada exclusiva da anatomia patológica. Os estudos radiológicos de Erfan e colaboradores¹⁶ (1949), se confirmados, poderão contribuir também para o reconhecimento das fases iniciais da forma cardiopulmonar da esquistosomose (lesões de grau I, alterações focais arteriais e lesões de grau II: alterações arteriais difusas com ligeiras modificações cardíacas).

Julgamos, entretanto, que a arterite pulmonar esquistosomótica é passível de um diagnóstico clínico, de acordo com a sintomatologia, sinais físicos, radiológicos e eletrocardiográficos já estudados, e que possuímos, por conseguinte, em certos casos, elementos para identificá-la em vida.

Pensamos que, de acordo com os dados examinados, estamos perfeitamente capacitados para estabelecer, em bom número de casos, o diagnóstico exato da

arterite pulmonar esquistosomótica, uma vez afastadas as outras possibilidades que consideramos na parte do diagnóstico diferencial. Em outras palavras, a arterite pulmonar esquistosomótica não deve ser mais, apenas, um achado de autópsia, pois a sua importância clínica justifica que estejamos habilitados para o seu reconhecimento. É importante, neste sentido, ter o médico em mente que a esquistosomíase mansoní pode ser responsável por um quadro de cor pulmonale crônico, conseqüente às lesões da artéria pulmonar e seus ramos.

A presença dos ovos típicos do trematódeo no escarro dos pacientes, quando constitua o elemento de certeza diagnóstica, não pode ser considerada fundamental. A ausência dos mesmos ovos no escarro não deve, pois, ser considerada incompatível com o diagnóstico, devido a ser o seu encontro excepcional, dada a natureza das lesões determinadas pelo próprio ovo ao nível do parênquima e vasos pulmonares.

Em vista do que até aqui escrevemos, parece não assistir a Jaffé razão alguma para negar a importância clínica da esquistosomíase pulmonar. Ao contrário, é preciso que os clínicos se esforcem por diagnosticá-la mais precoce e frequentemente.

Vale a pena a este propósito transcrever o seguinte trecho do trabalho de Mousa³⁵, já citado:

“Por último, falando praticamente, se os clínicos esperam diagnosticar esta doença (referindo-se à arterite pulmonar esquistosomótica) no seu estado terminal e irreversível, nenhum auxílio poderá ser prestado a estes casos. O Dr. Salah, do Departamento Tropical, disse-me suspeitar de uma lesão esquistosomótica pulmonar em casos de fibrose hepatolienal com dedos hipocráticos, na ausência de outras causas comuns desta deformação digital (comunicação pessoal). Eu acrescento que ela deve ser suspeitada também em qualquer caso de esquistosomíase somática acompanhada de acentuação da 2.^a bulha pulmonar, em adultos jovens sem outras lesões cardíacas responsáveis por esta modificação. A importância do diagnóstico precoce não reside apenas em se começar precocemente o tratamento, como usualmente se faz em outras lesões esquistosomóticas, mas para acautelar-nos, especialmente em casos com lesões pulmonares, porque complicações pulmonares fatais foram registradas por muitos observadores do Kasr el Ainy Hospital e no Exército egípcio. Reações pulmonares leves são frequentemente encontradas nos casos sob observação no hospital, durante a última metade da série de tártaro emático, e elas são consideradas alérgicas ou embólicas; enquanto os vermes vivos ou ovos são inócuos, os produtos derivados dos parasitas mortos são extremamente tóxicos, produzindo uma pneumonia necrótica focal característica”.

EVOLUÇÃO — PROGNÓSTICO — TERAPÊUTICA

Poucas informações fornecem os estudos até aqui publicados, sobre a evolução da arterite pulmonar esquistosomótica, a respeito do que nossos conhecimentos atuais se mostram de todo insuficientes.

Realmente, ainda carecemos de informações precisas quanto ao tempo de evolução da forma cardiovascular da esquistosomíase, e quais as suas verdadeiras modalidades evolutivas, por isso que se desconhece inteiramente o tempo que medeia entre as suas manifestações iniciais e a instalação do quadro completo da insuficiência ventricular terminal.

Tudo que sabemos é que as lesões de endarterite pulmonar esquistosomótica são progressivas e irreversíveis, mas ignoramos a sua exata duração.

Assim é que faltam ainda estudos que nos mostrem o tempo de sobrevivência dos pacientes surpreendidos na fase que precede à instalação da insuficiência ventricular direita terminal, e qual a duração dessa fase. Somente o estudo clínico e radiológico cardiovascular e pulmonar de um grande número de pacientes com as formas adiantadas da esquistosomíase mansoni poderá trazer alguns esclarecimentos sobre este ponto. Mas, infelizmente, tais estudos faltam completamente, em vista do número relativamente pequeno de casos conhecidos. Por outro lado, quando os pacientes atingem a fase de insuficiência ventricular direita, e na maioria das vezes é neste estado que se apresentam pela primeira vez ao médico, pouco tempo têm eles de sobrevivência, vindo a falecer geralmente dentro de prazo relativamente curto, não obstante as medidas terapêuticas indicadas.

Por conseguinte, nas formas cardiopulmonares da esquistosomíase por arterite pulmonar esquistosomótica, o prognóstico é sempre reservado, devendo ser todo caso desta espécie considerado grave, em virtude da extensão e irreversibilidade das lesões e suas funestas consequências para o lado da funcionalidade pulmonar e circulatória. Nos casos avançados de tal modalidade clínica de esquistosomíase pulmonar, o prognóstico é gravíssimo, como provam os casos até aqui publicados, em que os sintomas de insuficiência cardíaca levaram os doentes à mesa de necropsia (Alves Meira). Mesmo nos casos de formas iniciais, com insuficiência ventricular ainda não manifesta ou apenas incipiente, o prognóstico é sombrio, pela evolução progressiva a que eles estão sujeitos.

Entretanto, em face do nosso caso (M. A. P.), alguns anos podem decorrer antes que se instale a insuficiência ventricular direita, apesar de coexistir a hipertrofia do ventrículo. Este nosso caso está sob observação há pouco mais de 2 anos, sem que a fase inicial tenha se modificado.

Conclui-se do que foi acima exposto, que pouco se pode atualmente esperar da terapêutica, na esquistosomíase complicada por arterite pulmonar. Considerando-se que estes pacientes, via de regra, já apresentam uma forma adiantada de cirrose hepática esquistosomótica com esplenomegalia, poucas esperanças podemos depositar no tratamento da própria moléstia fundamental, a esquistosomíase, que, chegada a esta fase clínica evolutiva, apresenta-se com lesões de caráter irreversível de vários órgãos, não respondendo senão muito precariamente às medidas terapêuticas contra ela dirigidas.

Nos casos de arterite pulmonar esquistosomótica, já chegados à fase final de insuficiência ventricular, os pacientes devem ser tratados como cardíacos e submetidos à terapêutica clássica deste estado (repouso absoluto, dieta açetada, digitalização, diuréticos mercuriais ou do grupo das xantinas, oxigenoterapia etc.), devendo-se abandonar qualquer tentativa de medicação específica (antimonial), que nestes casos, além de inoperante, pode ser prejudicial pelos seus efeitos sobre o miocárdio, conforme tem sido ultimamente mostrado por estudos cuidadosos (Bernardo Figueiredo Magalhães e Caio Benjamim Dias²⁷, Leonard Tarr⁵¹, Caio B. Dias¹³).

Nas formas de arterite pulmonar esquistosomótica em período anterior ao estabelecimento da insuficiência ventricular direita, o tratamento específico, à base de antimonials (Repodral, Fuadina, Anthiomalina), deverá ser conduzido com cuidado, procurando-se tatear a tolerância dos pacientes. Estes devem ser rigo-

rosamente observados durante a vigência da terapêutica, a fim de que a medicação possa ser suspensa ou reduzida ao primeiro sinal de intolerância. Desde que a medicação pode determinar o comprometimento miocárdico (embora quase sempre de caráter reversível), é óbvio que, nestas circunstâncias, os pacientes a ela submetidos devem ser seguidos com exames clínicos diários e repetidos exames eletrocardiográficos.

E' bem de ver que a terapêutica antimonial deve ser instituída cautelosamente (apesar de não promover a reparação das lesões), porque à sua custa pode se conseguir a morte dos parasitas e consequentemente impedir que novos ovos ou trematódeos sejam carreados às artérias pulmonares, agravando as lesões já existentes. Pela morte dos parasitas suprime-se, de outro lado, a fonte de produtos tóxicos verminóticos, que têm, também, alguma responsabilidade no processo patológico.

Atente-se, entretanto, para o fato de que a morte em massa dos parasitas, mercê da administração de um tratamento antimonial intensivo, pode determinar seja fenômenos de sensibilização, por dispersão de produtos de desintegração dos vermes mortos (Koppisch), seja o aparecimento de focos pneumônicos em tôrno dêstes, quando já localizados nos pulmões (Shaw e Ghareeb). Erfan e colaboradores¹⁶ chamaram a atenção para os aspectos radiológicos das reações pulmonares ocasionadas pelo tratamento antimonial, e que foram atribuídas à alergia ou reação focal em tôrno das lesões pulmonares. Do ponto de vista clínico, estas lesões assumem o caráter de uma pneumonia focal.

Radiologicamente pode-se observar, segundo Erfan e colaboradores, com respeito às reações cardiopulmonares no decurso do tratamento antimonial: aumento da sombra cardíaca; as sombras hilares tornam-se mais extensas e densas e com limites esfumados; os pulmões apresentam áreas pequenas ou grandes de opacidade, as quais podem ser mais acentuadas num dos pulmões, e são geralmente, quanto à sede, localizadas na parte basal ou paramediana. Tais áreas são densas no centro e têm um contôrno esfumado assemelhando-se àquelas produzidas por broncopneumonia ou congestão ativa dos pulmões. Elas se desenvolvem, às vezes, em tôrno das lesões pulmonares anteriores ao tratamento. Pode existir concomitantemente uma reação pleural sob a forma de um pequeno derrame. Estas reações do antimonial geralmente regredem. Os pulmões tornam-se mais claros e o coração readquire seu tamanho primitivo. Estes fatos devem ser retidos, porque êles põem em evidência que o tratamento antimonial em indivíduos com lesões esquistosomóticas viscerais adiantadas deve ser feito com o máximo de precaução e com perfeito conhecimento das suas possíveis consequências para os doentes.

Com razão aconselham, portanto, Erfan e colaboradores, a "empregar os compostos antimoniais com cuidado na forma cardiopulmonar, pois que o ventrículo direito já sobrecarregado pela hipertensão pulmonar poderá não suportar ou mal resistir à sua ação direta sôbre o miocárdio, e reações pulmonares agudas e gerais podem sobrevir de sua administração. Os antimoniais são contra-indicados quando o ventrículo direito está insuficiente".

Por outro lado, os pacientes com arterite pulmonar esquistosomótica não podem ficar entregues à sua sorte, desprovidos de uma assistência médica eficiente, que deverá procurar, na medida de suas possibilidades, prolongar a existência e minorar os seus padecimentos. E' por essa razão que não descuramos do trata-

mento integral dos pacientes, procurando atender, com todos os recursos da terapêutica atual, a situação de cada caso considerado individualmente.

Sem entrarmos no exame minucioso da questão terapêutica da esquistosomíase mansonii complicada por arterite pulmonar, o que fugiria aos limites deste trabalho, desejamos expor, ainda que superficialmente, em linhas gerais, a orientação que seguimos nestes casos.

Nos casos de arterite pulmonar esquistosomótica procuramos inicialmente tratar a doença fundamental — a esquistosomíase mansonii — que, como já repetimos várias vezes, se apresenta nestes pacientes sob a forma de uma grave cirrose hepática esquistosomótica esplenomegálica, não raramente acompanhada também de manifestações intestinais.

Em primeiro lugar, são os pacientes submetidos a um regime alimentar apropriado, recomendando-se uma dieta hiperprotéica, hipogordurosa e rica em hidratos de carbono, com o que procuramos atender ao déficit protéico geralmente existente, e a proteger o funcionamento hepático, sempre alterado. As necessidades em vitaminas são satisfeitas por um regime alimentar ricamente vitamínico, além de um suplemento sob a forma de medicação polivitamínica, com o que procuramos corrigir as deficiências vitamínicas frequentes em tais casos e proporcionar material indispensável para a proteção hepática.

A anemia hipocrômica, mais encontrada, é correta com a administração de medicamento ferruginoso em doses adequada (sulfato ferroso, ferro reduzido etc.). Sempre associamos os extratos hepáticos não purificados, visando fornecer, além do fator antianêmico, cujo acúmulo na célula hepática deve ser favorecido nestes casos, como pela sua riqueza em complexo de vitamina B.

A administração de vitamina K é feita na eventualidade da existência de hipoprotrombinemia previamente determinada. Os fatores lipotrópicos (colina, metionina) também são usualmente empregados. As moléstias associadas (outras verminoses, amebíase, malária etc.), são tratadas concomitantemente pelos meios terapêuticos adequados. Com estas medidas e com o repouso absoluto no leito, verificamos geralmente resultados satisfatórios, que se traduzem pelo aumento de peso, melhora das condições hematológicas e correção dos distúrbios metabólicos (hipoproteinemia e suas consequências). Quando a anemia é intensa e consequente, geralmente, a perdas sanguíneas abundantes, pela ruptura de varizes esofageanas, indicamos transfusões sanguíneas em doses adequadas (350-500 cm³) e repetidas, o que é acompanhado de exames hematológicos frequentes para avaliação dos resultados.

Em seguida iniciamos o tratamento da esquistosomíase, o que fazemos geralmente com os antimoniais (Fuadina, Repodral, Anthiomalina), sempre por via intramuscular. O tratamento é feito de forma a serem administradas séries totais de 60 cm³ desses medicamentos.

O tratamento antimonial é controlado por exames de fezes, e ultimamente pela biópsia retal, com exame por transparência de um fragmento da 1.^a válvula de Houston.

Não somos entusiastas do tratamento intensivo da autoria de Alves e Blair, muito embora no caso n.º 2 aqui registrado, uma variedade desse tratamento tenha sido empregada, aliás sem nenhuma reação desagradável e com inteiro sucesso.

Após a reavaliação completa do caso, com repetição dos exames de laboratório, julgamos da oportunidade da esplenectomia (não temos ainda experiência

sobre as intervenções de anastomose porto-renal ultimamente indicadas no tratamento cirúrgico da hipertensão portal). Sem entrarmos em maiores detalhes sobre as indicações da intervenção cirúrgica, podemos adiantar que o critério que obedecemos para indicar a esplenectomia em tais casos se resume:

- a) quando o baço, muito aumentado de volume, traz desconforto ao paciente, como sensação dolorosa abdominal ou de peso no hipocôndrio esquerdo, incapacitando o paciente para o trabalho ativo;
- b) quando ocorrem hemorragias esôfago-gastro-intestinais, geralmente pela ruptura de varizes esofageanas;
- c) quando o exame hematológico revela leucopenia, oligocitemia e plaquetopenia. Temos observado que, apesar de todo o tratamento médico acima delineado, o quadro sanguíneo não se normaliza. Assim, o número de eritrócitos e a dosagem de hemoglobina não atingem valores normais. A leucopenia também continua manifesta e existe, além disso, frequentemente, plaquetopenia. Aliás, temos observado que um dos efeitos mais favoráveis e característicos da esplenectomia é a melhoria do quadro sanguíneo, desde que, por seu intermédio, consegue-se suprimir o quadro de depressão medular por hiperesplenismo;
- d) quando, no decurso da observação dos casos verificamos, pelo estudo da funcionalidade hepática, que as lesões do fígado não atingiram um grau muito avançado, mostrando o estudo das provas funcionais a obtenção de alguma melhora com o tratamento médico instituído;
- e) quando os pacientes se apresentam ainda em fase de compensação da cirrose hepática, isto é, em fase anascítica.

Não entra nos moldes deste trabalho a apreciação do efeito da esplenectomia sobre o curso da esquistosomíase hepato-esplênica. O que apenas desejamos frisar é que em um dos nossos pacientes (M. A. P.) a esplenectomia foi indicada e 2 anos após a intervenção o paciente apresentava-se, sob muitos pontos de vista (estado geral, hematológico, ausência de dor no hipocôndrio esquerdo, capacidade para o trabalho), muito melhorado. Não obstante ser ele portador de uma arterite pulmonar esquistosomótica em sua fase inicial, suportou ôtimamente a intervenção cirúrgica e 2 anos após esta as suas condições circulatórias não tinham se agravado, muito embora clínica e radiologicamente não se verificasse qualquer modificação no quadro da arterite pulmonar.

Este fato é referido com a intenção de assinalar que, mesmo nos casos de arterite pulmonar esquistosomótica em sua fase inicial, podem ser os pacientes beneficiados pela esplenectomia. Este caso demonstra, com efeito, que a esplenectomia, sem influir, como era de se prever, sobre a arterite pulmonar esquistosomótica, pode ser indicada como tratamento da cirrose hepática esplenomegálica esquistosomótica em casos devidamente selecionados, podendo trazer, como resultado, o alívio de alguns sintomas de tão grave moléstia.

Não desejamos terminar esta parte do nosso trabalho sem referir a nossa opinião sobre a questão terapêutica da esquistosomose. Todos os recursos de que lançamos mão na atualidade para o tratamento da esquistosomíase mansoni de forma hepato-esplênica, de que a arterite pulmonar não é senão uma complicação, sejam eles médicos ou cirúrgicos, não passam de medidas paliativas. As lesões dos vários órgãos (do fígado em particular), na esquistosomíase mansoni chegada a uma fase avançada de cirrose hepática, são irredutíveis, e mesmo no caso em que se obtenha, pela medicação específica (antimonial), a cura parasitológica, as sequelas do parasitismo permanecem irremovíveis e o curso da moléstia, se não estacionado, prossegue a sua evolução, em prazo variável ou de duração problemática, para uma terminação irremediável.

E' por isso que pensamos que o problema da esquistosomose deve ser encarado com a maior seriedade do ponto de vista profilático. Só uma campanha de profilaxia poderá impedir que se torne cada vez maior o número de doentes de tão terrível parasitose. Mas, enquanto as medidas profiláticas não forem postas em prática pelos responsáveis pela saúde pública, e enquanto os nossos governantes não se convencem da gravidade do problema da esquistosomose no Brasil, o que temos de fazer, como médicos, é estimular o reconhecimento das formas iniciais da esquistosomose mansoni, única fase em que o tratamento médico é sempre bem sucedido.

Só o diagnóstico feito precocemente, em fase clínica ainda passível de cura, e a instituição de rigoroso tratamento médico, poderá impedir, com efeito, que a esquistosomíase chegue aos seus estádios avançados e irremediáveis, como a cirrose hepática esplenomegálica e a arterite pulmonar obliterante.

2.ª PARTE — OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÃO 1 — M. G. A. — Sexo feminino, branca, 33 anos, casada, brasileira, natural de Sergipe. Domicílio e procedência: Rancharia.

Admissão — 13-8-1944 (2.ª M. M. — Santa Casa de Misericórdia de São Paulo — Cadeira de Terapêutica Clínica — Serviço do Prof. Cantídio de Moura Campos).

Óbito — 6-10-1944.

Anamnese — Queixa: Inchaço do corpo e falta de ar há 7 semanas. H. M. A.: A paciente relaciona o início da sua moléstia atual a um parto ocorrido há 7 semanas. Informa que este parto foi muito laborioso mas espontâneo, e foi seguido de febre que durou 4 dias. Quando a febre desapareceu notou que seu corpo estava inchando, principalmente na face e no ventre. Esse edema foi aumentando progressivamente, a ponto de ser tão acentuado nas pálpebras que não conseguia abrir os olhos. A princípio não sentia dispnéia e antes dos olhos incharem pensava que estava apenas engordando, como supunham também seus parentes. Assim é que a paciente podia fazer alguns trabalhos caseiros, sem ser obrigada a repousar. Nas três semanas que se seguiram a paciente notou acentuada redução do volume urinário, sendo a sua diurese, em certos dias, muito escassa e por vezes quase nula. A urina era turva, com depósito e de cor de café com leite (sic). Só depois de três semanas após o início destes sintomas é que ela procurou um médico. Este receitou-lhe umas injeções, cuja composição ela ignora, e recomendou-lhe uma dieta acloretada, consistindo apenas de doces, frutas e suco de frutas. Aconselhou-a ainda a abster-se de líquidos. A paciente observou este tratamento durante 10 dias, mas não fez repouso nesse período. De algum tempo para cá, sem poder precisar, a paciente informa que começou a sentir dificuldade respiratória, como fôlego curto, principalmente após as refeições, as quais eram seguidas de sensação de estufamento do abdome. Refere que essa dificuldade respiratória foi paulatinamente se intensificando e

aparecendo sobretudo aos pequenos esforços. Há quatro dias a dispnéia também ocorre em repouso, e para conseguir dormir precisa deitar-se sobre dois travesseiros, porque de outra forma sobrevém falta de ar que impede o sono.

No *interrogatório sobre os diferentes aparelhos*, registram-se, digno de nota, os seguintes dados: anteriormente à doença atual a paciente nunca tivera dispnéia, palpitações e dores torácicas. Também não refere tosse nem expectoração. Quanto ao aparelho digestivo informa que há 3 meses teve, durante todo um mês, evacuações líquidas, repetidas, às vezes constituídas só de sangue, e com tenesmo. Há 9 anos que sofre de prisão de ventre rebelde, passando 3-4 dias sem evacuar, informando ainda que em certa ocasião chegou a passar 3 semanas sem evacuar. Menarca aos 12 anos; menstruações regulares, durando 3 dias, e ciclos de 30 dias. Não tem cólicas. Apresenta corrimento vaginal amarelo, sem mau cheiro e de pequena quantidade. Desde o último parto apresenta amenorréia. Nega hematúria. Boa compreensão, respondendo com precisão às perguntas.

Antecedentes pessoais — Sarampo e varicela sem complicações. Nega outros antecedentes mórbidos inclusive: febre tifóide, difteria, anginas repetidas, reumatismo e malária, sobre o que foi insistentemente interrogada. Nega igualmente comemorativos de infecção esquistossomótica, sobre o que também foi particularmente interrogada. Não informa a existência de edemas ou outras complicações nas gravidezes anteriores. Teve um aborto espontâneo de 6 meses.

Antecedentes familiares — Sem interêsse. Pais vivos e saudáveis. O marido goza saúde. Teve 4 filhos, sendo que dois destes são falecidos, um de tétano e outro de disenteria (sic). Dos vivos nada informa de particular.

Alimentação e hábitos de vida — A paciente é nascida no Estado de Sergipe e residiu muito tempo no interior da Bahia. Últimamente morava em Rancharia, onde adoeceu. Sempre se alimentou bem e com bom apetite, ingerindo diariamente carne, ovos e verduras. Desde que começou a fazer dieta acloretada seu apetite diminuiu e por isso vem se alimentando mal.

Exame físico — *Exame físico geral*: Indivíduo do sexo feminino, de cor branca, brevilínea. Paciente em ortopnéia. Estado geral mau. Pele quente e úmida; elasticidade e turgor conservado; não apresenta cicatrizes nem outras particularidades. Mucosa dos lábios cianosada. Mucosas oculares descoradas. Pêlos com distribuição e desenvolvimento próprios do sexo. Extremidades quentes. Unhas normais. Edema dos membros inferiores, da região sacro-lombar, parede abdominal e rosto. Musculatura regularmente desenvolvida. Panículo adiposo escasso. Esqueleto sem deformidades. Esternalgia e tibialgia: ausentes. Sistema ganglionar: palpa-se um gânglio submaxilar, à direita, do tamanho de um grão de arroz; gânglios cervicais e supraclaviculares não palpáveis. Gânglios axilares: palpa-se um pequeno gânglio na axila esquerda, não doloroso, e na axila direita palpam-se dois gânglios com os mesmos caracteres. Gânglios inguinais não palpáveis. Pulso: 110. Pressão arterial: 115-80. Temperatura: 36,4. Peso: 58 k.

Exame físico especial — Cabeça: crânio simétrico, sem pontos dolorosos nem exostoses. Seios da face e mastóides indolores. Olhos: reflexos à luz, acomodação e consensual presentes e normais. Musculatura extrínseca normal. Conjuntivas descoradas. Nariz e ouvidos: nada digno de nota. Bóca: língua com tremor, sem desvio. Papilas conservadas. Não há impressões dentárias. Arcadas dentárias apresentando falhas, raízes infectadas, alguns dentes cariados. Mucosa faríngea anemiada. Amígdalas pequenas.

Pescoço — Curto e cilíndrico. Estase jugular, à direita, na posição sentada. Não são visíveis batimentos arteriais. Aorta não palpável na fúrcula. Tiróide palpável, não aumentada de volume. Palpa-se um pequeno nódulo no lobo esquerdo da tiróide, o qual é doloroso à pressão. Oliver-Cardarelli: não pesquisados porque a manobra provoca dor.

Tórax — Aparelho respiratório: Inspeção estática: nada digno de nota. Inspeção dinâmica: expansibilidade maior de ambos os ápices pulmonares em relação às bases, sendo que a base direita expande-se menos que a esquerda. Sinal de Lemos Torres presente à direita e esboçado à esquerda. Palpação: diminuição do frêmito tóraco vocal em

ambas as bases pulmonares, sendo quase abolido na direita. Percussão: som claro pulmonar em ambos os ápices. Submacicez na base pulmonar esquerda. Submacicez a partir do ângulo inferior do omoplate na base direita. Ausculta: estertores subcrepitantes em toda a base esquerda e acima da zona de macicez, numa faixa de 3 dedos transversos à direita.

Aparelho circulatório — Inspeção e palpação: ictus não visível; palpável no 5.º intercosto na linha hemiclavicular E., pouco impulsivo, rítmico, acompanhado de frêmito sistólico. Ausculta: bulhas abafadas nos focos da ponta. Sopro sistólico rude no foco mitral, com irradiação para a axila. Hiperfonese da 2.ª bulha pulmonar em relação à 2.ª aórtica. Galope protodiastólico à direita.

Abdome — Abdome muito abaulado, em forma de abdome de batráquio, simétrico; cicatriz umbilical plana; não há circulação colateral visível nem cicatrizes cirúrgicas. Percussão: nota-se pequena zona junto à cicatriz umbilical, de som timpânico, obtendo-se na área restante som maciço. Macicez móvel, com diferentes decúbitos. Sinal do piparote positivo. Pela palpação superficial verifica-se que a parede abdominal, que está muito distendida e tensa, com edema, é indolor e não apresenta resistência muscular. Pela palpação profunda (após esvaziamento da ascite, vide evolução) palpa-se o fígado, cujo bordo à esquerda chega até abaixo da cicatriz umbilical e à direita a 9 dedos do rebordo costal. O órgão é muito doloroso à palpação, sendo o seu bordo duro e cortante. Baço: palpável a um dedo abaixo do rebordo costal; bordo rombo, duro, não doloroso.

Segmentos intestinais — Não palpáveis.

Órgãos genitais — Exame ginecológico: nada digno de nota.

Membros — Superiores: nada digno de nota. Inferiores: edema dos pés, perna e coxas.

Sistema nervoso — Normal.

EXAMES DE LABORATÓRIO E SUBSIDIÁRIOS

Radiografia do coração e vasos — Aumento da área cardíaca envolvendo os ventrículos direito e esquerdo. Aumento do cone da pulmonar (fig. 1) — 28-8-44 — Dr. Olavo Pazzanese.

Eletrocardiograma — 17-8-1944 (fig. 2).

Derivações clássicas — P1 e P2 positivas e de voltagem normal; P3 deprimida. QRS de baixa voltagem e espessado. RS-T sem desnivelamentos patológicos. T1 negativa; T2 e T3 positivas e de baixa voltagem.

Ritmo — Sinusal.

Eixo elétrico — Desvio para direita.

Frequência — 115 por minuto.

Duração — P = 0,06 seg. PR = 0,13 seg. QRS = 0,07 seg.

Derivação IVF — Onda de despolarização ventricular do tipo Rs. Não há atraso da deflexão intrínseca. Onda T negativa.

Conclusão — Ritmo sinusal normal. QRS de baixa voltagem nas derivações clássicas. T negativa em D1 e IVF. T de baixa voltagem em D2. Estas alterações de QRS e de T constituem sinais de comprometimento do miocárdio ventricular.

ECG — 20-8-1944 — Em relação ao ecg. anterior se observam as seguintes alterações: 1.º) Em D1 a onda T tornou-se positiva e de baixa voltagem. 2.º) Em IVF a onda T tornou-se positiva e de baixa voltagem.

Conclusão — Ritmo sinusal normal. T de baixa voltagem em D1, D2 e IVF. QRS de baixa voltagem nas clássicas. Estas alterações de T e de QRS constituem sinais de comprometimento do miocárdio ventricular.

20-9-44:

Velocidade circulatória — 14-8-44 — Dalicol: 25 segundos. Éter: 10 segundos.

Reação de Wassermann — 12-8-44 — Levemente positiva (+).

Dosagem de uréia no sôro sanguíneo — 17-8-44 — 0,22 g%.

Dosagem das proteínas no sôro — 17-8-44 — Proteínas totais: 5,4 g%; albuminas: 2,7 g%; globulinas: 2,7 g%.

Exames de urina:

	14-8-44	19-8-44	30-9-44
Densidade:	1011	1013	1013
Albumina:	0,5 o/oo	—	0,25 o/oo
Açúcar:	—	—	—
Sedimento:	Leuc. íntegros. Ausência de hemácias e cilindros. Tricomonas.	Leuc. íntegros isolados e degenerados agrupados. Ausência de hemácias e cilindros. Tricomonas.	Hemácias: raras. Leucócitos. Cilindros hialinos: raros.

17-8-44 — Cultura de urina: estéril

18-9-44 — Hemossedimentação: 12 mm 1.^a hora (Westergreen).

EXAMES HEMATOLÓGICOS

	18-8-44	18-9-44	20-9-44
Eritrócitos	4.600.000	4.700.000	3.260.000
Leucócitos	6.400	7.900	7.200
Hemoglobina	102%	79%	
V.G.	1,1	0,8	
Neutrófilos	—	—	
Bastonetes	8	7	
Segmentados	45	59	
Eosinófilos	2	4	
Basófilos	0	0	
Linfócitos típicos	40	25	
Linfócitos leucocitóides	2	—	
Monócitos	3	5	

Observações: Diâmetro médio = 7,4 μ . Anisocitose discreta. Alguns micrócitos hipercrômicos e hemácias com policromatofilia. Raros neutrófilos com granulações tóxicas.

EVOLUÇÃO E TERAPEUTICA

A paciente permaneceu internada de 13 de agosto a 6 de outubro de 1944, quando ocorreu o seu óbito. O curso da moléstia foi inteiramente afebril durante todo esse período de observação, e teve uma evolução progressivamente desfavorável, observando-se, apenas, durante o primeiro mês, uma redução do volume dos edemas, que, contudo, nunca desapareceram, e melhora efêmera da dispnéia. A diurese foi em média de 700 cm³, variando de 160 a 2.600 cm³, cifra que atingiu numa única ocasião em seguida à administração de um diurético mercurial (Ascitan). O peso da paciente, que era de 58 k por ocasião de sua admissão, baixou progressiva e paralelamente à redução dos edemas até 49.600 g em 5-9-44, quando novamente começou a subir, com a piora de suas condições, até voltar à cifra anterior por ocasião de sua morte. Observou-se durante todo o período de internação a existência de taquicardia persistente, pois que o pulso esteve sempre acima de 100, atingindo por vezes a 120, e oscilando em geral em torno de 108 pulsações por minuto. A pressão arterial oscilou entre: Mx: 90 a 110; Mn: 65 a 90; em média os valores tensionais registrados conservaram-se entre: Mx 100 — Mn: 70; os outros dados do exame também não mostraram grande alteração em toda a evolução, notando-se sempre cianose dos lábios, certo grau de dispnéia e estase jugular. Os edemas, como já foi dito, que eram muito evidentes nas pernas, coxas, abdome, região sacrolombar e face, diminuíram, sem contudo desaparecerem completamente. A ascite foi punccionada em duas ocasiões: a primeira vez em 16-8-44, retirando-se pela paracentese 3.400 cm³ de líquido citrino, e a segunda vez, em 22-9-44, quando foram retirados mais 3.000 cm³. Em 14-8-44 foi feita uma punção pleural à direita, retirando-se 350 cm³ de líquido citrino que deu reação de Rivalta positiva e, em 17-9-44, outra punção pleural, retirando-se 150 cm³ de líquido com os mesmos caracteres. O fígado, que foi palpável após a primeira paracentese 9 dedos abaixo do rebordo costal, chegou a ser palpável a 5 e 7 dedos abaixo do rebordo costal, com os mesmos caracteres já descritos na observação.

O exame físico do coração não apresentou alteração durante toda a evolução, verificando-se, sempre, a existência de sopro sistólico no foco mitral com irradiação para todos os focos da ausculta cardíaca e para a axila. Hiperfonese acentuada constante da 2.^a bulha no foco pulmonar. Galope protodiastólico à direita audível em muitas ocasiões.

A partir de 20-8-44 a paciente apresentou um quadro intestinal caracterizado por evacuações frequentes, diurnas e noturnas, a princípio sendo as fezes líquidas e depois com presença de catarro e sangue, e acompanhadas de tenesmo. Até o dia 25-8-44 passou mal, com muitas vacuações disentericas (8 a 10 por noite). Entre esta data e 31-8-44 evacuou a paciente muitas vezes sangue vivo, com puxos intensos. Só em 3-9-44 cederam as evacuações disentericas, que entretanto reapareceram em 22-9-44, acompanhadas de eliminação de sangue em quantidade regular, e intensos tenesmos, com procedência anal. Os exames parasitológicos e bacteriológicos das fezes foram negativos. Apesar de especialmente pesquisados, os ovos de *S. mansoni* não foram encontrados. Desde então o estado da paciente se agravou, com intensificação da dispnéia e aumento dos edemas, vindo a paciente a falecer em anasarca.

O tratamento consistiu desde o início em dieta acloretada, digitalização, que foi mantida até o aparecimento de sintomas de intolerância (vômitos persistentes). Depois de suspensa a medicação digitalica (pó de folhas de digital), por 10 dias a medicação cardiotônica foi feita com 1/4 de mg de estrofantina endovenosa cada 24 horas, a que se seguiu nova digitalização. Ao lado disso a paciente foi medicada com diuréticos mercuriais (Ascitan e Esidron) e teofilina etilenodiamina. Como medicação complementar a paciente foi tratada com complexo vitamínico B e extrato hepático. A crise disenterica foi medicada sintomaticamente.

Nome: M. G. A.
Idade: 33 anos
Óbito: 6-10-44 (5 horas)
Necrópsia: 6-10-44 (14,30 horas)
Recebido as 10,45 hs. de 6-10-44
Necropt: Dr. G. Elejalde

N.º da necrópsia: SS-20.387/44
Sexo: feminino H.C. 746 (SRH)
Branca, casada, doméstica
Brasileira — Sergipe
Domc.: Rancharia
Procd.: Santa Casa (2.^a M. M.)

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Doença — Esquistosomose

Diagnósticos — Edema dos membros inferiores
Estruma nodoso parenquimatoso da tireóide
Trombose da jugular direita
Congestão e edema dos pulmões
Arteriosclerose da artéria pulmonar
Dilatação e hipertrofia do ventrículo e aurícula direitos
Ascite
Cirrose do fígado e congestão passiva
Infarto anêmico e congestão passiva do baço
Gastrite hipertrófica
Esquistosomas na veia esplênica
Edema da mucosa dos intestinos
Congestão passiva dos rins.

RELATÓRIO DA NECRÓPSIA

Generalidades — Cadáver de adulto, do sexo feminino, de cor branca, pesando 58 k e medindo 148 cm de comprimento. Cabeça regularmente conformada. Pálpebras cerradas, córneas transparentes e pupilas igualmente dilatadas. Bóca com dentes falhos e mal conservados. Pescoço cilíndrico. Tórax simétrico, com clavículas e espaços intercostais visíveis. Abdome plano. Genitais externos e ânus, nada digno de nota. Rigidez cadavérica ausente. Membros inferiores edemaciados.

Encéfalo e meninges — Pêso: 1.240 g. Ao exame externo e aos cortes nada de maior apresenta. Vasos da base de paredes finas.

Órgãos do pescoço — Amígdalas de pequeno tamanho, nada de maior apresentam aos cortes. A mucosa do esôfago se apresenta espessada. A laringe e traquéia se apresentam recobertas por catarro sanguinolento. Pela retirada do mesmo notam-se sufusões hemorrágicas no terço inferior da traquéia. A glândula tireóide é de pequeno tamanho, e apresenta no seu lobo esquerdo um pequeno nódulo, mais ou menos do tamanho de um caroço de azeitona e de cor branco-acinzentada. A jugular direita se apresenta grossa como um dedo mínimo e trombosada.

Diags. — Estruma parenquimatoso nodoso. Trombose da jugular direita.

Cavidade torácica — A pleura esquerda apresenta mais ou menos 100 cm³ de líquido amarelo citrino e aderências intensas ao nível da base. A pleura direita é livre de aderências e apresenta mais ou menos uns 700 cm³ de líquido amarelo turvo. Área cardíaca aumentada de tamanho. Quantidade de líquido do pericárdio aumentada, de cor amarelo-pálida.

Pulmões — Pêso: P.D. 420 g. P.E. 320 g. Apresentam, aos cortes, congestão e edema hipostáticos, notando-se nas ramificações maiores da artéria pulmonar placas de cor amarelada e ligeiramente elevadas.

Diags. — Congestão e edema discretos dos pulmões. Arteriosclerose das ramificações maiores da artéria pulmonar.

Coração — Apresenta dilatação discreta da aurícula direita e hipertrofia evidente da musculatura pectínea. A válvula tricúspide mede 11 cm. As suas lacínias são em geral finas, livres e lisas. O ventrículo direito se apresenta discretamente dilatado e com hipertrofia evidente dos músculos papilares, colunas carnosas e cone arterial que mede 7 mm. Aurícula esquerda de âmbito normal. Permeável o orifício aurículo-ventricular a dois dedos. As lacínias da mitral são finas, livres e lisas. A tesoura ao cortar o ventrículo esquerdo encontrou certa resistência. A parede do ventrículo esquerdo mede 1 cm. A cavidade é de âmbito normal. Os cortes tangenciais do miocárdio nada de maior revelaram. Coronárias sem maiores alterações. Pêso: 320 g.

Diags. — Dilatação e hipertrofia das cavidades direitas.

Aorta — Em toda a sua extensão apresenta aspecto praticamente normal.

Cavidade abdominal — Topograficamente encontra-se uma ascite de mais ou menos 3 litros de um líquido amarelo citrino.

Fígado — Pêso: 2.720 g. Bastante aumentado de tamanho. Superfície externa irregular, notando-se áreas irregulares de tamanhos vários. A cápsula em geral é discretamente espessada, notando-se através da mesma um pontilhado fino de cor amarelada. Aos cortes o aspecto é variável, encontrando-se, porém, áreas de cor vermelha escura, em meio às quais se vêem outras de uma tonalidade amarelo-pálida, com pontos em que a tonalidade amarelada é mais carregada. O desenho lobular se apresenta bem evidente. Em uma das ramificações da veia porta encontramos um trombo.

Diags. — Cirrose do fígado. Congestão passiva.

Baço — Pêso: 250 g. De consistência aumentada, apresenta ao nível de um dos polos uma extensa área de infarto anêmico. O restante do órgão é de consistência firme, dando apenas sangue à raspagem.

Diags. — Infarto anêmico. Congestão passiva.

Estômago, duodeno e pâncreas — Nota-se ao nível do estômago, que se apresenta cheio por alimentos, as pregas espessadas, em meio às quais se nota regular quantidade de catarro.

Diags. — Gastrite hipertrófica.

Os cortes do pâncreas nada de maior revelaram e ao ser cortada a veia esplênica encontramos, em determinado ponto, um acúmulo de esquistossomas.

Intestinos — Nota-se, ao nível do duodeno e jejuno, edema da mucosa, que se apresenta de cor pálida. Ao nível de uma alça do íleo encontramos uma pequena área de cor azulada, elevada e de consistência firme. O grosso intestino, em toda a sua extensão, apresenta pronunciado grau de edema da mucosa, notando-se, em certos pontos, um pontilhado de cor róseo-avermelhada, superficial.

Diags. — Edema da mucosa dos intestinos.

Rins — Pêso: 120 g. Forma e tamanho normais. Aos cortes distinguem-se bem ambas as camadas, os pequenos vasos não se apresentam espessados, havendo um discreto grau de congestão glomerular.

Genitais internos — Nota-se apenas a mucosa uterina de cor avermelhada.

Beza — Nada de importante apresenta.

LAUDO HISTOLÓGICO DA NECRÓPSIA

Pulmão — Nos cortes examinados observamos um processo de congestão passiva bastante pronunciado, notando-se na luz alveolar grande número de células descamadas com pigmento escuro no citoplasma. Vêem-se esparsos pelo parênquima e em número apreciável, ovos e cascas de ovos de esquistosoma, em geral calcificados e sem reação granulomatosa. As lesões mais importantes são para o lado da árvore arterial dos pulmões, na qual se observa toda uma gama de processos que, em linhas gerais, correspondem aos descritos por Shaw e Ghareeb em seu trabalho. Em algumas arteríolas observa-se um processo de endarterite obliterante, tornando a luz diminuta e em geral excêntrica (fig. 7).

Outras arteríolas mostram uma recanalização do tecido fibroso celular proliferado da íntima (fig. 8), sendo a túnica muscular em geral bem conservada.

Em uma arteríola da fig. 9 observa-se o processo de endarterite com recanalização, e em virtude da falha na túnica muscular no polo inferior, vêem-se lacunas sanguíneas de regular tamanho, e que constituem os chamados angiomatóides de Shaw e Ghareeb.

Outros aspectos de angiomatóides do tipo capilar são observados na fig. 10, na qual o processo de endarterite não é muito pronunciado, notando-se uma mio-hipertrofia da parede, exceto no polo inferior, onde se vêem angiomatóides do tipo capilar.

No corte seguinte (fig. 11) nota-se, na porção inferior da ramificação transversal, um angiomatóide do tipo capilar, não se percebendo a este nível a luz do vaso em virtude da incidência do corte.

Neste corte observa-se uma formação angiomatóide de tamanho apreciável, sendo que na porção mais central é do tipo capilar enquanto na periferia assume aspecto cavernoso. A estrutura da parede vascular é relativamente conservada na porção superior direita, percebendo-se a este nível nítido processo de endarterite; na extremidade oposta não se observa mais a túnica média, originando-se a formação de lacunas capilares e cavernosas intercomunicantes (angiomatóides de Shaw e Ghareeb). Observa-se à esquerda um bronquíolo cujo epitélio apresenta-se descamado na luz.

Tireóide — Área de estruma parenquimatoso.

Miocárdio — Sem maiores alterações.

Artéria pulmonar — Placa de arteriosclerose.

Fígado — Congestão passiva de grau pronunciado. Fibrose extensa dos espaços porta. Granulomas esquistosomóticos. Trombose recente de ramos da veia porta.

Baço — Área de infarto anêmico recente. Congestão passiva.

Pâncreas — Sem maiores alterações.

Rim — Congestão discreta.

Supra-renal — Sem maiores alterações.

Intestino delgado — Pequeno abscesso na túnica submucosa.

Intestino grosso — Inúmeros ovos e cascas de ovos de *S. mansoni* ao nível da mucosa, com discreta reação inflamatória.

COMENTÁRIOS

Refere-se este caso a uma paciente de 33 anos de idade, do sexo feminino e que, sem antecedentes cardíacos, renais ou broncopulmonares anteriores à sua moléstia atual, começou, após um parto laborioso e febril, a apresentar edema, oligúria e dispnéia discreta, que não impediram, durante algum tempo, os seus afazeres domésticos. Os sintomas iniciais, entretanto, logo se intensificaram, de forma que com a piora gradual da dispnéia (ortopnéia) e aumento dos edemas, a paciente procurou o hospital, onde entrou em franca anasarca (edemas periféricos, hidrotórax, ascite) e grave insuficiência cardíaca (oligúria, estase jugular, estase pulmonar bilateral). Ao exame ela se mostrava ortopnéica, com ligeira cianose dos lábios, anemia das mucosas visíveis, hipotensão arterial. O exame do aparelho circulatório verificou taquicardia, sopro sistólico no foco mitral; hiperfonese da 2.^a bulha e galope protodiastólico. O fígado era enorme, alcançando 9 dedos abaixo do rebordo costal, e o baço era palpável a 1 dedo.

O exame radiológico do coração mostrou aumento deste órgão e dilatação do cone da artéria pulmonar. Eletrocardiograficamente registrou-se desvio do eixo elétrico para a direita, com alterações do QRS e da onda T, que foram consideradas sugestivas de comprometimento miocárdico.

Dos exames de laboratório constaram hipoproteinemia com baixa sobretudo da fração das albuminas. Exame de urina com albuminúria discreta, cilindrúria em consequência a congestão renal passiva. A taxa de uréia do soro estava normal.

Apesar de tratada adequadamente da insuficiência cardíaca, a paciente veio a falecer — precedendo a sua morte um episódio disentérico intenso.

No passado mórbido da paciente não havia infecção reumática anterior nem outros antecedentes importantes, salvo disenteria muco-sanguinolenta com tenesmo.

A paciente era natural de Sergipe e viveu muitos anos na Bahia, e em vista deste comemorativo e do passado disentérico, foram feitos exames de fezes (naquele tempo pelo método direto apenas) na expectativa de se encontrarem os ovos de *S. mansoni*, mas estes exames resultaram negativos.

Em resumo: Estávamos em face de um caso de paciente jovem, procedente de área endêmica de esquistosomíase, com passado disentérico nítido e carregado, e que após um parto laborioso, entrou em insuficiência cardíaca congestiva de evolução progressivamente desfavorável, apesar das medidas terapêuticas aplicadas. Do ponto de vista clínico apresentava um síndrome de hipertensão pulmonar (bem caracterizado, mas de etiologia indeterminada, desde que a esquistosomose suspeitada não pôde ser comprovada laboratorialmente).

Vindo a falecer, a autópsia revelou, como consta do laudo necroscópico, além das alterações próprias da insuficiência cardíaca (congestão visceral generalizada), a existência de esquistosomíase mansoni do fígado (fibrose extensa portal e granulomas) e do intestino grosso, além da presença dos vermes adultos (*S. mansoni*) no sangue da veia esplênica. As mais importantes alterações, entretanto, foram encontradas para o lado do coração, parênquima e vasos pulmonares.

O miocárdio microscópicamente nada apresentava digno de nota, mas ao exame macroscópico verificou-se a existência de dilatação e hipertrofia das cavidades direitas, máxime do ventrículo. As válvulas cardíacas eram normais e a aorta nada de anormal apresentava. Arteriosclerose da artéria pulmonar. Nos pulmões os ovos de *S. mansoni* foram encontrados em grande número, esparsos por todo o parênquima, sem entretanto determinar reações em seu derredor. As alterações mais importantes, como foi descrito minuciosamente em outra parte, interessaram a árvore arterial pulmonar, e se enquadraram perfeitamente na descrição de Shaw e Ghareeb (endarterite obliterante e formação de angiomatóides).

Portanto, este caso exemplifica perfeitamente a arterite pulmonar esquistosomótica, trazendo, em consequência, a dilatação e hipertrofia do coração direito e revelando-se clinicamente por um quadro de gravíssima insuficiência cardíaca congestiva.

As extensas lesões arteriolares obliterantes esquistosomóticas foram, sem dúvida, as responsáveis pelo quadro exibido em vida pela paciente, e explicam suficientemente bem o síndrome de hipertensão pulmonar, que a levou à insuficiência ventricular direita irredutível na fase final de sua existência.

Como várias vezes acentuado no texto deste trabalho, este caso não fugiu à regra, verificando-se em uma jovem mulher de 33 anos, já portadora de uma esquistosomose avançada do fígado e intestino.

* * * *

OBSERVAÇÃO 2 — M. A. P. — 19 anos, masculino, solteiro, pardo, brasileiro, lavrador, Alagoas.

Admissão — 29 de maio de 1947. (Em 13 de outubro de 1947 foi transferido para a 1.^a C. C. Alta na 1.^a C. C. em 8-11-47).

H.P.M.A. — Até 3 anos passados o paciente gozava de relativa saúde, mas a partir desta época, começou a sentir grande fraqueza, palpitações aos esforços bem como dor no precórdio. Essa dor é comparada pelo paciente a uma sensação esquisita e que melhorava com o repouso. Juntamente com estes sintomas começou a notar que estava ficando pálido e a sentir uma "inflamação" localizada no hipocôndrio esquerdo. Consultou um médico, que diagnosticou o seu caso como sendo de verminose, e indicou-lhe um vermífugo. Após a ingestão desse remédio, eliminou cerca de 40 vermes (*Ascaris lumbricoides*). Durante os 6 meses seguintes, passou relativamente bem, mas, logo após, voltou a se tornar pálido e a ter novamente palpitações aos esforços, acompanhadas de sensações de opressão precordial.

Quando queria acompanhar os seus companheiros de escola, ao sair das aulas, sentia tonturas, palpitações, dor no precórdio, sem irradiação, e era obrigado a descansar durante meia hora para prosseguir o seu caminho.

Nessa mesma ocasião, começou a ter diarreia, com fezes moles, amareladas, com sangue e catarro e puxos ao evacuar. Nega náuseas e vômitos. Eructações frequentes. Passava períodos de 30 a 45 dias com os intestinos funcionando regularmente, quando então sobrevinham novas crises diarreicas. De vez em quando tinha arrepios-de frio, seguidos de sensação de calor no corpo, melhorando sempre depois de tomar um chá com um antitérmico (Melhoral). Assim esteve durante 2 anos e meio, até que resolveu mudar-se para São Paulo, onde está residindo há 2 meses e meio. Desde que está aqui, sente que a sua fraqueza vem se acentuando e a conselho de um farmacêutico, tomou novamente um vermífugo, eliminando outros vermes com os mesmos caracteres dos eliminados anteriormente. Procurou então um Centro de Saúde, de onde foi encaminhado para este hospital, onde foi internado em 29 de maio de 1947.

Interrogatório sobre os diversos aparelhos — Negativo, sendo digno de nota a ausência, em todo o decurso de sua moléstia, dos seguintes sintomas: tosse, expectoração, escarros sanguíneos e edema.

Antecedentes pessoais — Ignora as condições de nascimento. Teve sarampo. Nega reumatismo e passado venéreo-sifilítico. Alimentação regular. Banhava-se em rios e tanques em Matinhas de Águas Brancas (Estado de Alagoas), de onde é natural, lembrando-se que há 3 anos, após um desses banhos, sentiu prurido em todo o corpo, notando a presença de manchas róseas nas partes pruriginosas. Informa que nas águas onde se banhava via com frequência muitos caramujos.

Antecedentes familiares — Pais vivos. A mãe sofre de moléstia cardíaca. O pai é forte. Tem 5 irmãos sobre cujo estado de saúde não sabe informar.

Exame físico geral — Indivíduo de tipo brevilineo e com bom estado geral. Face pálida. Decúbito indiferente. Boa constituição do aparelho ósteo-muscular e estado nutricional satisfatório. Pêlos com distribuição própria do sexo. Unhas normais. Mucosas descoradas.

Micropoliadenopatia generalizada, palpando-se os gânglios submaxilares, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinais, de ambos os lados. Todos os gânglios são pequenos, os maiores do tamanho de um grão de ervilha, de consistência firme, não coalescentes, indolores e móveis. Esternalgia e tibialgia ausentes. Psiquismo íntegro. Marcha normal. Pêso, 49.500 g. Altura, 1,50 cm. Temperatura, 36. Pulso, 80. F.R., 28.P.A., 120x70. C.V., 1.800.

Exame físico especial — Crânio e face: nada digno de nota. Olhos: pupilas isocóricas, pupila D. fusiforme, repuxada para o polo inferior devido à retração cicatricial. Reflexos à luz e acomodação presentes e normais. Ouvidos e nariz negativos. Bôca: mucosas pouco coradas. Dentes em bom estado de conservação. Gengivas inflamadas. Língua sem tremor e sem desvios. Papilas ligeiramente atrofiadas nos bordos e ponta. Faringe normal. Amígdalas pequenas, hiperemiadas. Pescoço: cilíndrico, simétrico. Não há desvio da traquéia. Pulsação arterial na base do pescoço, à D., junto ao terço interno da clavícula. Tireóide não aumentada de volume. Aorta palpável na fúrcula. Oliver-Cardarelli ausente.

Tórax — Aparelho respiratório: insp. estática. Não se enquadra em nenhum tipo patológico. F.A.: ombros ao mesmo nível, clavícula D. ligeiramente mais saliente à E. Fossa supraclavicular D: ligeiramente mais escavada que à E. Mamilos ao mesmo nível. Ângulo de Louis pouco nítido. Ângulo de Charpy maior do que 90°. Maior desenvolvimento do grande peitoral E. F.P.: fossas escapulares igualmente cheias. Não há desvios da coluna.

Inspeção dinâmica — Respiração costal superior. Ápices e bases pulmonares expandem-se igualmente de ambos os lados. F.R.: 26. Lemos Torres: ausente. Fenômeno de Litten presente em ambos os lados. Palpação: coluna cervical ligeiramente dolorosa. Frêmito tóraco-vocal: normal.

Percussão — Face posterior: som claro pulmonar até 3 dedos abaixo do ângulo inferior do omoplate. Boa mobilidade das bases. Face anterior: som claro pulmonar.

Ausculta — Murmúrio vesicular normal em toda a área pulmonar.

Aparelho circulatório — Choque da ponta visível no 4.º espaço sobre a linha hemiclavicular E., pouco intenso, rítmico e localizado. Sobre o 2.º e 3.º intercostos E., junto ao esterno, mais nitidamente sobre o 2.º intercosto, nota-se uma pulsação rítmica e isócrona com a pulsação do choque da ponta e que se irradia sob a forma de uma ondulação para a área precordial. Há ligeiro abaulamento do precórdio na sua porção superior.

Palpação — Palpa-se o choque da ponta sobre a localização acima referida; choque de intensidade média, mobilidade de 2 cm com o decúbito lateral E. Não se palpam frêmitos. Em relação com a pulsação acima referida, palpa-se um choque e sensação tátil do desdobramento da 2.ª bulha no F.P., sem caracteres de frêmito e que é perceptível até o 3.º intercosto.

Percussão — Aumento do pedículo no seu limite E. A área cardíaca parece não aumentada à percussão.

Ausculta — F.M.: sopro sistólico suave, holossistólico; hiperfonese da 2.ª bulha, que se apresenta arrastada, às vezes dando a sensação de desdobramento. F.P.: desdobra-

mento e hiperfonese da 2.^a bulha, que se ouve nitidamente em toda área precordial (bem como no foco aórtico). F.T.: bulhas normais.

Artérias — Elásticas. Pulso 80, rítmico e de média intensidade.

Abdome — Inspeção: não se enquadra em nenhum tipo patológico.

Não há edema da parede. Musculatura e panículo adiposo bem desenvolvidos. Cicatriz umbilical normal. Não há circulação colateral. Abaulamento do hipocôndrio E. Sinais de ascite negativos. Palpação superficial: nada digno de nota. Profunda: fígado palpável a um dedo abaixo do rebordo costal; na linha hemiclavicular, apresenta-se com a borda fina, consistência média e indolor. Acompanha-se sua borda inferior até a linha mediana, desaparecendo a 5 dedos acima da cicatriz umbilical. Limite superior perceptível no 5.^o intercosto na linha hemiclavicular D.

Baço — Palpável, na linha axilar média, a 2 dedos abaixo do rebordo costal E. Na linha axilar anterior é palpável a 4 dedos abaixo do rebordo, aproximando-se depois do rebordo costal; ao nível do epigástrio é palpável a um dedo para dentro do rebordo. Apresenta-se com a borda fina; consistência média e indolor. Ceco palpável, da grossura de um charuto, não gargarejante e indolor. Cólon ascendente não palpável. Cólon descendente doloroso à palpação. A 2 dedos acima da cicatriz umbilical palpa-se um degrau, não gargarejante e indolor. Massa intestinal gargarejante à palpação. Cólon sigmóide palpável, duro, doloroso.

Aparelho genital — Normal.

Sistema nervoso — Reflexos patelares, aquilianos, olecranianos presentes. Cutâneo-abdominais presentes. Cremasterinos: superficial e profundo presentes.

Exames subsidiários e de laboratório — Eletrocardiogramas: ECG em 2-6-47 (fig. 19).

Complexo auricular — P. positiva e de voltagem normal nas 3D. PR regular.

Complexo ventricular — Deflexão principal negativa em D1 e positiva em D2 e D3. QRS de alta voltagem e sem espessamento. RS-T com desnivelamento plus em D1 e minus em D3. T positiva e com tendência a difasismo (+—) em D1, negativa e com tendência a difasismo (—+) em D3. Q3 presente.

Ritmo — Sinusal.

Eixo elétrico — Desviado para a direita.

Frequência — 69 por minuto.

Duração — P = 0,08 PR = 0,18 QRS = 0,07.

Precordiais — Onda de despolarização ventricular do tipo qRs em V1: rS em V3. T negativa em V1; negativa e de alta voltagem em V3.

Unipolares dos membros — Coração em posição elétrica semivertical.

ECG — Hipertrofia ventricular direita.

Em 10-6-47 o ECG (fig. 20) revelou:

Em relação ao ECG anterior, tirado em 2-6-47, não se observam alterações dignas de nota. Em V4, V5 e V6 a onda de despolarização ventricular é do tipo Rs e a onda T é negativa e ponteguda.

Conclusão — Hipertrofia ventricular direita. ECG 18-6-47.

Derivações clássicas — P positiva, de contornos regulares e de voltagem normal nas 3D. PR regular. Deflexão principal negativa em D1 e positiva em D2. QRS de voltagem normal e com R2 entalhada. RS-T com discreto desnivelamento plus em D1 e minus em D3. T positiva em D1 e negativa e com tendência a difasismo (—+) em D2 e D3. Q3 com mais de 25% da onda R máxima.

Ritmo sinusal — Eixo elétrico: desviado para a direita.

Frequência 62 por minuto. Duração: P = 0",07 PR 0"; 18 QRS = 0",08.

Conclusão — Sinais sugestivos de sobrecarga ventricular direita. Q3 profunda.

Fonocardiograma — No foco mitral e na região mesocárdica nota-se uma separação nítida entre as oscilações correspondentes ao componente auricular e aquelas do componente ventricular e miocárdico da 1.^a bulha. a) Romeiro Netto.

Eletrocardiograma — 2-8-47.

Derivações clássicas — P positiva e de voltagem normal em D1 e D2; difásica em D3. PR regular. Deflexão principal negativa em D1; positiva em D2 e D3. QRS de

voltagem normal e sem espessamento patológico. Q3 presente. RST sem desnivelamentos anormais. T negativa nos 3D.

Ritmo sinusal — Eixo elétrico: desviado para a direita ($= +105^\circ$).

Frequência 85 minutos. Duração: P = 0",08; PR = 0",20; QRS = 0",08.

Precordiais — Onda de despolarização ventricular do tipo qRs em V1. RS em V3, RS em V5. RS-T com desnivelamento minus em V3. T negativa em V1, V3 e V5. Unipolares dos membros: coração em posição elétrica vertical.

Conclusão — Hipertrofia ventricular direita. ECG 2-9-47.

Em relação ao ECG tirado em 2-8-47, não se notam alterações dignas de nota.

Em 10-5-49, o ECG (fig. 21) mostrou:

Derivações clássicas — P positiva e de voltagem normal em D1 e D3; positiva, de alta voltagem e entalhada em D2. PR regular. QRS de voltagem normal, sendo entalhada em D2. Q profunda em D3. RS-T sem desnivelamento patológico. T positiva e de voltagem normal em D1 e D2 e difásica em D3. Ritmo sinusal. Eixo elétrico: desviado para a direita.

Frequência: 63 por minuto. Duração: P = 0",08. PR = 0",16. QRS = 0",08. Unipolares dos membros: coração em posição elétrica vertical. Precordiais: onda de despolarização ventricular do tipo qRs em V1; RS em V3 e V5. Não há atraso de deflexão intrínseca. RS-T com desnivelamento minus em V1 e plus em V5. T difásica em V1 e V3, negativa em V5. ECG: P de alta voltagem em D2. QRS entalhada em D2. Q profunda em D3. Coração em posição elétrica vertical. Hipertrofia ventricular direita. RS-T desnivelamento minus em V1. RS-T desnivelamento plus em V5. T difásica em V3. T negativa em V5.

Conclusão — Ritmo sinusal. Hipertrofia ventricular direita. Sinais de sobrecarga auricular.

Radiografia do coração — 9-6-47.

Aumento do volume cardíaco com dilatação do ventrículo esquerdo e cone da artéria pulmonar. Aorta de calibre normal. Discreta, acentuação dos hilos (estase da pequena circulação?). a) Peres Secaf.

Radiografia do intestino: trânsito e relevografia.

Conclusão — Presença de áscaris; trânsito no delgado normal, trânsito cólico fortemente acelerado, sinais morfológicos de enteropatia.

Prova funcional do aparelho digestivo — 6-6-47.

Conclusões:

- 1.ª — Sinais de irritação da parede intestinal.
- 2.ª — Aumento muito ligeiro da atividade fermentativa da flora intestinal.
- 3.ª — Ancilostomose.
- 4.ª — Ascaridiose.
- 5.ª — Esquistosomose.
- 6.ª — Estrongiloidose.
- 7.ª — Giardiose.

1.ª) Retossigmoidoscopia: 3-6-47.

Inspeção: nada digno de nota.

Toque: Toncidade normal do esfíncter. Próstata normal. Anuscopia: nada digno de nota. Retoscopia: Em todo o trajeto alcançado pelo aparelho notamos hiperemia bastante acentuada; edema da mucosa, percebida através do espessamento das válvulas e desaparecimento da trama vascular; muco branco-acinzentado em grande quantidade; lesões puntiformes dando o aspecto característico de "picadas de pulgas", agrupadas em extensão variável nas porções inferiores, média e superiores; não foram vistas ulcerações ou tumorações; mucosa sangrando com facilidade.

Foi retirado pela raspagem de uma das lesões em "picada de pulga" e colhido muco. Ao exame parasitológico foi encontrado um ovo de *Schistosoma mansoni*.

2.ª) 26-8-47.

Inspeção: normal. Toque: nada a acrescentar. Anuscopia: nada a acrescentar. Retoscopia: o intestino encontra-se desde a sua porção inferior com bastante quantidade de fezes líquidas (preparação recente). Bastante quantidade de muco foi observada em toda a extensão. A mucosa apresenta-se ligeiramente pálida, com edema bastante acentuado, pouco se observando a trama vascular. Não foram observadas lesões características de esquistosomíase. a) Dr. Macedo Soares.

3.º) 13-4-48.

Biópsia retal: Foram encontrados 3 ovos com estrutura morfológica alterada, porém reconhecíveis.

4.º) 22-2-49.

Inspecção, toque, anuscopia, retoscopia: nada digno de nota.

Biópsia retal: negativa.

5.º) 7-6-49.

Inspecção, toque, anuscopia: nada digno de nota.

Retoscopia: notamos no terço inferior do reto, mucosa hiperemiada com pouca visibilidade da trama vascular. Não se observa edema da mucosa. Brilho ligeiramente diminuído. Biópsia 1.ª válvula Houston: negativa.

Punção biópsia hepática — 24-6-49.

Fígado de estrutura conservada. Infiltrados inflamatórios crônicos nos espaços portas. Pigmentação negra nas células de Kupfer. Nota: Aspectos sugestivos de esquistossomíase, posto que não tenham sido evidenciados ovos no material enviado. a) Godofredo Elejalde.

Exame de urina:

	30-5-47	15-10-47
Densidade	1011	1017
Albumina	negativa	negativa
Substâncias redutoras	negativa	negativa
Pigmentos biliares	negativo	negativo
Hemoglobina	negativa	negativa
Urobilinogênio	positiva dil. a 1/30	+1/30

Sedimento — Raras células epiteliais de descamação das últimas vias.

Dosagem de proteínas no soro:

Data	Proteínas totais g/100 ml	Albumina	Globulina	Relação A/C
2- 6-47	8,4 g	4,8 g	3,6 g	1,3
13- 6-47	9,6 g	5,0 g	4,6 g	1,1
15-10-47	8,8 g	—	—	—

Provas de função hepática:

Data: 2-6-47 — Takata Ara: positiva 01013422; Formol-gel: positiva; Van den Bergh direta, tardia, francamente positiva; R. Weltmann: zona de coagulação no tubo n.º 7; Prova Hanger: +.

Data: 10-9-47 — Takata Ara: positiva 00012210; Formol-gel: francamente positiva; Hanger: negativa.

Dosagem de bilirrubinas — 10-9-47:

Bilirrubina direta imediata	0,00 mg por 100 ml
Bilirrubina direta total	0,05 mg por 100 ml
Bilirrubina indireta	0,95 mg por 100 ml
Bilirrubina total	1,00 mg por 100 ml

EXAMES HEMATOLÓGICOS

Data	Erit.	Leuc.	Hem.	V.G.	Neutrófilos			Eos.	Bas.	Linf. tip.	Linf. leuc.	Mon.	Observações
					Met.	Bast.	Segmentados						
30- 4-47	3.880.000	5.300	69% (11,0 g)	0,9	1,5	4,5	57,5	17,5	1,5	12,0	2,0	4,0	
10- 9-47	4.200.000	5.000	80% (12,8 g)	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
15-10-47	4.200.000	9.200	82% (13,1 g)	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	T.S.: 2'30" T.C.: 11' Hematócrito 52%
30-10-47	4.200.000	12.000	84% (13,4 g)	1	—	8,0	53,6	12,8	0,8	14,4	—	10,4	D.M.: 8,1 μ 1 semana pos. esplenectomia (23-10-47)
14- 2-48	4.000.000	10.000	89% (14,2 g)	1,1	—	5,0	35,5	19,0	0,5	28,5	4,5	7,0	Eritrócitos normocrômicos e normocíticos
7-10-49	3.700.000	5.000	67% (10,7 g)	0,9	—	8,0	45,0	0,0	2,5	31	6	7,0	Plasmócitos 0,5 D.M.: 7,3 μ

Exames de fezes — Método de Hoffmann, Pons e Janer: positivo para ovos de *S. mansoni* e *Ascaris lumbricoides* (2-6-47).

Entre 28-8-47 e 12-10-47 foram feitos 14 exames de fezes, os quais sempre acusaram a presença de ovos de *Ascaris lumbricoides*, sendo em quatro ocasiões também positivos para ovos de ancilostomídeos. A pesquisa de ovos de *S. mansoni* foi sempre negativa nesse material.

Exame de escarro — Pesquisa de ovos de *S. mansoni*: negativo — 7-6-47; negativo — 2-7-47.

EVOLUÇÃO E TERAPÊUTICA

O curso da moléstia durante o período de observação na enfermaria foi afebril, não sofrendo o quadro clínico alterações dignas de nota. O paciente foi submetido a regime alimentar hiperprotéico, hipogorduroso e rico em hidratos de carbono. Foi medicado com ferro reduzido e complexo B, medicação que seguiu durante todo o tempo de internação. Em 13-8-1947 foi feito tratamento da esquistosomíase, o qual consistiu na administração, por via endovenosa, de 0,10 cg de tartrato duplo de sódio e antimonila em 10 cm³ de soro fisiológico, em 3 doses iguais, com intervalo de 4 horas entre cada uma. O paciente suportou perfeitamente a medicação e o seu estado geral melhorou com o tratamento indicado, tendo o seu peso aumentado, pois em 7-9-47 ele pesava 55 quilos. O exame físico permaneceu, contudo, inalterado em relação aos dados registrados na observação.

Em 13-10-1947 ele foi transferido para a 1.^a C. C. (Serviço do Prof. Alípio Corrêa Neto), onde em 23-10-1947 foi esplenectomizado pelo Dr. E. de J. Zerbini, auxiliado pelo Dr. Orlando Lodovici. Durante o ato cirúrgico foi verificado que o fígado se apresentava um pouco aumentado, duro, de superfície granulosa. Foi feita uma biópsia hepática (vide adiante). Nada de anormal foi verificado à exploração do sistema porta e suas três veias aferentes. O baço extirpado apresentava-se ao exame macroscópico de forma conservada e media 16x9x6 cm. A sua consistência era elástica, a cápsula fina e lisa; a superfície de corte mostrava o tecido de cor vermelha vinhosa, dando saída a grande quantidade de sangue. Os corpúsculos linfóides estavam muito evidentes devido ao seu grande volume e número. O exame microscópico dos cortes de baço mostrou os cordões muito espessados, relativamente pobres em células, notando-se entre elas predominância de eosinófilos. Nota-se uma congestão intensa dos seios venosos. Em algumas áreas existe maior espessamento do tecido colágeno, grande número de hemácias, alguns gigantócitos e grande depósito de cálcio. O exame histológico do fragmento de fígado demonstrou a existência de um quadro adiantado de cirrose partindo dos espaços portais e destruindo a estrutura lobular. Encontram-se frequentes granulomas, sendo alguns formados por acúmulos linfocitários. Não foram encontrados ovos de *Schistosoma*. Conclusão do exame anátomo-patológico: Esplenomegalia crônica. Esplenogranuloma hemossiderótico de Gamna. Congestão. Cirrose periportal e granuloma do fígado (provavelmente esquistosomótica) (figs. 22 e 23). A nosso pedido, a Dra. M. L. Mercadante Tavares da Silva praticou uma série de cortes do fragmento de fígado, fornecendo-nos o seguinte resultado do seu exame: "Cortes seriados do fragmento do fígado mostraram sempre o mesmo quadro de cirrose portal acompanhada de um granuloma de corpo estranho, encapsulado, envolvendo sempre um tecido necrosado, que lembra longinquamente o corpo de um verme. Além disso encontra-se abundante pigmento castanho escuro, situado tanto nos granulomas como no interior das células de Kupfer. Nos numerosos cortes não foram encontrados ovos de esquistosomas".

O pós-operatório correu sem incidentes, recebendo o paciente alta em 8-11-47, após 24 dias de permanência no serviço cirúrgico. O paciente continua sendo observado no ambulatório da 1.^a Clínica Médica até o presente. Ele não apresenta queixa relacionada com o aparelho cardiorrespiratório. Não mais se queixou da dor precordial nem de dispnéia. Entretanto, o exame do aparelho circulatório permanece inalterado. Um eletrocardiograma obtido em 10-5-1949, portanto cerca de 20 meses após a intervenção cirúrgica, não apresenta alterações dignas de nota em relação aos anteriores, a não ser evidências de uma sobrecarga auricular anteriormente inexistente.

As únicas queixas referidas pelo paciente em suas visitas ao ambulatório eram cólicas abdominais de caráter intermitente, periumbilicais e que desapareceram após administração de um antihelmíntico (hexilresorcinol cristóides), visto persistirem positivos os exames de fezes para ovos de *Ascaris lumbricoides*. Foram feitas 3 biópsias retais com exame por transparência de um fragmento da 1.^a válvula de Houston, respectivamente em 13-4-48, 22-2-49 e 7-6-49, resultando todos negativos para ovos de *S. mansoni*. Os exames de fezes pelo método de Hoffmann também persistem negativos para os mesmos ovos, tendo o último exame sido feito em 7-6-49.

Foram feitos durante esse período os seguintes exames: Radiografia do tórax (pulmões e coração) 27-9-49: Campos pulmonares de transparência normal. Nódulos calcificados nos hilos. Seios frênicos livres. Aumento da área de projeção do coração com saliência pronunciada do arco médio e alongamento do arco inferior E. Dr. Cotrim (fig. 18). Reação de Wassermann negativa. Reação de Kahn negativa. Reação Kline (quantitativa: antígeno cardioplipina): negativa — 22-9-49. Em 29 de setembro de 1949: Reação de fixação do complemento para moléstia de Chagas: negativa. (Processo quantitativo). Provas de função hepática — 7-10-1949 — Takata Ara: negativa. Formol-gel: negativa. Cefalina colesterol (Hanger): negativa. R. Van den Bergh: reação direta tardia, fracamente positiva. Índice icterico: 9. Timol: 2,6 unidades de turvação Machagau. Hemograma (vide quadro).

COMENTARIOS

Este caso apresenta digno de nota o fato de se referir a um paciente de 19 anos, procedente de foco conhecido de esquistosomíase mansoni, com dados seguros da infecção parasitária, narrados em sua anamnese. Desde a idade de 16 anos ele se queixava de palpitações cardíacas e dispnéia provocadas principalmente pelo esforço. Desde a mesma época sentia dor precordial e tonturas. Além disso apresentava astenia progressiva e crises intermitentes, datando de muito tempo, de disenteria muco-sanguinolenta, acompanhadas de tenesmo.

Nos seus antecedentes, como dados negativos importantes, devem ser referidos a ausência de broncopneumopatias crônicas, reumatismo e sífilis. Havia, entretanto, uma poli-verminose intensa. Ao exame físico chama atenção a palidez da pele e descoramento das mucosas; ausência de cianose, dedos hipocráticos, ascite e sinais físicos de comprometimento pulmonar. Havia hepatomegalia e grande esplenomegalia.

Ao exame do aparelho circulatório verificou-se pulsação sistólica no 2.^o e 3.^o intercosto esquerdo. Segunda bulha palpável e desdobrada no foco pulmonar. Hiperfones e desdobramento da 2.^a bulha no foco pulmonar. Pressão arterial normal.

Pelos exames de laboratório verificou-se a existência de anemia, hipocromia, leucopenia e eosinofilia. Hiperglobulinemia responsável pela taxa elevada de proteínas do sangue. Reações de Takata e formol-gel positivas. As outras provas hepáticas mostraram-se praticamente normais (bilirrubinas normais, reação de Hanger negativa), verificando-se apenas urobilinogenúria positiva na diluição de 1:30. Os exames eletrocardiográficos repetidos demonstraram sempre desvio do eixo elétrico para a direita, com curvas de hipertrofia ventricular direita. A esquistosomose já suspeita, em vista da anamnese do paciente, foi confirmada amplamente pelos resultados de vários exames de fezes e repetidas biópsias retais, com exame por transparência de um fragmento da 1.^a válvula de Houston, feitos para controle terapêutico.

O exame radiológico demonstrou aumento do volume cardíaco e dilatação do cone pulmonar.

A nosso pedido, o Dr. M. Romeiro Neto, do serviço de eletrocardiografia do Hospital das Clínicas, nos forneceu o seguinte relatório das alterações eletrocardiográficas verificadas no nosso paciente (M. A. P.):

ECG. — 2-6-47 — Ritmo sinusal com bloqueio parcial do ramo direito do feixe de His. Hipertrofia ventricular direita.

Onda P de aspecto dentro dos limites normais, estando ÂP ao redor de +35°. T negativa em D2, D3, V1 e V3, apresentando caracteres sugestivos de alterações primárias.

rias, portanto, indicando processo isquêmico do miocárdio. Nota — Não foi tirada a derivação V5.

ECG. — 10-6-47 — Observam-se, em relação ao ecg. anterior, as seguintes modificações:

1.º) T tornou-se negativa em D1 e em todas as 6 derivações precordiais.

2.º) T tornou-se positiva em AVR.

Neste traçado as alterações primárias da onda são mais evidentes, permitindo que se faça o diagnóstico de lesão isquêmica extensa do miocárdio.

No complexo auricular nota-se discreta rotação de ÂP para a esquerda.

ECG. — 18-6-47 — Não se observam, em relação ao ecg. de 10-6-47, alterações dignas de registro. Nota — Foram tiradas apenas as derivações clássicas.

ECG. — 2-8-47 — Em relação ao ecg. anterior de 18-6-47 não se observam alterações dignas de registro.

ECG. — 2-9-47 — Em relação ao ecg. anterior de 2-8-47 não se observam alterações dignas de registro.

ECG. — 10-5-49 — Em relação ao ecg. anterior de 2-9-47 observam-se as seguintes alterações dignas de nota:

1.º) Aumento da voltagem de R em V1, permitindo a conclusão de acentuação da hipertrofia ventricular direita.

2.º) A voltagem de P3 tornou-se maior que a de P1 e o ÂP rodou para a direita, estando ao redor de $+55^\circ$. As alterações de P, se bem que ainda estejam dentro dos limites normais, estão caminhando nitidamente para o aspecto que se descreve no cor pulmonale crônico.

3.º) A onda T tornou-se positiva em D1 e D2; negativa em AVR. Nas precordiais a onda T apresenta-se mais com caracteres das alterações secundárias do que das primárias. Estas alterações da onda T são quase que exclusivamente secundárias. Mesmo que existam alterações primárias, elas são mínimas, permitindo que se conclua que a lesão isquêmica desapareceu ou, pelo menos, sofreu uma redução acentuada.

A sífilis e a moléstia de Chagas foram excluídas pelas respectivas reações de fixação de complemento.

O paciente foi esplenectomizado, correndo a operação e o pós-operatório excelentemente bem. Durante o ato operatório notou-se que o fígado achava-se aumentado, endurecido e granuloso. O exame histológico de um fragmento de tecido hepático obtido por biópsia operatória revelou um quadro de adiantada cirrose periportal com granulomas; o exame do baço demonstrou um quadro de esplenogranuloma hemossiderótico de Gamna. Apesar, por conseguinte, da normalidade das provas hepáticas, este paciente apresentava uma cirrose hepática e grande esplenomegalia crônica, cuja origem esquistossomótica não se pode pôr em dúvida. É importante assinalar que o paciente foi seguido durante 2 anos, evidenciando, após o tratamento médico continuado e esplenectomia, não só melhoras do quadro sanguíneo como desaparecimento dos sintomas cardíacos (palpitações, dispnéia, precordialgia).

Contudo, o exame radiológico cardiovascular não se modificou grandemente, mas o exame eletrocardiográfico mostrou, digno de nota, as modificações das lesões isquêmicas verificadas anteriormente.

Em resumo: Trata-se de um caso adiantado de cirrose hepato-esplênica esquistossomótica, com um quadro clínico, radiológico e eletrocardiográfico de cor pulmonale crônico, com grande hipertrofia ventricular direita e em fase ainda de compensação cardíaca, observado durante 2 anos.

De acôrdo com os dados desta observação e das considerações expendidas no texto, não temos dúvida em considerar este caso como de arterite pulmonar esquistosomótica. A negatividade do exame de escarro para ovos de *S. mansoni* não justifica a exclusão dessa possibilidade diagnóstica.

Ao contrário, de acôrdo com a opinião exposta ao tratarmos da questão do diagnóstico, devemos considerar que, em face dos seguintes elementos, podemos fazer o diagnóstico clínico de arterite pulmonar esquistosomótica:

- a) Indivíduo jovem, procedente de área endêmica de esquistosomíase mansoni e portador, indiscutivelmente, de uma forma avançada de esquistosomose hepato-esplênica-intestinal bem comprovada.
- b) O paciente apresenta um quadro de cor pulmonale bem caracterizado clínica, radiológica e eletrocardiograficamente.
- c) Não apresenta antecedentes reumáticos, nem passado broncopulmonar, sendo também ausentes os sinais clínicos de uma cardiopatia congênita ou de um vício valvular (estenose mitral) adquirido.
- d) Em casos semelhantes, deve-se considerar o diagnóstico de arterite pulmonar esquistosomótica como sendo o de maior probabilidade e único clinicamente defensável.

Pensamos, pois, poder afirmar, mesmo na ausência do encontro do ovo no escarro, dada a origem essencialmente vascular da lesão, que M. A. P. apresenta uma arterite pulmonar esquistosomótica.

* * * *

OBSERVAÇÃO 3 — S. L. S. — Sexo masculino, 20 anos, branco, brasileiro, natural de Murici (Estado de Alagoas), lavrador, solteiro, procedente de Marília. Registro n.º 147.134. 1.ª C. M. Hospital das Clínicas. Admissão: 26-7-49. Alta: 26-9-49.

Queixa e sua duração — Aumento do volume do ventre e inchaço dos membros inferiores há 25 dias.

H. M. A. — Refere o paciente que há mais ou menos um mês sentiu-se indisposto, febril, com o corpo quente, sede e arrepios de frio. Tinha tosse seca, incômoda, aparecendo no 3.º dia do início de sua moléstia, dor no hemitórax esquerdo, como agulhada, que se irradiava para o dorso e era intensificada pela tosse e respiração profunda. Nesse dia a febre elevou-se e a tosse passou a ser acompanhada de pequena expectoração esbranquiçada. Foi submetido a tratamento pela penicilina. Logo em seguida às primeiras injeções do antibiótico teve uma copiosa hematemese, vomitando cerca de 2 litros de sangue vivo e coágulos sanguíneos (sic). Sobreveio sede intensa, mas o líquido que ingeria era rejeitado com o vômito. Ficou durante um dia inconsciente, sem poder formar o que se passou durante esse tempo. No dia seguinte evacuou fezes pretas, de consistência mole, avacuando nesse dia duas vezes com esses caracteres. Sentia-se muito fraco e com zumbidos fortes nos ouvidos. Não sentia mais febre. Cinco dias após a hematemese notou aumento do volume do ventre e edema dos membros inferiores. De então para cá o abdome foi aumentando pouco a pouco de volume e os edemas dos membros inferiores chegaram até aos joelhos. Informa que a tosse desapareceu logo nos primeiros 6 dias de doença, e que não sentiu falta de ar nem notou alterações no volume e aspecto da urina. Os 15 dias seguintes à hematemese passou acamado; sentia-se extremamente fraco e com o abdome e pernas inchadas.

As fezes são agora de coloração normal. Como não melhorasse com o tratamento que lhe foi instituído, resolveu internar-se neste Hospital.

O interrogatório sobre os diferentes aparelhos não fornece nenhum dado de interesse a não ser que, um mês antes da moléstia atual, notou que estava ficando progressivamente mais pálido.

Antecedentes pessoais — Varicela na infância. Coqueluche aos 15 anos. Malária aos 9 anos, quando residiu em área endêmica (Rio do Peixe). Nega relações sexuais.

Reside atualmente em Marília, tendo vindo há 3 anos de seu Estado natal (Alagoas). Nasceu em Murici, onde costumava banhar-se em rios. Não foram referidos outros dados sugestivos quanto à infecção esquistossomótica.

Reside em casa de "pau-a-pique". Conhece o "barbeiro", mas nega ter sido picado por ele. Hábitos alimentares satisfatórios (ovos, leite, carne, arroz e feijão, poucas verduras). Tabagista moderado, fumando de 8 a 10 cigarros por dia. Não é etilista.

Antecedentes familiares — Pais vivos; a mãe é cardíaca. Teve 13 irmãos, dos quais 6 são vivos e sadios. Informa que 2 irmãos faleceram de doença semelhante à sua, e que conhece, em Alagoas, várias pessoas que sofrem do mesmo mal.

Exame físico geral — Indivíduo do sexo masculino, longilíneo, com 1,57 cm de altura, pesando 48.200 g; temperatura 36,9. P.A. 105-60. Pulso 96. Estado geral mau. Atitude e decúbito indiferentes. Pele com palidez acentuada, seca, de boa elasticidade, ausência de circulação venosa visível; edema discreto do rosto; edema dos membros inferiores, mole e depressível, atingindo a altura do terço médio de ambas as pernas; edema da parede abdominal. Pêlos pouco abundantes mas com distribuição do tipo masculino. Unhas sem alterações. Mucosas intensamente descoradas. Panículo adiposo escasso. Musculatura hipotrófica e hipotônica. Gânglios: cervicais, submaxilares, axilares palpáveis, pequenos, duros, indolores, sendo os inguinais pouco maiores mas com os mesmos caracteres. Epitrocleanos não palpáveis. Esqueleto sem particularidades. Ausência de esternalgia e tibialgia.

Exame físico especial — Crânio: nada digno de nota. Olhos: conjuntivas muito descoradas. Íris isocrômicas. Pupilas isocrômicas. Reflexos à luz, acomodação e consensual presentes e normais. Ouvido e nariz: nada digno de registro. Seios da face e mastóide indolores à pressão. Bôca: lábios descorados. Gengivas também descoradas. Dentes em bom estado de conservação. Língua pálida. Amígdalas pequenas e pálidas. Pescoço: ligeira estase jugular de ambos os lados. Batimentos arteriais visíveis de ambos os lados. Tireóide palpável mas não aumentada de volume. Oliver-Cardarelli ausentes. Aorta não palpável na fúrcula. Intenso ruído de piorra.

Aparelho respiratório — Inspeção: digno de nota apenas alargamento das bases do tórax, sendo mais pronunciado à E. Palpação, percussão e ausculta: nada digno de nota.

Aparelho circulatório — Inspeção e palpação: região precordial ligeiramente mais saliente (todo hemitórax esquerdo é mais abaulado). Choque da ponta visível e palpável ao nível do 4.º espaço intercostal, meio centímetro acima do mamilo E., circunscrito, rítmico, pouco intenso, não impulsivo. Batimentos na área mesocárdica ao nível do 3.º intercosto, de intensidade regular, com o mesmo ritmo do choque da ponta. Palpam-se as 2 bulhas nestes pontos. Ausência de frêmitos palpáveis. Percussão: ligeiro aumento da área cardíaca. Ausculta: ritmo de galope protodiastólico mais evidente na área mesocárdica. Sopro sistólico regularmente intenso em todos os focos, em particular no F.M. e na área mesocárdica. Artérias: pulso radial pouco intenso, rítmico, frequência 96 por minuto. Artérias elásticas, depressíveis. Pressão arterial 105-60.

Abdome — Inspeção: grandemente abaulado, com os flancos salientes tendendo para a forma em batráquio. Nota-se ligeira saliência no quadrante superior E., abaixo do rebordo costal, móvel com a respiração. Cicatriz umbilical ligeiramente extrofletida e mais próxima do púbis, do qual dista 6 dedos. Diastase dos retos, na porção supraumbilical, visível sobretudo na posição sentada.

Palpação — Superficial: parede uniformemente tensa, notando-se aumento da resistência no quadrante superior E. Ausência de pontos dolorosos. Verifica-se a diastase dos retos já assinalada na inspeção. Palpação profunda prejudicada pela grande distensão da

parede. Palpa-se pelo rechaço o baço a 3 dedos do rebordo costal, muito móvel, duro, ligeiramente doloroso. Palpação duvidosa do fígado pelo processo do rechaço.

Percussão — Sinais de ascite presentes; som timpânico ao nível do epigástrico e da região umbilical até cerca de um dedo da cicatriz umbilical. Na região infra-umbilical até cerca de 4 dedos para fora da linha mediana e ao nível horizontal da cicatriz umbilical, obtém-se sonoridade maciça da ascite. Macicez móvel nos flancos. Sinal do piparote presente. Fígado: percutível desde o 4.º espaço intercostal, de palpação duvidosa. Baço: percutível a partir do 7.º intercosto na linha axilar média. Ausculta: ouve-se pela manobra do piparote e ausculta simultânea um duplo ruído. Na região esplênica ouve-se um atrito.

Órgãos genitais externos: nada digno de nota. Membros: edema já referido no exame geral. Sistema nervoso: normal.

EXAMES SUBSIDIÁRIOS

Radioscopia — Em 26-7-49: grande aumento da área cardíaca. Saliência do cone pulmonar. Arco inferior direito muito saliente. Pulsações cardíacas intensas.

Radiografia do tórax (fig. 24) (pulmões e coração) — 28-7-49: Elevação acentuada das cúpulas diafragmáticas. Diminuição da transparência em ambas as bases. Reforço da trama vascular. Aumento da imagem cardíaca com saliências pronunciadas dos arcos auricular direito (AD), médio e ventricular esquerdo (VE).

Radiografia do esôfago, estômago e duodeno (4-8-49) — Trânsito retardado pelo esôfago, que se apresenta sinuoso, em virtude da elevação das cúpulas diafragmáticas, com elevação secundária do cárdia. Não existem sinais radiológicos de varizes esofageanas. Estômago e duodeno sem sinais radiológicos de lesão orgânica. Contornos regulares, situação e dimensões normais (Dr. Paulo A. Toledo).

Eletroradiograma — Não foi feito por faltar filme na ocasião.

Exame de urina — 28-7-49 — Albumina: negativa; açúcar: negativo; pigmentos biliares: negativo; urobilinogênio: positivo até 1:30; sedimento: sem importância.

Exame de escarro — Pesquisa de B.K. (4-8-49): negativa.

Exame de fezes — 28-7-49 — Ovos de *S. mansoni*. Protozoários: negativos (método de Faust et al.). 1-8-49 — Ovos de *S. mansoni* (método de Hoffmann, Pons e Janer).

Intradermo reação para esquistosomose — 1-8-49 — Positiva (Dr. Dácio Franco do Amaral).

Reação de fixação do complemento para moléstia de Chagas (processo quantitativo) — 3-8-49: negativa. 13-8-49: negativa (Dr. J. Pedreira de Freitas).

Dosagem das proteínas do soro e suas frações — 28-7-49 — Proteínas totais: 5,0 g por 100 ml; albumina: 3,2 g por 100 ml; globulina: 1,8 g por 100 ml. Relação A/G: 1,8.

Provas de função hepática:

	28-7-49	6-9-49
Takata Ara	positiva	negativa
Formol-gel	negativa	negativa
R. Weltmann	tubo 6.º	tubo 6.º
R. Hanger	+++	++
R. turvação timol	1,8 U.	2,8 U. McLagan

Exame retoscópico e biópsia retal da 1.ª válvula de Houston — 2-8-49: Inspeção normal. Anuscopia: nada digno de nota. Retoscopia: mucosa bastante anemiada com brilho bem conservado. Trama vascular evidente, notando-se grossos vasos na porção inferior do reto, principalmente sobre a 1.ª válvula de Houston. O que mais nos chama a atenção é a extrema friabilidade da mucosa, que apresenta fácil sangramento à simples passagem do aparelho. Edema bastante evidente, encontrando-se as válvulas de Houston alargadas. Pequena quantidade de muco disseminado sobre a mucosa.

Biópsia — Positiva. Encontrou-se apenas um ovo vivo (o material obtido pela biópsia foi muito pequeno). Dr. J. C. Macedo Soares Jr.

EXAMES HEMATOLÓGICOS

Data	D.M.	Hm.	Lc.	Hb.	VG	Bast.	Segmentados	Fos.	Bas.	Linf. tip.	Linf. leuc.	Mon.	Plasm.	Plaquetas	Observações
26- 7-49	7,3 μ	1.300.000	3.000	2,6 (15%)	0,6	7,0	64,0	2,0	2,0	21,0	2,0	2,0	—	78.000	Aniso. Poikiloc. microcitose
29- 7-49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Reticulócitos: 2,5%
11- 8-49	—	2.800.000	2.500	7,8 (48%)	0,8	12,0	31,0	10,0	2,0	32,0	8,0	4,0	1,0	160.000	Reticulócitos: 3,5%
17- 8-49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hemólise inicial: 0,52%
29- 8-49	—	3.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.000	Não houve hemólise final: 0,28%
6- 9-49	7,7 μ	3.700.000	3.800	10,4 (65%)	0,8	6,0	50,0	20,0	0,0	20,0	2,0	1,0	1,0	90.000	Reticulócitos: 2,2%
8- 9-49	7,6 μ	3.200.000	4.500	9,8 (61%)	0,9	5,0	36,0	24,0	1,0	24,0	6,0	4,0	—	130.000	

PROVA DE ESPLENO-CONTRAÇÃO

(Fliedebaun) — Dra. Ellen Schaz — (13-8-49)

8 horas em jejum 2 cm³ de Esidron na veia. Resultado — Volume urinário 900 cm³. Pulso antes 75 — P.A. antes 105-60
 Pêso antes 42 k. Pulso depois 66 — P.A. depois 100-55

Baço antes — 23x14
 Baço depois — 20x13,7

Retração no maior diâmetro: 3 cm

Retração no menor diâmetro: 0,3

Resultado: retração relativamente fraca.

OBSERVAÇÃO HEMATOLÓGICA

Data	Horas	Hematócrito	D.M.	Plaquetas	Hemácias	Leucócitos	Hemoglobina	Valor globular
13-8-49	8 hs.	35%	7,5 μ	94.500	2.700.000	2.200	8,0 g (50%)	0,9
	8,30	—	7,5 μ	—	2.400.000	6.000	7,2 g (45%)	1,0
	9 hs.	—	7,7 μ	—	3.000.000	5.500	9,5 g (59%)	1,0
	9,30	38%	7,7 μ	90.000	3.000.000	2.000	9,8 g (61%)	1,0

Mielograma — 28-7-49:

Células do retículo	0,0%
Hemohistioblastos	0,0%
Hemocitoblastos	0,8%
Mieloblastos	4,8%
Promielócitos neutrófilos	8,4%
Mielócitos neutrófilos	1,8%
Metamielócitos neutrófilos	12,4%
Bastonetes neutrófilos	6,0%
Segmentados neutrófilos	4,0%
Promielócitos eosinófilos	1,2%
Mielócitos eosinófilos	0,4%
Metamielócitos eosinófilos	0,4%
Eosinófilos bastonetes	1,0%
Eosinófilos segmentados	2,4%
Mielócitos basófilos	0,0%
Basófilos segmentados	0,0%
Linfócitos	3,0%
Monócitos	0,0%
Plasmócitos	0,4%
Megacariócitos	0,0%
Proeritroblastos	1,2%
Eritroblastos basófilos	1,8%
Eritroblastos policromatófilos	45,8%
Eritroblastos ortocromáticos	4,0%
Mitoses: série vermelha	2,4%
Mitoses: série branca	0,0%

Obs.: — Notar aumento de promielócitos e metamielócitos. Inibição da granulocitopoiese. Série vermelha com maturação conservada, em hiperplasia, com numerosas mitoses (Fernando T. Mendes).

Evolução — Durante o período de dois meses em que o paciente esteve internado a sua temperatura manteve-se normal, com exceção de três ocasiões, em 10-8-49, 16-8-49 e 13-9-49, em que a curva térmica registrou, respectivamente, 37º,2, 38º e 37º,4, aliás de duração efêmera.

Na primeira semana de internação, o estado do paciente mostrou-se inalterado, quer subjetiva quer objetivamente. A princípio notou-se até ligeiro aumento do volume da ascite e do edema dos membros inferiores. As primeiras melhoras foram observadas em consequência de transfusão de 720 cm³ de sangue total recebidos entre 1 e 2 de agosto. Em 3 de agosto o ruído do galope protodiastólico desapareceu, não tornando a aparecer em todo o decurso da observação. No dia 6 do mesmo mês os edemas dos membros inferiores haviam desaparecido, e nos dias seguintes a ascite também tendia a diminuir, o que foi verificado pelas repetidas medidas da circunferência abdominal. Em 9 de agosto já se conseguiu palpar o bordo inferior do fígado. Em 16 de agosto não se verificaram mais os sinais de ascite. O fígado foi daí por diante palpável a 2 dedos abaixo do rebordo costal, sendo o seu bordo fino, cortante, ligeiramente endurecido. O baço era palpável a 4 dedos do rebordo costal, sendo o seu maior diâmetro igual a 23 cm e o menor a 14 cm. A partir da mesma data o paciente não referia nenhuma queixa e há dias que se mostrava mais ativo, sentia-se mais forte e levantava-se para se dirigir ao laboratório, a fim de fazer os exames solicitados. Daí por diante suas melhoras se acentuavam progressivamente. A anemia ainda aparente mostrava-se entretanto melhorada. A ausculta cardíaca apenas se verificava só o sistólico mais nítido no foco mitral e hiperfonese da 2.ª bulha nessa mesma área e no foco pulmonar, onde era mais intenso.

Em vista das melhoras obtidas com o prosseguimento do tratamento, aconselhamos ao paciente a intervenção cirúrgica (esplenectomia), que ele recusou, solicitando alta hospitalar. Em 26-9-49 foi dada a alta em condições muito melhoradas. Apesar de ter o paciente prometido voltar ao ambulatório, para continuar o tratamento e completar al-

guns exames (eletrocardiograma), ele voltou para o interior e não foi mais, até agora, observado na clínica.

Terapêutica — Inicialmente, o paciente foi submetido a uma dieta hiperprotéica, hiperglicídica, hipogordurosa e acloretada. Quando o edema e a ascite desapareceram a restrição de sal foi suspensa. Em 1-8-49 o paciente recebeu 370 cm³ de sangue total e no dia seguinte mais 350 cm³. Em 8-8-49 foi feita nova transfusão de sangue (300 cm³), completando-se assim 1.020 cm³. Além disso o paciente foi tratado durante todo o tempo de sua permanência no Hospital, por via oral, com uma emulsão de polivitaminas e 200 cm³ diários de uma solução de ácidos aminados (Aminogenol). Além disso ele foi medicado com sulfato ferroso (1,20 g diárias) e complexo B, este último medicamento por via oral e parenteral. Entre 12 e 18 de agosto foi medicado com 9 cm³ de "Anthiomalina" (via intramuscular) e entre 27 de agosto e 13 de setembro fez uma série de injeções intramusculares de "Repodral", atingindo um total de 39,5 cm³ deste antimonial. O resultado clínico desse tratamento foi excelente. Desapareceram, como vimos, os edemas e a ascite. O quadro sanguíneo melhorou, como mostram os exames hematológicos, embora ainda presentes sinais de hiperesplenismo. Subjetivamente o paciente sentia-se muito bem, ao pedir a sua alta.

COMENTARIOS

Este caso refere-se a um rapaz procedente de um foco conhecido de esquistosomíase mansoni, em Alagoas (Murici), onde provavelmente adquiriu a parasitose na infância, nos banhos em águas contaminadas, como consta de sua anamnese. No decurso de uma pneumopatia aguda febril ele teve uma hematemese copiosa e melenas. Ficou inconsciente um dia em consequência a esta hemorragia, e depois sobreveio intensa astenia. A esquistosomíase mansoni foi diagnosticada tanto pelos exames de fezes como pela biópsia retal e pela intradermo reação fortemente positiva. Ao ser hospitalizado apresentava, clínica e hematologicamente, uma anemia intensa (palidez da pele, descoramento da mucosa, thrill jugular, sopro anêmico, oligocitemia acentuada e reduzidíssima taxa de hemoglobina). Havia ainda edemas periféricos e ascite. Não apresentava dispnéia. Com o tratamento instituído houve melhora da anemia, regressão completa da ascite e dos edemas. O fígado foi encontrado aumentado e de consistência endurecida, a 2 dedos do rebordo costal, e o baço excedia 4 dedos o rebordo costal E. Não foram verificadas varizes esofageanas ao exame radiológico, mas estas muito provavelmente estavam presentes, devendo a sua ruptura ser responsável pela hemorragia que o paciente sofreu. O exame do aparelho circulatório evidenciou pulsação sistólica no 3.º espaço intercostal, onde 2 bulhas eram palpáveis. Quando a anemia melhorou observou-se nítida hiperfonese da 2.ª bulha pulmonar, tendo o ruído de galope protodiastólico anteriormente audível, desaparecido. Havia hipoproteinemia por hipoalbuminemia: reação de Hanger 3 +. Tanto radioscópica como radiograficamente verificou-se aumento da área cardíaca com saliência do cone da pulmonar. A moléstia de Chagas foi excluída em virtude do resultado negativo de duas reações de fixação do complemento.

Trata-se, portanto, de um caso de esquistosomíase hepato-esplênica bem caracterizada, acompanhada de dilatação cardíaca, com saliência do cone da pulmonar evidente, e hiperfonese da 2.ª bulha no foco pulmonar.

Com o tratamento antianêmico (transfusões sanguíneas e ferruginosas) e dietético (dieta hiperprotéica e polivitamínica), verificaram-se melhoras dos sintomas decorrentes da grande espoliação sanguínea (anemia, hipoproteinemia com ascite e edema). O paciente tolerou perfeitamente e com proveito o tratamento antimonial, persistindo a hepato-esplenomegalia.

E' digno de nota não apresentar o paciente dispnéia, nem dedos em vaqueta de tambor, não havendo nos seus antecedentes nada de particular (inf. reumática, broncopneumopatias crônicas etc.). Infelizmente, atemorizado pela indicação que lhe fizemos, para se submeter à esplenectomia (hiperesplenismo), o paciente apressou a sua alta, retirando-se do hospital sem que fizesse um exame eletrocardiográfico (que não foi feito antes por falta de filme) e repetisse os exames radiológicos do tórax, inclusive nas posições oblíquas.

Apesar destas falhas, pensamos que este caso pode clinicamente ser rotulado como de arterite pulmonar esquistosomótica, sobrevivendo em paciente de adiantada forma hepato-esplênica da esquistosomose, de acordo com o que foi discutido anteriormente.

RESUMO

Na primeira parte do trabalho os AA. fazem uma revisão completa da forma cárdio-vascular da esquistosomíase mansoní, servindo-se de toda a literatura à sua disposição. São fornecidos os dados a respeito do que a literatura encerra sobre o "cor pulmonale" crônico esquistosomótico, não tendo faltado as principais referências sobre a contribuição dos exames de laboratório e eletrocardiográficos. Em seguida os AA. consideram a patogênese do processo, de acordo com várias opiniões comentadas no texto do trabalho.

Na parte em que tratam do diagnóstico, os AA. discutem extensamente a questão do diagnóstico diferencial. Por fim, os AA. tecem considerações sobre a evolução, prognóstico e tratamento, externando pontos de vista pessoais sobre esta matéria.

Na segunda parte do trabalho, os AA. apresentam e comentam três observações. Uma destas foi acompanhada dos dados necroscópicos, sendo as duas primeiras ilustradas fartamente com documentos clínicos.

Encerra o trabalho dos AA. a lista bibliográfica do assunto.

ABSTRACT

In the first part of this paper the authors make a complete revision of the cardio-vascular form of Manson's schistosomiasis, making use of all the bibliography they were able to consult. Data about what there is in literature on the clinical, radiological and pathological aspects are given on the chronic "cor pulmonale" due to *Schistosoma mansoní*, also the most important references on contributions made by laboratory and electrocardiographic studies. After this part the authors treat the pathogenesis of the process in with reference to the various opinions given in the text.

In the part dealing with the diagnosis, the authors discuss in detail the question of a differential diagnosis. Finally the authors comment on the course, prognosis and treatment, giving their own views on this subject.

In the second part of the paper the authors present three cases making comments on them. One of them is accompanied by necroscopic data, the others two are profusely illustrated with clinical documents. A bibliographical list is given at the end.

BIBLIOGRAFIA

- 1 — Abbott, M. E. e Weiss, E.: The diagnosis of congenital cardiac diseases, in Blumer, G., Bedside Diagnosis, vol. II, pp. 353-514, W. B. Saunders, 1929.
- 2 — Armbrust, A. de F.: Miocardite esquistossomótica (Forma granulomatosa). Nota prévia. O Hospital, Rio de Janeiro, 36:213-218 (agosto) 1949.

- 3 — Azmy, S.: Pulmonary arteriosclerosis of bilharzial nature. *J. Egyptian M. A.*, **15**: 87-90 (March) 1932.
- 4 — Baldo, I. I.; Yopez, C. C.; Mayer, M. e Pifano C., Felix: Investigaciones concernientes a los aspectos pulmonar y cardiovascular de la schistosomiasis mansoni en una area endemica del País. XII Conferência Sanitária Panamericana. Cuadernos Amarillos n.º 9, Caracas, 1946.
- 5 — Barden, R. P. e Cooper, D. A.: Peripheral vascular disease in the lungs. Roentgenologic manifestations. *J.A.M.A.*, **137**:584-588 (June, 12) 1948.
- 6 — Bedford, D. E.; Aidaros, S. M. e Girgis, B.: Bilharzial heart disease in Egypt; cor pulmonale due to bilharzial pulmonary endarteritis. *Brit. Heart J.*, **8**:87-95 (April) 1946.
- 7 — Brill, I. C. e Krygier, J. J.: Primary pulmonary vascular sclerosis. *Arch. Int. Med.*, **68**:560-577 (Sept.) 1941.
- 8 — Chapman, Don W.; Earle, D. M.; Gugle, L. J.; Huggins, R. A. e Zimdahl, Walter: Intravenous catheterization of the heart in suspected congenital heart disease. *Arch. Int. Med.*, **84**:640-659 (Oct.) 1949.
- 9 — Clark, E. e Graef, I.: Chronic pulmonary arteritis in schistosomiasis mansoni associated with right ventricular hipertrophy; report of case. *Am. J. Path.*, **11**:693-706 (June) 1935.
- 10 — Coutinho, J. O.: Diagnóstico da esquistossomose pela intradérmo-reação com antígenos de esquistossomos adultos. *Rev. clín. de São Paulo*, **25**:17-25 (jan.-fev.) 1949.
- 11 — Day, H. B.: Pulmonary bilharziasis. *Tr. Roy. Soc. Trop. Med. & Hyg.*, **30**:575-582 (April) 1937.
- 12 — Dew, H. R.: Pathology of schistosomiasis. *J. Path. & Bacteriol.*, **26**:29-39 (Jan.) 1923.
- 13 — Dias, C. B.: Quimioterapia antimonial na esquistossomose mansônica. Tese de concurso. *Fac. Med. Univ. Minas Gerais*, 1948.
- 14 — Erfan, M.: Pulmonary schistosomiasis. *Tr. Roy. Soc. Trop. Med. & Hyg.*, **42**: 109-113. Discussion pp. 113-116. (Sept.) 1948.
- 15 — Erfan, H. e Deeb, A. A.: The radiological features of chronic pulmonary schistosomiasis. *Brit. J. Radiol.*, **22**:638-642 (Nov.) 1949.
- 16 — Erfan, M.; Erfan, H.; Mousa, A. M. e Deeb, A. A.: Chronic pulmonary schistosomiasis: a clinical and radiological study. *Tr. Roy. Soc. Trop. Med. & Hyg.*, **42**: 477-485 (March) 1949.
- 17 — Gold, M. M. A.: Congenital dilatation of the pulmonary arterial tree. Relation to Ayerza's disease and primary arteriosclerosis. *Arch. Int. Med.*, **78**:197-209 (August) 1946.
- 18 — Greene, D. G.; Baldwin, E. D.; De Forest, E. e Sterling, B. J.: Pure congenital pulmonary stenosis and idiopathic congenital dilatation of the pulmonary artery. *Am. J. Med.*, **6**:24-40 (Jan.) 1949.
- 19 — Ibrahim, R.; Sorour, A.; Elsherif, A. e Attiah, M.: Recent aspects of congenital heart disease with demonstration of some cases. *J. Roy. Egyptian M. A.*, **32**:741-749 (Oct.) 1949.

- 20 — Jaffé, R.: Comunicaciones sobre la bilharziosis pulmonar. Gac. med. de Caracas, [46]:390-393 (Out.) 1939.
- 21 — Jaffé, R.: Observaciones sobre lesiones pulmonares producidas por *Schistosoma mansoni* (su frecuencia y su importancia). Rev. san. y asist. social, 9:1287-1298 (dez.) 1944.
- 22 — Jaffé, R.: Anatomia patologica y patogenia de la bilharziosis mansoni en Venezuela Arch. Venezol. Patol. Trop. y Parasit. Med., 1:32-60 (jan.) 1948.
- 23 — Kenawy, M. R.: Citado em Erfan, M., Gaz. Fac. Med., Cairo, 15-27, 1947.
- 24 — Koppisch, E.: Studies on schistosomiasis mansoni in Puerto Rico; morbid anatomy of disease as found in Puerto Ricans. Puerto Rico J. Publ. Health & Trop. Med., 16:395-455 (March) 1941.
- 25 — Lampe, P. H. J.: Pathologisch anatomische Veränderungen bei Bilharziosis mansoni. Ark. Schiffs und Tropen Hyg. Band 30, (9) 475-484, 1926.
- 26 — Lobo, R. M.: Determinações cardíacas da esquistosomose mansônica. Tese de concurso para catedrático de Clínica Médica. Fac. Med. Univ. da Bahia. 1947. Edit. Nova Era Ltda. Bahia, vol. 1, pág. 238.
- 27 — Magalhães, B. F. e Dias, C. B.: Esquistosomose de Manson. Estudos. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 41:363-446 (dez.) 1944.
- 28 — Mainzer, F.: Clinical aspects of pulmonary diseases induced by *Schistosoma haematobium* and *mansoni*. J. Egyptian M. A., 21:762-795 (Dec.) 1938.
- 29 — Meira, J. A.: Estudo clínico das formas pulmonares da esquistosomíase mansônica (Doença de Manson-Pirajá da Silva). Inclui bibliografia do assunto até 1941. Arq. de cir. clín. e exper., 6:3-136 (fev.) 1942.
- 30 — Meira, J. A. e Macedo Soares Jr., J. C.: A biópsia retal no diagnóstico da esquistosomíase mansoni. Arq. Fac. Hig. S. Púb. Univ. São Paulo, 2:45-90 (junho) 1948.
- 31 — Meira, J. A. e Ramos, J. Jr.: Considerações sobre o eletrocardiograma na esquistosomíase mansoni; contribuição para o estudo da miocardite esquistosomótica; concomitância de forma cardíaca de moléstia de Chagas com esquistosomíase mansoni avançada no mesmo doente. Hospital, Rio de Janeiro, 26:717-746 (nov.) 1944.
- 32 — Miller, J. W.: Über die brasilianische schistosomiasis (Bilharziosis) mansoni. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 17s:265-273 (março) 1914.
- 33 — Moschcowitz, E.: Hypertension of pulmonary circulation; its causes, dynamics and relation to other circulatory states. Am. J. M. Sc., 174:388-406 (Sept.) 1927.
- 34 — Moschcowitz, E.: Hipertension of the pulmonary circuit, in Biology of Disease. New York, Grune & Stratton, 1948.
- 35 — Mousa, A. H.: A case of bilharzial Ayerza's disease. (Azmy's disease). Gaz. of the Fac. of Med. Cairo, 10:37-42 (Oct.) 1942.
- 36 — Pondé, A. A. e col.: A doença de Chagas na Bahia. Separata dos Arquivos da Universidade da Bahia. Fac. de Med., 1946.
- 37 — Popper, H. e Volini, I. F.: Clinicopathologic conference. Am. J. Clin. Path., 19: 1146-1153 (Dec.) 1949.

- 38 — Potenza, L.: Bilharziosis pulmonar. *Rev. Policlin. Caracas*, 12:119-125 (março-abril) 1943.
- 39 — Ruiz Rodrigues, J. M.: La Schistosomiasis mansoni en Venezuela. Caracas, Litografia del Comercio, 1945.
- 40 — Sanabria, A.: El electrocardiograma en la miocardite bilharziana. *Rev. Policlin. Caracas*, 12:203-212 (julho-agosto) 1943.
- 41 — Sanabria, A.: Síndrome de Stokes-Adams por miocardites bilharziana. *Rev. Policlin. Caracas*, 13:282-293 (julho-agosto) 1944.
- 42 — Selzer, A.; Carnes, W. H. [et al.]: The syndrome of pulmonary stenosis with patent foramen ovale. *Am. J. Med.*, 6:3-23 (Jan.) 1949.
- 43 — Shaw, A. F. B. e Ghareeb, A. A.: Pathogenesis of pulmonary schistosomiasis in Egypt with special reference to Ayerza's disease. *J. Path. & Bact.*, 46:401-424 (May) 1938.
- 44 — Silveira, J.: Esquistosomose do pulmão e tuberculose pulmonar. II Congresso Nacional de Tuberculose, vol. 3:134-181 (maio) 1941. Separata. Bahia, 1941. — Id. in *Imprensa Médica*, 20:44-58 (agosto) 1944.
- 45 — Silveira, J.: A localização pulmonar da esquistosomose americana. Trabalho apresentado à Sociedade de Medicina Interna de Buenos Aires, maio, 1944. *Arq. Brasil. invest. tuber.*, 6:(1943-1945) 49-63, 1946.
- 46 — Sirry, A.: Radiological study of bilharzial cor pulmonale. *J. Egypt. M. Ass.*, 31:146-177 (Feb.) 1948.
- 47 — Sorour, M. F.: Bilharziosis of the blood-vessels. *Proc. Roy. Soc. Med. (Sect. Trop. Dis. & Parasit.)*, 23:25-26 (July) 1930.
- 48 — Sorour, M. F.: The pathology and morbid histology of bilharzial lesions. *Comptrend du Congres Internat. de Med. Trop.*, 4:321-330, 1932.
- 49 — Spain, D. M. e Handler, B. J.: Chronic cor pulmonale: sixty cases studied at necropsy. *Arch. Int. Med.*, 77:37-65 (Jan.) 1946.
- 50 — Suarez, R. M. e Hernández Morales, F.: Pulmonary schistosomiasis. *Puerto Rico J. Pub. Health & Trop. Med.*, 20:194-216 (Dec.) 1944.
- 51 — Tarr, L.: Effect of the antimony compounds, fuadin and tartar emetic, on the electrocardiogram of man; study of the changes encountered in 141 patients treated for schistosomiasis. *Ann. Int. Med.*, 27:970-988 (Dec.) 1947.
- 52 — Tidy, H.: Ayerza's disease, silicosis and pulmonary bilharziasis. *Brit. M. J.*, 1, n.º 4613 (June, 4) 977-978, 1949.
- 53 — Toledo, P. A.: As hipertensões da pequena circulação: estudo radiológico e electrocardiográfico. *Arq. de cir. clín. e exper.*, 5:835-890 (julho-agosto) 1941. [Número especial comemorativo do jubileu professoral do Prof. Dr. Antonio de Almeida Prado].
- 54 — Willius, F. A.: Cor pulmonale. *Canad. M. A. J.*, 54:42-46 (Jan.) 1946. Idem in *Collected Papers Mayo Clinic and the Mayo Foundation*, 37:342-346, 1946.
- 55 — Zuckermann, R.; Cabrera, C. E. [et al.]: Electrocardiogram in chronic cor pulmonale. *Am. Heart J.*, 35:421-437 (March) 1948.

Fig. 1 — Obs. 1 (M. G. A.) — Radiografia do coração — 28-8-1944.
Relatório no texto.

Fig. 2 — Obs. 1 (M. G. A.) — Eletrocardiograma em 17-8-44. Relatório no texto.

Fig. 3 — Obs. 1 (M. G. A.) — Eletrocardiograma em 20-9-44. Relatório no texto.

Fig. 4 — Obs. 1 (M. G. A.) — Aspecto macroscópico do pulmão. Observar placas de aterosclerose ao nível do ramo principal da artéria pulmonar. No parênquima, vasos de paredes espessadas e luz entreaberta.

Fig. 5 - - Obs. 1 (M. G. A.).

Figs. 5 e 6 — Obs. 1 — Observar hipertrofia da musculatura pectínea da aurícula direita, da parede ventricular, dos músculos papilares e colunas carnosas, bem como do cone arterial.

Fig. 7 — Vaso arterial espessado à custa de proliferação fibrocelular da íntima, apresentando a luz exígua e excêntrica. $\times 180$.

Fig. 8 — Endarterite com recanalização. Túnica média bem conservada. $\times 120$.
Obs. I (M. G. A.).

Fig. 9 — Endarterite com recanalização. Destruição parcial da média e formação de angiomatóides cavernosos no polo inferior. $\times 180$. Obs. I.
(M. G. A.)

Fig. 10 Miohipertrofia da túnica média. Formação de angiomatóides capilares no polo inferior. $\times 120$. Obs. 1 (M. G. A.).

Fig. 11 — Formação angiomatóide, tomando nascimento no ramo transversal da arteríola pulmonar, revestindo o tipo capilar. Luz ausente a este nível por obliquidade do corte. $\times 120$. Obs. 1 (M. G. A.).

Fig. 12 — Processo de endarterite pronunciado. Túnica média bem conservada na metade superior. Na parte restante interrompida pela formação de angiomatóides do tipo capilar e cavernoso. $\times 100$. Obs. 1 (M. G. A.).

Fig. 13 — Corte de artéria em sentido longitudinal, com luz aparente em pequenas áreas em virtude da incidência do corte. Na extremidade esquerda e inferior (assinalada pela flexa), nota-se na adventícia uma casca e restos de ovo, sem reação em tôrno. $\times 20$.

Fig. 14 - - O mesmo aspecto da figura 13, com aumento maior. $\times 180$.

Fig. 15 — A mesma figura anterior focalizando com maior aumento a casca e restos do ovo. $\times 360$.

Fig. 16 — Obs. 2 (M. A. P.) — Radiografia do coração em 7-6-47. Relatório no texto.

Fig. 17 — Obs. 2 (M. A. P.) — Radiografia do coração em O.A.D. (11-7-47).

Fig. 18 — Obs. 2 (M. A. P.) — Radiografia do coração em 27-9-49.
Relatório no texto.

Fig. 19 Obs. 2 (M. A. P.) — Eletrocardiograma em 2-6-47.
Relatório no texto.

Fig. 20 — Obs. 2 (M. A. P.) — Eletrocardiograma em
10-6-47. Relatório no texto.

Fig. 21 — Obs. 2 (M. A. P.) — Eletrocardiograma em 10-5-49. Relatório no texto.

Fig. 22 — Obs. 2 (M. A. P.) — Corte de baço (esplenectomia). Relatório no texto.

Fig. 23 — Obs. 2 (M. A. P.) — Corte de fígado (biópsia hepática durante esplenectomia). Relatório no texto.

Fig. 24 - Obs. 3 (S. L. S.) -- Radiografia do coração em 28-7-49.
Relatório no texto.