

P A P É I S A V U L S O S
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

ALGUMAS NOTAS SÔBRE A FAUNA DE
LEPIDÓPTEROS DE MONTE ALEGRE

p o r

R. FERREIRA D'ALMEIDA

Esta é a primeira lista que publicamos sôbre as espécies de lepidópteros capturados no Distrito de Monte Alegre no Município de Amparo, Estado de São Paulo, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 1942. Foram ao todo três as excursões ali realizadas para a captura de insetos, sendo que o autor destas linhas fez parte apenas das duas primeiras efetuadas em setembro e outubro.

O Distrito de Monte Alegre compõe-se atualmente de terras cultivadas, predominando nelas a cultura do cafeeiro. As florestas que outrora embelezavam vales e serras de há muito desapareceram daquela região quase totalmente, determinando com isso o extermínio ou o afugentamento dos animais que ali então viviam e que deviam ser bem interessantes sob diversos pontos de vista. Hoje vemos ainda, de longe em longe, pequenos capões de mato situados principalmente nas fazendas N. S. da Encarnação, Bom Jesus e Santa Izabel. Na fazenda Santa Maria, já nos limites do Município de Serra Negra, pudemos observar mesmo um pequeno trecho de mata frondosa, talvez a melhor de tôda a região, vestígios das antigas florestas e índice da exuberância da terra.

Com uma flora pouco diferenciada, de onde desapareceram numerosas essências florestais, inutil é dizer que a fauna é pobre, o que aliás é fácil inferir pelas espécies abaixo citadas.

Devemos declarar que na presente lista não estão computadas as espécies das famílias *Ctenuchidae* (= *Euchromiidae*) e *Arctiidae*, subfamília *Pericopinae*, as quais serão estudadas pelo nosso colega e amigo TRAVASSOS FILHO.

RHOPALOCERA

Fam. *PAPILIONIDAE**Battus bunichus* (Huebner)

Comum em setembro e outubro. Lagartas vivendo sobre as folhas das *Aristolochia*.

Battus polydamas (Linné)

Comum. Lagartas sobre *Aristolochia*.

Papilio thoas brasiliensis R. & J.

Comum. Lagartas sobre *Citrus*, sobre diversas *Piperaceae* e *Rutaceae*.

Papilio anchisiades capys Huebner

Comum. Lagartas sobre *Citrus*.

Papilio lycophron Huebner

Um pouco mais raro do que os anteriores. Lagartas sobre *Citrus*.

Fam. *PIERIDIDAE**Ascia monuste* (Linné)

Abundante em certas épocas do ano. Lagartas vivendo em grande número sobre as folhas da couve (*Brassica oleracea*), do nabo (*Brassica napus*), da nabiça (*Raphanus raphanistrum*), bem assim sobre diversas *Cassia* (Leguminosa) e *Capparidaceae*.

Synchloe maenacte (Boisd.) (*itatiayae* (Foett.)).

Um único exemplar capturado.

Eurema deva (Doubleday)

Comum. Lagartas sobre *Cassia*.

Eurema albula (Cramer)

Lagartas também sobre *Cassia*.

Phoebis sennae (Linné)

Muito comum. Lagartas sobre *Cassia*.

Phoebis neocypris (Huebner)

Bem mais rara do que a precedente. Lagartas sobre diversas leguminosas.

Dismorphia psamathe (Fabr.)

Um ♂ capturado. Lagartas sobre *Mimosaceae*.

Fam. *DANAIDAE*

Diogas erippus (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Asclepias curassavica*.

Anosia gilippus (Cramer)

Comum. Lagartas vivendo igualmente sobre a *Asclepias curassavica*.

Fam. *SATYRIDAE*

Euptychia hermes (Fabr.)

Muito comum. Lagartas sobre diversas *Gramineaceae*.

Fam. *BRASSOLIDAE*

Caligo eurylochus brasiliensis (Felder)

Comum. Lagartas sobre as folhas de diversas *Musaceae*.

Fam. *MORPHOIDAE*

Morpho achillaena paulista Fruhst.

Muito comum em toda a região.

Fam. *HELICONIIDAE*

Dione vanillae (Linné)

Muito comum. Lagartas sobre *Passifloraceae*.

Fam. *NYMPHALIDAE*

Anartia jatrophae (Johanss.)

Comum nos lugares descobertos. Lagartas sobre *Verbena triphylla*.

Anartia amathea roeselia Eschch.

Menos comum do que a precedente. Lagartas sôbre *Acanthaceae*.

Precis lavinia (Cramer)

Comum. Lagartas sôbre *Bouchea laetevirens* (*Verbenaceae*).

Euptoieta hegesia (Cramer)

Comum. Lagartas sôbre *Turneraceae*.

Phyciodes lansdorfi (Godart)

Comum. Lagartas sôbre *Justicia violacea* e *Schaueria lachnositachya* (*Acanthaceae*).

Vanessa virginiensis brasiliensis Moore

Muito comum.

Vanessa myrinna Doubeday

Pouco comum.

Hypna clytemnestra huebneri Butler

Comum. Lagartas sôbre diversos *Croton* (*Euphorbiaceae*).

Doxocopa laurentia Godart

Pouco freqüente.

Ageronia epinome Felder

Comum. Lagartas sôbre *Dalechampia triphylla* (*Euphorbiaceae*).

Prepona chalciope domna Fruhst.

Não é rara. Fácil capturá-la com isca de frutas fermentadas. Lagartas sôbre *Lauraceae*.

Anaea appias Huebner

Comum.

Fam. *RIODINIDAE*

Anatole glaphyra Westwood

Três exemplares capturados.

Fam. *LYCAENIDAE*

Leptotes cassius (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Indigofera anil* (*Papilionaceae*) e *Plumbago capensis*.

Fam. *HESPERIIDAE*

Mimoniades versicolor (Latreille)

Comum.

Phocides palemon (Cramer)

Comum.

Proteides exadeus (Cramer)

Comum.

Achlyodes busirus (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Citrus*.

Pyrgus orcus (Cramer)

Muito frequente.

HETEROCERA

Fam. *ARCTIIDAE*

Phaegoptera depicta H. Schaeffer

Um exemplar capturado.

Phaegoptera histrionica H. Schaeffer

Um exemplar capturado.

Fam. *SPHINGIDAE*

Phlegethontius rustica (Fabr.)

Comum. Lagartas sobre *Verbenaceae*.

Phlegethontius sexta paphus (Cramer)

Comum. Lagartas vivendo sôbre as fôlhas de *Nicotiana tabacum* (fumo), de *Solanum lycopersicum* (tomateiro) e de diversas espécies de *Capsicum*.

Protambulyx strigilis (Linné)

Comum. Lagartas sôbre o cajá-manga (*Spondias dulcis*), cajá-mirim (*Spondias lutea*) *Anacardiaceae*.

Erinnyis ello (Linné)

Muito abundante. Lagartas sôbre diversas plantas, sobretudo o *Manihot utilissima*.

Erinnyis obscura (Fabr.)

Comum.

Pholus anchemolus (Cramer)

Comum.

Xylophanes tersa (Linné)

Comum. Lagartas sôbre *Rubiaceae*.

Fam. SATURNIIDAE**Rothschildia arethusa** (Walker)

Comum. Lagartas polifagas.

Copaxa canella Walker

Comum. Lagartas sôbre *Lauraceae*.

Fam. HEMILEUCIDAE**Automeris memusae** Walker

Comum. Lagartas polifagas.

Automeris aurantiaca Weymer

Muito freqüente. Lagartas polifagas.

Fam. ADELOCEPHALIDAE**Eacles magnifica** Walker

Comum. Lagartas polifagas.

Fam. *PSYCHIDAE*

Oiketicus kirbyi Guild.

Comum, Lagartas polípagas.

Fam. *PHALAEENIDAE* (= *Noctuidae* Auct.)

Thysania zenobia (Cramer)

Um ♂ capturado.

Erebus odorā (Linné)

Uma ♀ capturada.

Fam. *PYRALIDAE*

Myelobia smerintha (Huebner)

Muito abundante. As lagartas vivem no interior dos taquarucus.

